

欽定四庫全書

子部
婦人大全良方
目錄上 辨機修製藥物法度
卷一

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣曹方昇



欽定四庫全書	子部五
婦人大全良方目錄上	醫家類
卷一	
調經門	凡醫婦人先須調經故以為初
月經序論第一	
精血篇第二	
產寶方序論第三	
王子亨論第四	
欽定四庫全書	婦人大全良方
月水不調方論第五	凡四
月水不通方論第六	凡四 論附產寶方
養生必用論經病第七	凡十
室女月水不通方論第八	凡二
室女經閉成勞方論第九	凡十
血枯方論第十	凡四
月水不利	不流也
方論第十一	凡四
月水行或不行心腹刺痛方論第十二	凡六



月水不斷方論第十三	凡六方
婦人殺血心痛方論第十四	凡二方
崩暴下血不止方論第十五	凡三十方
崩中帶下方論第十六	
崩中漏下生死脉論第十七	凡三十方
婦人白濁白淫方論第十八	凡一方
婦人天癸過期經脉不調方論第十九	凡二方
婦人血分水分腫滿方論第二十	凡三方
欽定四庫全書 婦人大全良方	
卷二	
衆疾門	經脉不調衆疾生焉故以次之
極一方總論第一	
產寶方論第二	
博濟方論第三	
冠宗爽論第四	
通用方序第五	凡十七方
卷三	



婦人血風白虎歷節走疰方論第二	方 凡七
婦人血風身體骨節疼痛方論第一	方 凡五
婦人飛尸血厥方論第十三	方 凡六
婦人風邪顛狂方論第十二	方 凡四
婦人失血過多心神不安方第十一	方 凡一
婦人血風心神驚悸方論第十	方 凡三
婦人偏風口喎方論第九	方 凡六
婦人賊風偏枯方論第八	方 凡三
婦人臂痛方論第七	方 凡三
婦人中風自汗方論第六	方 凡六
婦人風痺手足不隨方論第五	方 凡二
婦人中風不語方論第四	方 凡三
婦人中風口噤方論第三	方 凡三
婦人中風角弓反張口噤方論第二	方 凡八
婦人中風方論第一	方 凡十
欽定四庫全書 婦人大全良方	
卷四	



欽定四庫全書		婦人大全良方	
卷五			
婦人血風癢癢方論第三	凡八	婦人勞療序論第一	凡二十
婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四	凡七	二十四種蒸病論	附
婦人血風頭痛方論第五	凡九	婦人骨蒸勞方論第二	凡十五
婦人項筋強痛方論第六	凡五	婦人血風勞氣方論第三	凡十四
婦人腰痛方論第七	凡二	婦人風虛勞冷方論第四	凡二
婦人腰脚疼痛方論第八	凡三	婦人冷勞方論第五	凡七
婦人脚氣方論第九	凡十	卷六	
		婦人熱勞方論第一	凡四



欽定四庫全書		婦人大全良方	
婦人客熱方論第二		凡三	方
婦人寒熱方論第三		凡四	方
寡婦寒熱如瘧方論第四		凡一	方
婦人惡寒方論第五		凡一	方
婦人血風煩悶方論第六		凡四	方
婦人血風攻脾不能食方論第七		凡四	方
婦人夢與鬼交方論第八		凡三	方
婦人傷寒傷風方論第九		凡八	方
婦人熱入血室方論第十		凡五	方
婦人咳嗽方論第十一		凡九	方
婦人勞嗽方論第十三		凡二	方
婦人喘滿方論第十四		凡六	方
婦人風痰方論第十五		凡八	方
婦人心胃嘈雜方論第十六		凡二	方
卷七			
婦人嘔吐方論第一		凡六	方



婦人霍亂方論第二	凡六	婦人翻胃吐食方論第三	凡二	婦人血膈方論第四	凡一	婦人鼻衄方論第五	凡七	婦人吐血方論第六	凡十	婦人痰癖諸氣方論第七	凡四	婦人疝瘕方論第八	凡四	婦人八瘕方論第九	凡一	婦人腹中瘀血方論第十	凡二	婦人癥瘕方論第十一	凡三	婦人食癥方論第十二	凡二	婦人積年血癥塊方論第十三	凡七	婦人血氣心痛方論第十四	凡六	婦人血氣心腹疼痛方論第十五	凡二	婦人血氣小腹疼痛方論第十六	凡四	婦人兩脇脹痛方論第十七	凡六



欽定四庫全書		婦人大全良方		卷八		婦人心腹脹滿方論第十八		凡三
婦人風入腸間或祕或利方第七		凡四		婦人淋瀝小便不通方論第一		凡十		一
婦人泄瀉方論第八		凡八		婦人脬轉不得小便方論第二		凡五		方
婦人協熱下利方論第九		凡三		婦人小便數方論第三		凡二		方
婦人滯下方論第十		凡十		婦人遺尿失禁方論第四		凡七		方
婦人痢後嘔噦方論第十一		凡七		婦人小便出血方論第五		凡九		方
婦人大便下血方論第十二		凡八		婦人大便不通方論第六		凡八		方
婦人痔瘻方論第十三		凡五		婦人脫肛候方論第十四		凡五		方



婦人陰腫方論第十五	凡六方
婦人陰痒方論第十六	凡十方
婦人陰冷方論第十七	凡六方
婦人陰挺出下脫方論第十八	凡六方
婦人陰中生瘡方第十九	凡五方
婦人傷丈夫頭痛方第二十	凡二方
婦人交接輒血出痛方第二十一	凡二方
婦人交接他物傷方第二十二	凡三方
欽定四庫全書	
婦人大全良方	
小戶嫁痛方第二十三	凡四方
卷九	
求嗣門	疾病既無須知求嗣故以次之
陳無擇求子論第一	
褚尚書求男論第二	
婦人無子論第三	
千金翼求子方論第四	凡十四方
溫隱居求嗣保生篇方論第五	凡一方



婦人大全良方目錄上										欽定四庫全書						
										婦人大全良方						



欽定四庫全書	婦人大全良方	論胎教第四	受形篇第三	娠予論第二	妊娠總論第一	胎教門 求嗣已明須知胎教故以次之	卷十	婦人大全良方目錄下	欽定四庫全書
驗胎法第三 方 凡一	診婦人有妊歌第二	脉例第一	卷十一	轉女為男法第八	氣質生成章第七	凝形殊稟章第六	孕元立本章第五		



胎殺避忌產前將護法第四	月遊胎殺第五	十干日遊胎殺第六	十二支日遊胎殺第七	六甲旬遊胎殺第八	太史局日遊胎殺第九	食忌論第十	孕婦藥忌歌第十一	欽定四庫全書 婦人大全良方	卷十二	妊娠門 胎教已明須知妊娠疾病故以次之	妊娠隨月數服藥及將息法第一 凡二十方	妊娠惡阻方論第二 凡二十方	妊娠痰逆不思食方論第三 凡六方	胎動不安方論第四 凡二十方	妊娠漏胎下血方論第五	妊娠卒然下血方論第六 凡二十方



妊娠驚胎及僵仆方論第七 凡七方	妊娠胎上逼心方論第八 凡七方	妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛 方第九 凡一方	妊娠誤服毒藥傷動胎氣方論第十 凡三方	妊娠心痛方論第十一 凡七方	妊娠心腹痛方論第十二 凡十一方	妊娠中惡方論第十三 凡三方	欽定四庫全書 婦人大全良方		妊娠腰腹及背痛方論第十四 凡十方	妊娠小腹痛方論第十五 凡一方	妊娠心腹脹滿方論第十六 凡三方	卷十三		妊娠數墮胎方論第一 凡五方	妊娠胎不長養方論第二 凡五方	妊娠胎動安不得却須下方論第三 凡七方	妊娠墮胎後血下不止方論第四 凡九方



娠娠瘡疾方論第九	凡四
娠娠熱病胎死腹中方論第八	凡四
娠娠傷寒熱病防損胎方論第七	凡七
娠娠熱病方論第六	凡五
娠娠時氣方論第五	凡三
娠娠傷寒方論第四	凡二
娠娠腹內鬼胎方論第三	凡三
娠娠風癰方論第二	凡三
娠娠中風方論第一	凡四
卷十四	
娠娠煩燥口乾方論第十	凡四
娠娠子煩方第九	凡十
娠娠吐血衄血方論第八	凡二
娠娠咳嗽方論第七	凡八
斷產方論第六	凡七
娠娠日月未足欲產方第五	凡四



欽定四庫全書		婦人大全良方	
卷十五		妊娠霍亂方論第十	凡四
		妊娠泄瀉方論第一	凡三
		妊娠下痢赤白及黃水方論第二	凡十五
		妊娠大小便不通方論第三	凡十
		妊娠小便不通方論第四	凡八
		妊娠子淋方論第五	凡五
		妊娠遺尿方論第六	凡三
		妊娠尿血方論第七	凡五
		妊娠胎水腫滿方論第八	附產乳養子論凡十一方
		妊娠腹內鍾鳴方第九	凡一
		龔彥德孕癰方第十	凡一
		妊娠不語論第十一	
		妊娠傷食方論第十二	凡二
		妊娠臟燥悲傷方論第十三	凡一
卷十六			



坐月門	妊娠疾病已明須知坐月故以次之
產寶方周頌序第一	
將護孕婦論第二	
滑胎例第三	凡八方
月空方位例第四	
逐月安產藏衣忌向方位第五	
推婦人行年法第六	
體玄子借地法第七	
欽定四庫全書	婦人大全良方
禁草法第八	
禁水法第九	
入月預備藥物第十	
催生符第十一	
卷十七	
產難門	坐月已明須知產難故以次之
產難論第一	
楊子建十產論第二	凡一方



欽定四庫全書		婦人大全良方	
產後調理法第二		產後通用方論第三	
		凡二十三方	
產科序論		胞衣不出方論第四	
		凡二十方	
產後血暈方論第五		凡十六方	
產後顛狂方論第六		凡三方	
產後狂言謔語如有神靈方論第七		凡一方	
產後不語方論第八		凡二方	
卷十九			
產後將護法第一		產後門	
		產難既明須知產後疾病故以次之	
卷十八		產難生死訣第六	
		產難子死腹中方論第五	
		凡十八方	
		郭稽中產難方論第四	
		凡二方	
		催生方第三	
		凡三十六方	



產後乍見鬼神方論第一	凡三
產後臟虛心神驚悸方論第二	凡七
產後心驚中風方論第三	凡五
產後中風恍惚方論第四	凡四
產後所下過多虛極生風方論第五	凡一
產後虛汗不止方論第六	凡八
產後冒悶汗出不識人方論第七	凡一
產後汗出多而變瘥方論第八	凡十四
欽定四庫全書	
婦人大全良方	
中風口噤角弓反張方論附	
產後中風方論第九	凡七
郭稽中產後中風方論	
產後中風筋脉四肢攣急方論第十	凡四
產後熱悶氣上轉為脚氣方論第十一	凡一
卷二十	
產後遍身疼痛方論第一	凡二
產後腰痛方論第二	凡十



欽定四庫全書		婦人大全良方		產後惡露不絕方論第三	凡九方
				產後惡露不下方論第四	凡六方
				產後餘血上搶心痛方論第五	凡三方
				產後惡露不盡腹痛方論第六	凡十方
				產後兒枕心腹刺痛方論第七	凡十方
				產後小腹疼痛方論第八	凡六方
				產後寒疝方論第九	凡三方
				產後兩脇脹滿氣痛方論第十	凡六方
				產後積聚癥塊方論第十一	凡三方
				產後血瘕方論第十二	凡八方
				產後餘血奔心煩悶方論第十三	凡九方
				產後虛煩方論第十四	凡七方
卷二十一				產後口乾痞悶方論第一	凡一方
				產後血渴方第二	凡五方
				產後乍寒乍熱方論第三	凡九方



產後方論附	產後蓐勞方論第四 凡十一方	產後虛羸方論第五 凡十五方	產後風虛勞冷方論第六 凡十二方	產後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七 凡一方	產後嘔逆不食方論第八 凡四方	產後霍亂方論第九 凡四方	卷二十二	欽定四庫全書 婦人大全良方	產後傷寒方論第一 凡七方	產後頭痛方論第二 凡三方	產後咳嗽方論第三 凡四方	產後喉中氣急喘促方論第四 凡四方	產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五 凡二方	產後咳噎方論第六 凡六方	產後血崩方論第七 凡八方	產後月水不調方論第八 凡二方



產後月水不通方論第九	產後四肢浮腫方論第十 凡九方	產後腹痛及瀉痢方論第十一 凡七方	產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第十二 凡三方	十一方	卷二十三	產後痢疾作渴方論第一 凡三方	產後大便秘澀方論第二 凡七方	欽定四庫全書 婦人大全良方	產後大小便不通方論第三 凡三方	產後遺糞方第四 凡二方	產後諸淋方論第五 凡十五方	產後小便數方論第六 凡二方	產後小便不禁方論第七 凡四方	產後小便出血方論第八 凡三方	產後陰脫玉門不閉方論第九 凡十六方	婦人陰蝕五疳方論第十 凡八方



產後乳汁或行或不行方論第十一	凡十五方
產後乳汁自出方論第十二	凡十五方
產後吹妳方論第十三	凡六方
產後妬乳方論第十四	凡十方
乳癰方論第十五	凡二十五方
卷二十四	
拾遺方	
產乳集將護嬰兒方論	
欽定四庫全書	
婦人大全良方	
臣等謹案婦人大全良方二十四卷宋陳自	
明撰自明字良父臨川人官建康府醫學教	
諭是編凡分八門首調經次衆疾次求嗣次	
胎教次妊娠次坐月次產難次產後每門各	
立子目總二百六十餘論論後附方按婦人	
專科始唐昝殷產寶其後有李師聖之產育	
保慶集陸子正之胎產經驗方大抵卷帙簡	
畧流傳亦尠自明採摭諸家持綱挈領於婦	



科證治詳悉無遺明薛已醫案曾以己意刪訂附入治驗自為一書是編刻於建陽余氏勤有書堂猶為自明原本前有嘉熙元年自序稱三世業醫家藏醫書若干又徧行東南所至必索方書以觀其用心亦可云勤矣乾隆四十三年三月恭校上	總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅 總校官 臣 陸費墀	欽定四庫全書 婦人大全良方



婦人大全良方原序

世之醫者於婦人一科有專治婦人方有產寶方治以
專言謂專攻也方以寶方愛重之也蓋醫之術難醫婦
人尤難醫產中數證則又險而難彼其所謂專治者產
寶者非不可用也綱領散漫而無統節目疏略而未備
醫者畫於簡易不能深求徧覽有才進方不效輒束手
者有無方可據揣摩臆度者有富貴家鄙藥賤而不服
者有貧乏人憚藥貴而無可得服者有醫之貪利以賤

欽定四庫全書

婦人大全良方

代貴失其正方者古云看方三年無病可治治病三季
無藥可療又云世無難治之病有不善治之醫藥無難
代之品有不善代之人此之謂也僕三世學醫家藏醫
書數千卷既又徧行東南所至必盡索方書以觀暇時
閉關淨室繙閱涵泳究極天人採摭諸家之善附以家
傳經驗方萃而成編始自調經訖於產後凡八門門數十
餘證總二百六十餘論論後有藥藥不惟其貴賤惟其效
綱領節目燦然可觀庶幾病者隨索隨見隨試隨愈僕



於此編非敢求異昔人也蓋亦補其偏而會其全聚於
散而歛於約期使無憾云愚者千慮必有一得君子毋
以人廢言肯嘉熙元年八月良日建康府明道書院醫
諭臨川陳自明良父序

欽定四庫全書

婦人大全良方



辯識修製藥物法度

凡藥有宜火宜酒者有用子用皮者有去子去皮者有去苗蘆者有別研入藥者有煎成湯去滓後入者若此之類各各不同今備於前無復更註於逐方之下

辰砂 如鏡面箭 雄黃 如雞冠通 雌黃 無夾石 石硫黃

如鵝兒黃色為上 伏龍肝 正對釜月 太陰玄精石

已上並研令極細如麪無聲為妙

禹餘糧 代赭石 磁石 極雄 自然銅 紫石英 有

欽定四庫全書

婦人大全良方

色如箭鏃 雲母石 太一餘糧

已上並用火煨令通赤釅醋淬如此七次或十

次方可研令極細如麪或用水飛尤妙

赤石脂 白石脂 陽起石 有雲頭雨脚輕崧如狼

若是缺 青礞石 每兩

火煨一伏時研如麪或有生用者 梁上塵 炒令烟盡

絳礬 青礬 並生 白礬 飛過亦有 石膏 如無真者以

凡諸石入湯 滑石 出桂府者明白而堅者方可用若



名蠶石皆 不可用 蘇合香油 先用生布絞去滓秤 竹茹 刮淡	竹皮 是也 桑寄生 使隨倉使吳常丞寓廣州方識此物枝	柯上而生凌冬不凋夏生小 木通 有川木通有錢子	正今之所用力淺但 嬰粟殼 去頂蒂筋膜淨洗蜜	得隨衆宜去皮節細切 阿魏 餅炙黃用 葛根 當用家葛切片晒乾用今人	大毒能動胎氣多見醫者贖舖家見成升麻 葛 根湯孕婦服之動子胎孕小兒藥中亦不宜用 麻黃	揀小者為上去根節若以止汗用根節 人參 揀色黃	以水煮去黃沫焙乾不爾令人發煩躁 人參 揀直而極細	面有暈而不油者為上本草云 北細辛 揀直而極細	不去蘆則吐人仍煎煮喜河水 北細辛 味辛辣如川	欽定四庫全書 婦人大全良方	椒者 為上 地榆 葳靈僊 柴胡 前胡 羌活 獨活	宜用紫色蘆有蠶頭節稀者為上王子亨云獨活乃 是極大羌活自是有白如鬼眼狀尋常白色者乃是	老宿前胡謹不可用本草經云二物同一類今人以 紫色節密者為羌活黃色作塊者為獨活又云獨活	即羌活毋類也療風宜 白薇 紫苑 取草蘆如北細	出者為上沂究次之鄆以東市上皆有之形色氣味 悉與神農本草經唐注日華子相應此藥肺病最為急	須今京師所有皆車前草旋覆花根以赤土染之又 味鹹大抵鹹走血又能熱中復利小便且肺病本因	亡津液而得之今又服走津 秦艽 茜根 藁本	液藥為害滋甚醫者宜思之 升麻 漏蘆 防風 揀軟而裏面有暈蘆似 桔梗 人今



多以薺萇為之要揀味苦肥 白者為上或生或炒皆有用	已上並洗去苗蘆細切曬乾秤用	木香 揀如朽骨氣味辛辣甚者為上近時炮炙揀南 雲根以亂真其性太寒利大小便本草謂之青	木香 證類謂之獨行根又云土青木香不堪 入藥凡方書云用青木香者皆當用南木香	不一惟色黃 而沉者為上 丁香 檀香 白芷 官桂 愈嫩則愈 厚愈老則愈	愈薄仍用紫色緊卷者去 皮至有油處別為末用 藿香 荊芥 薄荷 紫	蘇	諸香藥並不可見火或急用宜多紙裹懷用	欽定四庫全書 婦人大全良方	北艾 先去梗焙燥碾爛以馬尾羅隔去灰末只留黃 先秤分兩却用糯米粉打糊捏成餅子炙黃用	或以酒 敗醬 即今之苦 喝起草 即蒼 炒亦可 薺是也 澤蘭葉 紫蘇	藿香 荊芥 薄荷 香薷 柔 栢葉 茵芋 大	青 莽草 樗枝 菴藺 石楠葉 石韋 去 枇杷	葉 先用溫水浸刷去 毛却用薑汁炙	已上並去梗取葉以紗隔去塵土惟紫蘇藿香	飲藥中宜兼嫩梗大能下氣	黃連 宜揀大而似 石菖蒲 一寸九節者佳此種類甚 鷹爪者尤佳 多取生於石上葉有劒脊



者真無劔脊者名溪蓀生於泥中者名 昌陽可解巴豆毒二味並去須細切 舶上茴香	北茴香 葫蘆巴 酒炒破故紙 蛇床子 薏苡仁	紫蘇子 除是自種自收方是真者可以伐病雖云細 而香者是真近來人多採野蘇子以亂其真	其子亦小却以真蘇 葉按令香更不可辨 菴藺子 葶藶子 甜者揀細而 肥者真要分	甜 黑牽牛 生亦有半炒 牛蒡子 芫花 醋浸過炒令 黃色去梗	已上並隔紙炒香	五味子 色黑內有羊腎者佳入補藥 木鼈子 去殼切 中宜炒用入嗽藥中宜生用	巴豆 川中來者似菴子而差小者為上去殼及皮必 用皮紙裹打去油如此者三五次油方盡或有	欽定四庫全書 婦人大全良方	不去 車前子 兔絲子 二味先用濕水淘洗去泥沙 油者 揉乾以好酒浸四五日蒸四	五次研令極爛捏成 餅子焙乾方可為末 香附子 金毛狗 骨碎補 並 切炒令黃色春擦	去毛令淨方秤 石斛 揀色黃如金大者去根皮細 切用酒浸一宿蒸一炊久	慢火炒 卷栢 甘松 並洗去 肉蓯蓉 揀香而肥有鱗 燥秤用 根土用 甲分明者仍其	端有心者方真 當歸 揀如馬尾重半兩已上 川牛膝 有鹽霜者勿用 氣香味甜者為上微炒	揀如鼠尾軟 而甜者為上	並去蘆酒浸半日不可太過久則失味洗淨慢	火焙乾切方秤分兩



五加皮		桂心		補藥用厚者		海桐皮		黃蘗皮		楊	
發散用薄者		梅皮		白鮮皮		杜仲		厚朴		桑白皮	
以楷樹根皮為		偽最要仔細辨		並削去粗皮細切方用惟杜仲厚朴每一斤用		生薑一斤研取自然汁罨一宿次日炒令黃色		甜瓜子		瓜樓子	
冬瓜仁		杏仁		桃仁		郁李		仁		並先去尖雙仁却用水煮一	
酸棗仁		香用		栢子		仁		二沸去皮以麥麩炒黃秤用		皂角	
川椒		揀色紅而口白辛香		仁		揀去殼別		炒研用		口者然後慢火炒令色變以	
紙乘於地上梳覆出汗為度		山梔		小者佳一		縮砂		白豆蔻		益智	
草果		並去皮		仁秤		檳榔		者如雞心		大腹子	
二味		肉豆蔻		三味		麝		為度		山茱萸	
訶子		炮去核取		獨核名訶子		川棟子		核炒		大黃	
濕紙裹煨令香熟		三稜		亦有以紅蓼		蓬莪茂		軟細切或用濕紙裹炮令香		用鬱金	
狼毒		紫河車		三味並		神麪		半夏麪		麥牙	
穀牙		並擣碎		白薑		出大通池		天雄		重兩半已	
者		附子		揀圓而堅		草烏		川烏		重七八錢如	
佳		附子		實者為上		草烏		川烏		鴉腦者為上	



五味並用灰火炮裂去皮尖臍用 天南星 重一兩者佳忌用虎掌炮去皮或以白礬水浸一二宿 吳茱萸 去枝半	夏 二味並用湯泡七次	半夏 麴 以洗過半夏為末以生薑自然汁捏為餅子炙黃用 生地黃 洗焙乾秤亦有研取	自然 熟地黃 溫水淨洗焙乾却以好酒潑濕却用巾汁 熟地黃 子乘於甑上蒸再用酒洒九蒸九曝焙燥秤地黃生者平宜熟者溫補虛人須補藥當用熟本草云男子宜用熟者女人宜用生者 滴乳	香 用蚌粉畧炒掛 延胡索 去皮根 貝母 去心蘆 山藥 浸一宿	欽定四庫全書 婦人大全良方	川芎 芍藥 知母 續斷 川中來者色赤而瘦者佳 小薊根 上已	略洗細切慢 火焙乾用 巴戟 揀紫色者為 牡丹皮 枸杞根 地即	骨皮也初虞世云此藥至賤都下並無真者大抵都人雖一錢亦作偽 石蓮 烏藥 洪州	者為 麥門冬 天門冬 略用水浸款此二門冬去心子	不過三四次即易乾仍不 遠志 汔浸一宿 黃芩 一名枯腸草刮去朽	已上有心者並槌去心只取肉焙乾秤用	青橘皮 橘皮 取多年揀小而紅者佳若大而黃者柑皮也不堪入藥大治產後肌浮雷



公云產後肌浮柑 皮酒服者此也	二味用溫水洗淨却於砂盆內磨去白焙乾秤 揀小而實者為上 ○本草有枳實一條王子亨云此物本名曰枳凡草木	枳殼去穢炒黃用 有花必有實夫枳殼即枳實之類也 ○補藥宜用赤色堅者佳 茯苓神木	用色白者為上 水浸 豬苓	已上三味並去黑皮細切焙燥秤	蒼朮取茅山者為上米泔浸 二三宿打洗去皮切焙 白朮 揀白而肥者方是 出幕阜山力弱不堪用油者去之	欽定四庫全書 婦人大全良方	二朮並去蘆切細焙乾却以麥麩炒令黃燥用	甘草炙 黃耆 揀如箭榦直而甜者佳去蘆劉令長 四五寸槌扁以蜜水或鹽水浸透炙令	為上酥脆 甘菊花 取自我可以烹茶者 旋覆花 鶴虱	諸花並去萼蒂	血餘皂角水洗 淨燒存性 童子小便 夏月要入薄荷 龍齒 龍	骨並揀有布紋者佳 下火煨通赤以乳鉢研令極細不可犯鐵器或有	生用 虎頭骨 虎脊骨 天靈蓋 虎前脛骨 龜	甲 鼈頭 鹿茸 揀嫩而有血色者佳大者為麋茸 小者為鹿茸冬至日麋角解夏至



日鹿角解麋得陽而角解所以利補陽鹿得陰而角解是以利補陰麋茸性熱鹿茸性溫並先燎去毛塗酥炙令黃脆如無酥以好酒浸炙		並用酥炙黃		紫梢花 即湖澤中魚生卵於竹木之上如糖撒狀者是去木用 鹿角膠 阿膠		揀明亮者為上阿膠不必須東平自為之甚佳補虛用牛皮膠治風用驢皮膠東平皆京師偽膠雜以馬皮并故鞍韉鞋底之類其惡為甚		二味並細切以蚌粉炒燥如珠方用		桑螵蛸 去末塗酥炙黃或以酒炒亦可 真珠母 取未鑽者研令極細 玳瑁 宜生用		欽定四庫全書 婦人大全良方		犀角 有竹紋者色黑為上 羚羊角 有馬鞭節仍有挂樹痕者佳		諸角宜用馬斷先鏟取屑懷□為末方可入藥		牡蠣 取左顧者佳用鹽泥固濟煨用 地龍 以生布袋盛撻出沙土只取皮秤 烏賊骨 一名海螵蛸去殼用 蠶 去紫切炒 穿山甲 又名鱗鯉甲去大皮細切蛤粉炒燥		水蛭 偽者以血調麪而為之宜子細辨認以鹽炒黃 蜜虫 蛻青 紅娘		子 斑猫 並去頭翅足用糯米同炒令米赤為度 蜈蚣 去頭足 全蝎 去毒		畧 蛇 揀全而頭向下者為妙燒存性 蟬蛻 溫水洗去土石		仍去 石蜥蜴 蛤蚧 並用酒 烏蛇 揀尾小穿得一百二十錢者仍眼如活者		前足	



為上 白花蛇 揀眼如活者尾端有佛指甲腹兩邊有念珠斑者為上	二蛇並用酒浸一二宿去皮骨取肉炙香用仍經久不蛀	晚蠶沙炒 鼈甲揀大而九肋生者尤佳先用淡醋煮去裙却用釀醋炙令黃脆為妙	五靈脂揀似鼠屎者為上似沙糖者次之先以水浸淘去砂土日乾碎之亦有炒用 乾漆	碎之炒 猪羊腎及肝並去脂膜仍 鯉魚鱗 蝟皮令煙盡	獼猪左懸蹄甲 露蜂房 蠶蛻 牛角腮	並用火燒存性研為細末用	欽定四庫全書 婦人大全良方	鹿角霜研細 麝香揀味辣者真名生麝亦有 獺肝乾	並用研細為末用	荷葉 蓮蓬 櫻櫚為墨刷者妙	用荷葉中心蒂者生用	益母草去根陰乾今名大 鬼白去毛 鬼箭羽去骨取	五倍子去心中 麒麟竭 汲藥 安息香去沙 乳香	琥珀



五味並細研													
欽定四庫全書													
婦人大全良方													
婦人大全良方辨識修製藥物法度													



欽定四庫全書

婦人大全良方卷一

宋 陳自明 撰

調經門

凡醫婦人先須
調經故以為初

月經序論第一

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任
脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣降癸謂壬
癸水名故云天癸也然衝為血海任主胞胎腎氣全盛

欽定四庫全書

婦人大全良方

二脉流通經血漸盈應時而下所以謂之月事者平和
之氣常以三旬一見以像月盈則虧也若遇經脉行時
最宜謹於將理將理失宜似產後一般受病輕為宿疾
重可死矣蓋被驚則血氣錯亂經脉斬然不行逆於身
則為血分勞瘵等疾若其時勞力則生虛熱變為疼痛
之根若恚怒則氣逆氣逆則血逆逆於腰腿則遇經行
時腰腿痛重過期即安也逆於頭腹心肺背脇手足之
間則遇經行時其證亦然若怒極則傷肝而有眼暈脇



痛嘔血瘰癧癰瘍之病加之經血滲漏於其間遂成竅
穴淋瀝無有已也凡此之時中風則病風感冷則病冷
久而不愈變證百出不可言者所謂犯時微若秋毫感
病重如山岳可不畏哉

精血篇第二

齊光祿大夫褚澄遺書

飲食五味養髓骨肉血肌膚毛髮男子為陽陽中必有
陰陰中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子
為陰陰中必有陽陽之中數七故一七而陰血升二七

欽定四庫全書

婦人大全良方

而陰血溢皆飲食五味之實秀也方其升也智慮開明
齒牙更始髮黃者黑筋弱者強豎其溢也凡充身體手
足耳目之餘雖針芥之歷無有不下凡子形肖父母者
以其精血嘗於父母之身無所不歷也是以父一肢廢
則子一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其母然
雌鳥牝獸無天癸而成胎何也鳥獸精血往來尾間也
精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有
難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗



小便道澁而為淋精已耗而復竭之則大小便道牽疼
愈疼則欲大小便愈便則愈疼女人天癸既至踰十年
無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則
舊血不出新血誤行或潰而入骨或變而之腫或雖合
而難子合男子多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人觀
其精血思過半矣

產寶方序論第三

大率治病先論其所主男子調其氣女子調其血氣血

欽定四庫全書

婦人大全良方

人之神也不可不謹調護然婦人以血為基本氣血宣
行其神自清所謂血室不蓄則氣和血凝結則水火相
刑月水如期謂之月信不然血凝成孕此乃調燮之常
其血不來則因風熱傷於經血故血不通或外感風寒
內受邪熱脾胃虛弱不能飲食食既不充榮衛抑遏肌
膚黃燥面無光澤時發寒熱腹脹作痛難於子息子藏
冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹
中如塊忽聚忽散其病乃癥血涸不流而搏腹脹時作



寒熱此乃成瘕或先後爽期雖通而或多或寡究病之原蓋本於此

王子亨方論第四

論曰經者常候謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故其來必以月太過不及皆為不調過於陽則前期而來過於陰則後時而至其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱為邪詳說於下

月水不調方論第五

欽定四庫全書

婦人大全良方

夫婦人月水不調者由勞傷氣血致體虛風冷之氣乘也若風冷之氣客於胞內傷於衝任之脉損手太陽少陰之經衝任之脉皆起於胞內為經絡之海手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主上為乳汁下為月水然則月水是經絡之餘若冷熱調和則衝脉任脉氣盛太陽少陰所生之血宣流依時而下若寒溫乖適經脉則虛若有風冷虛則乘之邪搏於血或寒或溫寒則血結溫則血消故月水乍多乍少故為不調也



紫石英圓 出本 治婦人病多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說是陰勝陽是陽勝陰所以服藥少得有效蓋陰氣勝陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽氣勝陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當知陰陽調其氣血使不相勝以平為福		紫石英	禹餘糧	人參	龍骨	川烏	官桂
欽定四庫全書		婦人大全良方					
桑寄生		杜仲	五味子	遠志	澤瀉	當	
歸		石斛	茯苓	乾薑	各一兩	川椒	牡蠣
草		各半兩					
右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三五十圓空心米飲吞下		指迷方同					
加減吳茱萸湯		治衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時頭眩飲食減少氣滿心忪肌膚不澤悉皆主之					
		出張氏方					



吳茱萸 兩半 麥門冬 乾薑 白茯苓 牡丹皮	南木香 苦梗 各三錢 甘草 三錢 當歸 兩半 北細辛 一錢	防風 半 官桂 各一分 半夏 七錢	右咬咀每服四大錢水一盞半生薑五片棗子一枚	煎至七分去滓空心溫服	治婦人室女經脉不調臍腹冷痛惡心腹常脹滿至晚	則增宜服小烏沉湯吞下艾煎圓 見和劑局方	薑黃散 治血臟久冷月水不調臍腹刺痛 出專治婦人方	欽定四庫全書 婦人大全良方	川薑黃 成片子者四兩 蓬莪朮 紅花 桂心 川芎 各一兩	延胡索 兩 牡丹皮 當歸 各二兩 白芍藥 三兩	右為細末每服一錢水半盞酒半盞煎至七分熱服	桃仁散 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀	如瀉水四體虛翕不能飲食腹中堅痛不可行動月水	或前或後或經月不來舉體沉重惟欲眠睡多思酸物	桃仁 粉草 半夏 各一兩 赤芍藥 生地黃 各三兩 澤蘭葉 川牛膝 當歸 桂心 牡丹皮 人



參 蒲黃

川芎

各二兩

右為粗末每服五大錢水盪半薑三片煎七分空心

去滓溫服

月水不通方論第六

夫婦人月水不通者由勞傷血氣致令體虛受風冷邪
氣客於胞內傷損衝任之脉并手太陽少陰之經致胞
絡內血絕不通故也衝任之脉起於胞內為經脉之海
手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經為表裏

欽定四庫全書

婦人大全良方

主上為乳汁下為月水風冷傷其經血血性得溫則宣
流得寒則澁閉既為風冷所搏血結於內故令月水不
通也又云腸中鳴則月水不來病本在胃胃氣虛不能
消化水穀使津液不生血氣故也

所以梅師方單用厚朴其理可見再出易

簡方又云醉以入房則內氣竭絕傷於肝使月水衰少不

來所以爾者肝藏於血勞傷過度血氣枯竭於內也又
先唾血及吐血下血謂之脫血名曰血枯亦月水不來
也所以爾者津液減耗故也但益津液其經自下也診



於腎脉微澁者是月水不通也又左手關後尺內浮為
陽絕無膀胱脉也月水則閉又肝脉沉而急隱之亦然
時小便難苦頭眩痛腰背痛足寒時疼月水不來時恐
得之時有所墮墜也月水不通久則血結於内生塊變
為血瘕亦作血瘕血水相并壅澁不通脾胃虛弱變為
水腫也所以然者脾候身之肌肉象於土土主剋消於
水水血既并脾氣衰弱不能剋消故水氣流溢浸漬肌
肉故腫滿也

欽定四庫全書

婦人大全良方

產寶方論

論曰經脉不通日久此非細事實為沉病若是室女經
脉不通初因貪食酸鹹之物遂致血脉乾涸變成勞疾
若因經脉正行誤食熱麪生冷房室遂成此疾腹內顆
塊誤認為胎時日稍深必見困篤

養生必用論經病第七

初虞世云女子十四天癸至任脉通月事以時下故令
有子天癸者物之自然月者以月至經者有常也其來



不可過與不及多與少反此皆謂之病不行尤甚百疾生焉血既不能滋養百體則髮落面黃身羸瘦血虛則發熱故身多熱水不足則燥氣燔燥氣燔則金受邪金受邪則肺家嗽嗽則為肺癰肺痿必矣醫見經不行則用蠶虫水蛭等行血藥見熱則用除熱諸寒藥實出妄意就中不行以藥行之為害滋大經水枯竭則無以滋養其能行乎譬猶索萬金於乞丐之人雖捶楚並下不可得也但服以養氣益血諸藥天癸自行又有一種婦人盛實月經瘀閉利之則行自有證候學者宜審焉	欽定四庫全書 婦人大全良方	當歸散 治血脉不通	當歸 穿山甲 灰炒 各半 蒲黃 辰砂 兩炒 錢一 麝香 少許	右為細末研停每服二錢熱酒調下如不喫酒薄荷醋湯亦可	琥珀散 治心膈迷悶腹臍痛氣急氣悶月信不通等疾	天台烏藥 二當歸 莪茂 兩 各一



右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生 冷油膩等物若產後諸疾用炒薑酒調下 已上出婦人經驗方	救急療婦人月經不調或一月不來或隔月不來或多 或少臍下絞痛面色痿黃四體虛吸羸瘦不能食方	當歸 川牛膝 牡丹皮 桃仁 各一兩半 大黃 芎 藭 土瓜根 芍藥 朴消 桂心 蜚虫 去翅足炒	水蛭 各半兩炒	右咬咀以水九升煮取三升分溫五服忌如常法	欽定四庫全書 婦人大全良方	療月經不通腹中痛 見產寶方	牛膝 六分 大黃 桃仁 去皮尖雙仁炒 細辛 各五分 川芎 當	歸 各四分 水蛭 三分糯米炒黃	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒下	治月水不通 出梅師方 已試有驗	厚朴 薑汁炙香細切 不以多少濃煎去滓空心溫服	治婦人經候不來數月臍腹疔痛或有一塊上下相拄	飲食減少腹滿惡心大便秘澀者宜服局方北亭圓用



石菖蒲馬鞭草煎湯送下三四十圓兩服必通	萬病圓 治女人月經淤閉月候不來繞臍寒疝痛徹	及產後血氣不調腹中生瘕結而不散及癥瘕等病	乾漆 杵碎炒令大煙出煙頭青白如此一時久 牛膝 去苗酒浸一宿焙各一兩	右為末以生地黄汁一升入二味藥末銀石器內慢	火熬俟可圓即圓如梧桐子大空心米飲或溫酒下	二圓日再勿妄加病去止藥	紅花當歸散 治婦人血藏虛竭或積瘀血經候不行	欽定四庫全書 婦人大全良方	或斷續不定時作腹痛腰膝重疼攻刺小腹緊硬及室女月經不通並宜服之	紅花 當歸尾 紫葳 牛膝 甘草 蘇木 各一兩半	細挫各二兩 白芷 桂心 赤芍藥 劉寄奴 各一兩半	右為細末空心熱酒調三錢服食前臨卧再服若血久不行濃煎紅花酒調下孕婦休服一名凌霄花散	鱉甲圓 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結硬	時發刺痛漸成勞狀 出博濟方



龍甲去裙 桂心 三稜醋炙 牡丹皮 牛膝去苗	訶子肉 琥珀 大黃煨 土瓜根 桃仁去皮尖雙	右各等分為細末煉蜜圓如梧桐子大煎桃仁湯送	下十五圓破血癥氣塊尤妙	桃仁煎 治月水不調阻滯不通 博濟方	大黃炮 朴硝 桃仁去皮尖雙 蜜虫一兩去足	右為細末用醋五升入銀石器內慢火熬成膏可圓	圓如梧桐子大當日晚不須喫食五更初以溫酒吞	欽定四庫全書 婦人大全良方	下一圓至明日午際取下如赤豆汁或似雞肝蝦蟇	衣其病下了即一圓分作二服未下再服候鮮紅即	住服仍以調氣湯散補之	室女月水不通方論第八	論曰夫衝任之脉起於胞內為經脉之海手太陽小腸	之經手少陰心之經也二經為表裏心主於血上為乳	汁下為月水也女子十四而天癸至腎氣全盛衝任流	通經血既盈應時而下名之月水常以三旬而一見謂



之平和也若憊期者由勞傷血氣壅結故令月水不通也

通經圓 治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心 青皮 大黃煨 川椒 莢茂 川烏炮去皮

乾漆碎之炒 當歸 桃仁去皮尖雙 乾薑各等

右為細末分為四分用一分以米醋熬成膏和餘分

藥末成劑白中治之圓如梧桐子大眼乾每服二十

圓淡醋湯下至三十圓溫酒亦得空心食前服

欽定四庫全書

婦人大全良方

治室女月水不通

出聖惠方

雄鼠屎一兩燒存性為細末空心溫酒調下一錢

神效

室女經閉成勞方論第九

寇宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷

其氣血者世有室女童男積想在心思慮過當多致勞

損男子則神色先散女子則月水先閉何以致然蓋憂

愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而



欽定四庫全書		婦人大全良方		月水先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦筋痿俟五臟傳遍故卒不能死者然終死矣此一種於勞中最難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生舉此為例其餘諸勞可按脉與證而治之 張氏云室女月水久不行切不可用青蒿等涼藥醫家多以為室女血熱故以涼藥解之殊不知血得熱則行冷則凝養生必用方言之甚詳此說大有理不可不知									
若經候微少漸漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脉微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火火逼水涸亡津液當養血益陰慎無以毒藥通之		宜栢子仁圓澤蘭湯		栢子仁圓									
栢子仁		牛膝		卷栢		澤蘭葉		續斷					
研炒別		兩各半		兩各半		兩各半		兩各半					



兩 熟地黃 三兩	右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心飲下三十圓	澤蘭湯	澤蘭葉 三兩 當歸 各一兩 芍藥 各一兩 甘草 半兩	右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服	沉香鼈甲散 治室女榮衛不調經候凝滯或時頭目	昏悶上膈積涎肢體不利五心虛煩飲食進退多困少	力 博濟方	欽定四庫全書 婦人大全良方	沉香 甘草 炙 檳榔 各三兩 木香 一兩 鼈甲 半兩 常山	當歸 柴胡 人參 半夏 桂心 生地黃	白茯苓 青皮 陳皮 各一兩	右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至七分溫	服空心日三服	金花散 治室女骨蒸熱勞	藿香 零陵香 延胡索 芍藥 白芷 川芎	當歸 桂心 各一分 蓮子心 晚蠶蛾 各二分



右為細末溫酒調下一錢日二服

切勞散 治心腎俱虛勞嗽二三聲無疾遇夜發熱熱
過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧
恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有
紅線名曰肺痿若上件疾不治便成羸劣之疾

白芍藥_{兩六} 綿黃耆 甘草 人參 當歸 半夏

白茯苓 熟地黄 五味子 阿膠_{各二兩炒}

右咬咀每服三大錢水盞半生薑十二片棗三箇煎

欽定四庫全書

婦人大全良方

至九分無時溫服日進三服 陳總領_{日華} 云鄉人

楊元鼎女及笄病證甚危一歲之間百藥俱試無有
效者亦嘗從予求治法無有應之者偶遇名醫得此
方只一料遂除根專錄此方傳人

資血湯 治婦人血熱氣虛經候澀滯不通至使血聚
肢體麻木渾身疼痛煩倦或室女年及經脉未行日漸
黃瘦將成勞疾切不可便投紅花破硬等藥他日為患
也若是前證則增寒發熱五心煩躁飲食減少宜服此



藥滋養而通利之									
馬鞭草 荊芥穗 各四兩 桂心 枳殼 川芎 當									
歸 赤芍藥 各二兩 牡丹皮 一兩									
右為粗末每服四錢烏梅一箇水二盞同煎至一盞									
去滓空心食前日四服有此證服至半月經脉自通									
此方至妙不可輕視非一二服便見特達之效而鄙									
之仍服後素有諸疾因此藥皆去矣									
麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胃									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
煩壅 出蘇沈良方									
鼈甲 大黃 煨 常山 赤茯苓 柴胡 白朮									
當歸 乾漆 炒令煙盡 生地黄 石膏 各一兩 甘草 半兩									
右為細末每服二錢水一盞小麥五十粒煎至六分									
食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩此黃州吳									
判官方治骨熱黃瘦口臭肌熱盜汗極效麥煎散甚									
多此方吳君寶之如希世之珍其效可知									
鼈煎圓 治男子婦人童男室女五勞七傷傳症飛尸									



尸注八極骨蒸肺痿黃瘦虛勞無力肌肉不生婦人血 蒸五心煩熱血風勞氣室女月閉黃瘦氣塊腹痛經脉 不調乾嗽咽膈不利癥瘕積塊臉赤口瘡已上等疾無 不效驗
黃耆 柴胡 枳殼 知母 白茯苓 沉香
人參 附子 木香 升麻 肉桂 胡黃連
杏仁 當歸 常山 羌活 京三稜 烏梅肉
安息香 明者同胡 桃肉細研
欽定四庫全書 婦人大全良方
右十九味修製了各秤一兩為末用活蠶一箇重十 兩或半斤者以河水養七日須逐日換新水用童子 小便五升無灰酒五升銀石器內慢火熬百沸先更 入桃柳枝東南上者各剉三合烏梅五十箇拍破此 三味用綿裹同蠶煎煮至一半去桃柳枝等三味蠶 爛取去將肉研如膏骨併殼焙乾為末再入汁中熬 如漆色或更入酒少許此在臨時斟酌盛放甕器中 搜和前藥入白中杵千下圓如梧桐子大丈夫婦人



十五歲已上二十圓至三十圓溫酒下婦人荊芥酒
下所煮膏子須契勘多少勿令剩却但少些子不妨
却別熬酒若膏剩恐斃不全故也凡服此藥恐熱三
日更須服八僊飲子一服解之

八僊飲子

常山 白朮 秦艽 洪州鬼白 赤芍藥 甘

草 紫蘇 銀州柴胡

右等分洗淨為粗末每服半兩水一碗烏梅肉二个

欽定四庫全書

婦人大全良方

葱白薤白桃柳槐枝各七寸同煎至一盞去滓溫服

滓併煎

治女子經脉不行胃膈滿悶身體麻木或有寒熱證候

厚朴 牡丹皮 茅香 藿香 甘草 陳皮

生半夏 麥芽 當歸 蒼朮 赤芍藥

炒各半兩 錢各三

右咬咀每服半兩水一大盞薑三片煎服熱甚加北

柴胡三錢半

羅宅大師傳有效

血枯方論第十

出駱龍吉方



腹中論曰有病胃脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊									
臭出清液四肢清目眩時時前後血病名曰血枯此得									
之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事									
衰少不來也									
注云 夫藏血受天一之氣以為滋榮者也									
其經上貫膈布脇肋今脫血失精肝氣已傷故血枯涸									
而不榮胃脇滿以經絡所貫然也妨於食則以肝病傳									
脾胃病至則先聞腥臊臭出清液則以肝病而肺乘之									
先唾血四肢清目眩時時前後血皆肝病血傷之證也									
欽定四庫全書									
婦人大全良方									
烏賊魚骨圓 治婦人血枯胃膈四肢滿妨於食飲病									
至聞腥臊臭氣先唾血出清液或前後泄血目眩轉月									
事衰少不來									
烏賊魚骨									
去甲 四兩 藺茹 一兩									
右為末以雀卵和成劑圓如小豆大每服五圓加至									
十圓以鮑魚煎湯下以飯壓之									
菴蓉圓 治婦人胃脇支滿聞腥臊氣唾血目眩不能									
飲食泄血不已日久血枯									



茯苓西 浸熟地黄 白茯苓 兔絲子製 附子炮 當歸炒 白石英研 五味子 禹餘糧製 烏賊魚骨去甲	各一兩 人參半兩	右為末煉蜜為圓如梧桐子大酒下二三十圓米湯亦可空心日中臨卧各一服	治婦人先有所脫血或醉入房勞傷故月事衰少不來宜乾地黄湯	乾地黄 澤蘭葉 白茯苓 人參 五味子	欽定四庫全書 婦人大全良方	附子炮 禹餘糧製 當歸	右等分為粗末每服三錢薑五片水一盞煎至七分空心溫服	磁石圓 治婦人陰氣衰弱血枯不榮月事不來	磁石製 白茯苓 附子炮 乾地黄 人參 當歸	右各一兩為細末煉蜜圓如梧桐子大酒下三十圓米湯亦可空心日中臨卧各一服	月水不利不流利也 方論第十一



夫婦人月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受風冷 客於胞內損傷衝任之脉手太陽少陰之經故也衝任 之脉為經脉之海皆起於胞內手太陽小腸之經手少 陰心之經也此二經為表裏主下為月水風冷客於經 絡搏於血氣血得冷則壅滯故令月水來不宣利也診 其脉寸口弦苦腹痛主月水不利孔竅生瘡又肝脉沉 是厥陰經也沉為陰主月水不利腰腹痛尺脉滑血氣 實經絡不利又尺脉來而斷絕者月水不利也寸關調 如故而尺脉絕不至者月水不利也當患小腹引腰痛 氣滯上攻胃膈也											
欽定四庫全書 婦人大全良方											
白薇圓 治婦人月水不利四肢羸瘦喫食減少漸覺 虛乏故令無子											
白薇 栝子仁 白芍藥 當歸 桂心 附子											
葶藶 白朮 吳茱萸 木香 細辛 川芎											
檳榔 熟地黃 牡丹皮 紫石英 人參											
石斛 白茯苓 澤蘭葉 川牛膝											



右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓空心	晚食前溫酒吞下	療女人臍下慙逆氣脹滿月經不利血氣上攻欲嘔不	得睡 出產寶方	當歸 四錢 乾漆 三錢炒 錢令煙盡	右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下十五圓	牡丹散 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食	牡丹皮 川大黃 炒各一兩 赤茯苓 生地黄 桃仁	欽定四庫全書 婦人大全良方	當歸 桂心 赤芍藥 白朮 各三分 石韋 去毛	香 各半兩	右呔咀每服三大錢水一盞薑三片煎七分去滓空	心溫服	牛膝散 治婦人月水不利臍腹疼痛	牛膝 一兩 桂心 赤芍藥 桃仁 延胡索 當歸	牡丹皮 川芎 木香 各三分	右為末每服方寸匕溫酒調下食前



月水行或不行心腹刺痛方論第十二

論曰夫婦人月經來腹痛者由勞傷氣血致令體虛風冷之氣客於胞絡損於衝任之脉手太陽少陰之經衝脉任脉皆起於胞內為經脉之海也手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水其經血虛則受風冷故月水將行之際血氣動於風冷風冷與血氣相擊故令痛也

亦可就第七卷第十五論尋方

若經道不通繞臍寒疝痛徹其脉沉緊此由寒氣客於

欽定四庫全書

婦人大全良方

血室血凝不行結積血為氣所衝新血與故血相搏所

以發痛譬如天寒地凍水凝成冰宜溫經湯及桂枝桃

仁湯萬病圓

方見第一卷第七論

溫經湯方

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

莪茂

各半

兩

人參

甘草

牛膝

各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

桂枝桃仁湯



桂枝 芍藥 生地黄 各二兩 桃仁 製五 甘草 一兩	右為粗末每服五錢水二盞薑三片棗一箇煎至一	盞空心溫服	若經候頓然不行臍腹疼痛上攻心脇欲死或因不行	結積漸漸成塊臍脹如覆杯久成肉塊不可復治由驚	恐憂思意所不決氣鬱抑而不舒則乘於血血隨氣行	滯則血結以氣主先之血主後之宜服桂枝桃仁湯不	瘥宜地黄通經圓已成塊者宜萬病圓 方見前	欽定四庫全書 婦人大全良方	地黄通經圓	熟地黄 三兩 去頭足 水蛭 用糯米同炒 桃仁 製	五十箇	右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下五圓未	知加至七圓	琥珀散 治婦人月經壅滯每發心腹臍疔痛不可忍及治	產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死 出本事方	三稜 莪朮 赤芍藥 牡丹皮 劉寄奴 當



歸 熟地黄 桂心 甘菊花 真蒲黃 炒各一兩 細剉	右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同	煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服三錢空	心食前溫酒調下 一方不用菊花蒲黃却用烏藥	延胡索亦佳予家之祕方也 若是尋常血氣痛只	一服產後血衝心二服便下常服尤佳前後救人急	切不少此方易合宜多合以救人烏豆一升約用五兩	又一方 延胡索 當歸 各等分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右二味為粗末每服三錢薑三片水一大盞煎至七	分去滓稍熱服 陳氏方有桂名如神湯最治腰痛	雷公炮炙論只用延胡索一味治心痛 僕詳此	方大能治血氣腰腹痛藥簡功專治疾有效	華撥圓 治婦人無時月水來腹痛	華撥 鹽炒去 蒲黃 各一兩 炒	右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三四十圓食後	用鹽米飲吞下



月水不斷方論第十三

夫婦人月水不斷者由損傷經血衝任脉虛損故也衝
 任之脉為經脉之海手太陽小腸之經也手少陰心之
 經也此二經為表裏主下為月水若勞傷經脉衝任氣
 虛故不能制經血令月水不斷也凡月水不止而合陰
 陽則冷氣上入於臟令人身體面目痿黃亦令絕子不
 產也

若經候時行時止或淋瀝不斷腹中時痛其脉沉細此

欽定四庫全書

婦人大全良方

因寒熱邪氣客於胞中衝任不調此非虛弱蓋邪氣伏
 留滯於血海譬如有積之人下利不定有所去即愈宜

牡丹圓

牡丹皮 牡蒙 附子^炮 大黃^蒸 葶蘆^炒 苦梗

茯苓^{各半} 當歸 製厚朴 吳茱萸 川椒^{炒出}

人參 川芎 北柴胡 桂心 乾薑^{各半} 細辛

一兩 蜜虫^{五十箇去}
 半 頭足翅炒

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下十圓未



知漸加至二十圓以知為度	續斷圓 治婦人月水不斷口乾心煩四肢羸瘦飲食	無味漸加乏弱	川續斷 當歸 烏賊骨 黃耆 牛角鯁 燒 五	味子 甘草 龍骨 研 赤石脂 熟地黄 各一兩 地	榆 半兩 艾葉 附子 乾薑 川芎 各三分	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前溫酒	下	欽定四庫全書 婦人大全良方	禹餘糧圓 治婦人久冷月水不斷面色痿黃四肢瘦	弱心神虛煩飲食減少	禹餘糧 二兩 鹿角膠 三分 紫石英 續斷 赤石脂	熟地黄 川芎 各一兩 乾薑 黃耆 艾葉 栢	葉 炒 當歸 炒 人參 白茯苓 各半兩	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心米飲	下	牡蠣圓 治婦人血海虛損月水不斷



牡蠣粉 赤石脂 代赭石 各一兩 阿膠 川芎	當歸 鹿茸 續斷 乾薑 各三分 甘草 一分	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食前溫酒下	療經血不止	黃芩 五分 當歸 栝葉 蒲黃 各四分 生薑 二分 艾葉 一分	生地黄 四分 伏龍肝 十二分	右咬咀用水二升煎取八合分為二服	療經血不止謂曰 出婦人經驗方 已試有效	欽定四庫全書 婦人大全良方	婦人經血正淋漓 舊瑞蓮蓬燒作灰	熱酒一盃調八字 自然安樂更無疑	又一方	蓮蓬殼 拒霜花	右二味等分為末每服二錢空心米飲調服	婦人殺血心痛方論第十四	凡婦人血崩心痛甚者名殺血心痛小產血過多而心	痛甚者亦然



烏賊魚墨炒醋湯調下

此魚腹內有墨汁遇見人過必吐其墨以蔽其身

崩暴下血不止方論第十五

凡三十六方

論曰夫婦人崩中者由臟腑傷損衝脉任脉血氣俱虛故也衝任之脉為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平而氣血調適經下依時若勞動過度致臟腑俱傷而衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下診其寸口脉微長尺脉微弦寸口脉微長為寒在上焦但吐爾今尺脉微弦如此

欽定四庫全書

婦人大全良方

即小腹痛引腰脊痛者必下血也

若經候過多遂至崩漏色明如水下得溫則煩甚者至於昏悶其脉數疾小為順大甚者逆此由陰陽搏為熱所乘攻傷衝任血得熱則流散譬如天暑地熱則經水沸溢陽傷於陰令人下血當補其陰宜服小薊湯阿茄

阿圓

小薊湯

小薊莖葉

洗切研取汁一盞

生地黄汁

一盞白朮

半兩



右三件入水一盞煎至一半去滓溫服	阿茄陀圓	胡椒 紫檀 鬱金 茜根 小蘗皮 乃山石榴皮也	右等分為細末滴水圓如梧桐子大阿膠湯化下二圓	琥珀散 治崩暴下血 陳總領方	赤芍藥 香附子 荷葉 枯 男子髮 皂莢水洗 當歸	棕櫚 炒焦 烏紗帽 是漆紗頭巾取陽氣衝上故也	右等分除棕外其餘並切麤片新瓦上煨成黑炭存	欽定四庫全書 婦人大全良方	性三分為細末每服三五錢空心童子小便調下如	人行十里再進一服不過七八服即止如產後血去	多加米醋京墨麝少許 親戚黃守正卿為和劑局	日內子凌夫人忽苦此疾危殆百藥不效偶得此方	旋即安愈 張聲道云大率治血崩先用此譬如治	痢有積不先去之徒服斷下藥一時暫止久則毒氣	愈深甚至危殆血崩乃經脉錯亂不循故道淖溢妄	行一二日不止便有積瘀之血凝成窠白更以藥澁



住轉見增劇宜先以五積散加醋煎投一二服次服	靈脂散及順氣藥去故生新自能平治此切當之說	五靈脂散 治婦人血山崩及治丈夫脾積氣 張氏	云治血崩諸藥不能止者妙好五靈脂炒令煙盡為末	每服一錢溫酒調下此藥兼能解藥毒及蛇蝎蜈蚣咬	塗傷處立愈 一方每服三錢水酒童便各半盞煎至	八分通口服名抽刀散治產後有病服三服散惡血或	心腹脇肋脚痛不可忍或只用童子小便尤佳或中	欽定四庫全書 婦人大全良方	風即入草烏頭半錢重同煎此鄧知縣方 張氏云亦	治腸風下血如不能飲酒者煎烏梅栢葉湯調下如心	煩口乾渴者加蒲黃炒減半用一方燒存性霹靂酒調	下然此藥氣惡難喫燒之存性極妙	又一方	五靈脂十兩為末水五大盞煎至三盞去滓澄清	再煎成膏入神麴二兩為末和圓如梧桐子大每	服二三十圓溫酒下



荊芥散 治婦人崩中連日不止

夏太君娘娘方

用荊芥穗於燈盞多着燈心好麻油點燈就上燒荊

芥焦色為細末每服三錢童便調下

獨聖散 治婦人血山崩不止

出經驗方

防風去義 右不以多少為細末酒煮白麪清調下

二錢空心食前日二服更以麪作糊酒投之極驗

已上三方似非止血之藥如靈脂荊芥防風皆

是去風之藥然風為動物衝任經虛被風所傷

欽定四庫全書

婦人大全良方

致令崩中暴下僕因覽許學士傷寒脉歌曰脉

浮而大風傷榮榮血也而用此藥方悟古人見

識深奧如此

一方

熟艾如雞子大 阿膠半兩 乾薑一錢

右為粗末用水五盞先煮艾薑至二盞半入膠消洋

溫分二服空心服一日服盡

又一方



牛角鯁 烏賊骨 麝香 各一錢	右為細末入麝香令停酒調下一錢匕日二三服	神應散 治婦人血崩不止	桂心不以多少甘鍋內煨微存性為末每服一二	錢米飲調下	一方治崩中下血 出本事方	黃芩不以多少為細末每服一錢霹靂酒調下 許學	士云崩中多是用止血藥補血藥此治陽乘於陰前所謂天暑地熱經水沸溢是也近朝有王御醫	欽定四庫全書 婦人大全良方	值夜忽有一宮女血如山崩其時暑月藥笥中只有大順散兩服用冷水調服旋即奏效以此知醫要權變金華散亦可	金華散 治婦人血室有熱崩下不止服溫藥不效者	延胡索 瞿麥穗 當歸 乾葛 牡丹皮 各一兩	石膏 二兩 桂心 別為末 三分 蒲黃 兩半 葳靈仙 三分	右為細末每服二錢水一盞煎至六分空心溫服日	二服	凡血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同不可一槩用藥



僕嘗療一婦人崩漏暴下諸醫投薑桂附子等藥服	之愈甚召予診之六脉緊數遂用此藥兼局方龍腦	雞蘇元數服即安本事方單用黃芩者亦此意也	如聖散 治婦人血山崩	棕櫚 烏梅 各一兩五分並燒過存性	右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久患	者不過三服即愈	一方用烏梅燒灰為末烏梅湯調下	欽定四庫全書 婦人大全良方	一方用棕櫚燒存性為末湯破酒令淡調下三錢空心	服	一方用棕櫚白礬 煨 為末酒調二錢服	治婦人血崩屢效方	當歸 白芍藥 乾薑 棕櫚 各等分	右各煨存性碾為細末秤過醋湯調以有節朱筋左	攪四十九轉食前服	千金翼治婦人崩中去血不止



大小薊根 一斤 用酒一斗漬五宿任意服之千金方	有白茅根六兩半酒煮服	縮砂散 治血崩	新縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為細末米飲	調下三錢	一方用益智炒為細末鹽米飲調下	如神散 治婦人血崩不止赤白帶下	香附子 赤芍藥 各等分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末每服二錢鹽一捻水一盞煎至七分溫服	無時候日二服十服見效	一方	用香附子去毛炒焦為細末用極熱酒調下二錢放	溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢匕如山崩不可止	者亦能解之米飲調亦可 許學士云治下血不止	或成五色崩漏常服資血調氣是婦人仙藥也 已上並出	驗方 婦人經



已上三方大同 小異出產寶方 其功爾 香附子不以多少先擦去毛用好醋煮出焙碾為末 醋煮糊為圓如梧桐子大每服三十圓米飲送下無 時候婦人數墮胎由氣不下降所以胎氣不固此藥 尤妙一方有艾同煮亦好	欽定四庫全書 婦人大全良方	治血崩方	夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時候	治崩中下血不止小腹痛	芍藥 一兩半 炒黃 六兩 栢葉 微炒	右水一升煎取六合入酒五合再煎取七合空心分 為兩服一方為細末酒調二錢一方有鹿角膠等分 炒燥為細末酒調服方寸匕治白帶臍腹疼痛面黃	瘦悴 出千金 聖惠方



治崩中下血久不止或赤或黑臍下痛	側栢 炒 芍藥 龜甲 炙 桑耳 各六分 乾地黄 黃耆	續斷 各五分 當歸 炒 艾葉 牛角鰓 煨各四分 禹餘糧	分十	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓煎黃耆湯	空心下	治崩中晝夜不止醫不能治	芎藭 一兩 生地黄汁 二合	欽定四庫全書 婦人大全良方	先用酒五升煮芎藭一升去滓下地黄汁再煎三二	沸分為三服不耐者漸進 小品方無地黄汁不飲酒者水煮亦可	一方	丁香 二兩 為細末用酒三升煮取一升空心頓服必	效方用丁香百顆酒煎服 梅師方同	治忽患崩中血不止結作血片如雞肝色碎爛	芎藭 十二分 阿膠 青竹茹 各八分 續斷 地榆 小	薊根 各十分 當歸 六分 生地黄 伏龍肝 各十分



右用水九升煮取三升去滓分作三服先服此藥後服補藥圓子			
阿膠	鼈甲	川芎	當歸
赤石脂	丹參	各六分	
續斷	甘草	鹿茸	龍骨
各五分		十一分	
龜甲	地榆	十分	
榆	烏賊骨	八分	
右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下二十圓日二服常煮小薊汁服之尤佳			
治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立			
欽定四庫全書			
婦人大全良方			
芍藥	白芷	黃耆	龜甲
川芎	烏賊骨	各八分	
乾地黄	牡蠣	五色龍骨	乾薑
各十分		桂心	
附子	炮	五箇	
右為細末空心酒調方寸匕			
又一方			
白芷	牡蠣	龍骨	芍藥
赤石脂	阿膠	當歸	
川芎	鼈甲	烏賊骨	人參
各六分		艾葉	
乾地黄	呵子	乾薑	黃耆
各五分		分	



右為細末空心酒調方寸匕	竹茹圓 治婦人崩中赤白帶下 鄧元老方	當歸 白朮 青木香 蠶蛻 煨 墨棕刷 煨 穿山	甲 煨各 地榆 竹茹 川芎 白茯苓 粉草	血餘 煨 牡蠣 煨 綿子 煨各 熟地黃 四兩 赤石脂 兩煨三	右七味煨藥用綿子裹定入瓶子內用鹽泥固濟用	炭則半煨存性却同前藥碾為細末煉蜜圓如梧桐	子大每服四十圓空心溫酒吞下	欽定四庫全書 婦人大全良方	經驗方治崩暴下血	百草霜 二錢 狗膽汁一處拌停分作兩服當歸酒調下	如聖無比散 治血山崩	晚蠶沙 一兩 伏龍肝 半兩 同為細末酒調二錢匕	千金治崩中去血不止千金翬無茅根	白茅根 二斤 小薊根 五斤 一方無小薊根	右二味細切用酒五升煮取四升去滓分溫四服	婦人崩中無問久近悉皆治之



伏龍肝 一斤 小薊根 桑寄生 續斷 地榆 艾	葉 各三兩 阿膠 當歸 赤石脂 厚朴 各二兩 生薑	五兩	右十味切以水一斗煮取三升絞去滓分作三服忌如	常法	崩中帶下方論第十六 凡三十方	論曰崩中帶下者何答曰其患有五夫病之中人皆有	受處因起之候湏盡心講究竊尋方書惟言帶下有色	欽定四庫全書 婦人大全良方	之與形此不參先賢醫中之理也且五崩是婦人極重	之患療之最難後之學者莫識其源殷幼習醫方濟衆	服餌當極濟人之道徧以思慮於茲彌久其功頗有精	妙夫此病者起於風氣寒熱之所傷或產後早起不避	風邪風邪之氣入於胞門或中經脉流傳臟腑而發下	血名為帶下若傷足厥陰肝之經其色則青如泥色若	傷手少陰心之經其色赤如紅津若傷手太陰肺之經	其色則白形如涕若傷足太陰脾之經則其色黃如爛



瓜若傷足少陰腎之經則其色黑如衄血此為其因也
問曰風邪氣之所中是人皆受之何為婦人獨患此
病答曰五臟六腑男女雖同其中細微各有差別緣婦
人有胞門子臟風冷中之則為所病若男子則為他病
矣 又問何以名為帶下復有冷熱者何答曰脉有數
經名字不同奇經八脉有帶在腰如帶之狀其病生於
帶脉之下其有冷熱者即隨其性也又號崩中者二帶
之下別名也諸君子有留心於醫存志備急者以此推
之萬不失一

欽定四庫全書

婦人大全良方

崩中漏下生死脉方論第十七

論曰夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脉虛損
故也衝脉任脉為經脉之海皆起於胞內而手太陽小
腸之經也手少陰心之經也此二經上為乳汁下為月
水婦人經脉調適則月水依時若勞傷衝任氣虛不能
制其經脉血非時而下淋瀝而不斷謂之漏下也 致
五臟傷損五臟之色隨臟不同若五臟皆虛損者則其



色隨血下診其脉寸口弦而大弦則為藏大則為菀藏 則為寒菀則為虛虛寒相搏其脉為牢婦人即半產而 漏下又云尺脉急而弦大風邪入少陰之經女子漏自 下赤又漏下赤白不止脉小虛滑者生脉大緊實數者 死也又漏血下赤白日下血數斗脉急疾者死遲者生 也又云尺寸脉虛者漏血漏血脉浮不可治也 若經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少氣臍腹冷極 則汗出如雨尺脉微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
氣不能固可炙關元百壯 在臍下當 宜鹿茸圓									
鹿茸 燎去毛 赤石脂 禹餘糧 製各 艾葉 栢葉 酥炙									
附子 炮各 熟地黄 洗 當歸 續斷 各二 半兩									
右為細末酒糊圓如梧桐子大空心溫酒下三十圓									
栢葉散 治婦人崩中漏下不問年月遠近									
栢葉 續斷 川芎 當歸 生乾地黄 龜甲 鼉甲 各一 禹餘糧 二兩 阿膠 赤石脂 牡蠣 兩半									
地榆 艾葉 鹿茸 各一									



右為末每服二錢食前粥飲調下 一方有丹參如 鹿茸數煉蜜圓如梧子大每服三四十圓空心溫酒 吞下	益母草散 治赤白惡露下不止	益母草開花時採陰乾為細末空心溫酒調二錢 日三服	療帶下赤白年月深久不差	乾薑^半 白芍藥^二 兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右各炒黃色同為末空心米飲調二錢日兩服	張氏方	乾薑 芍藥^等 分 又云加香附子^等 分 甘草^減 半	各炒黃色同為末空心米飲調下方寸匕	白芷散 治婦人赤白帶下	白芷^一 海螵蛸^二 兩 燒 胎髮^一 箇 煨 一團	右為細末空心溫酒調下二錢	乳香散 治赤白帶下



草菓 一箇去皮入乳香一小塊用麪餅裹火炮焦黃留性取出和麪用之	右為細末每服二錢陳米飲調下 重者三錢	破故紙散 治赤白帶下	破故紙 石菖蒲 等分並剉炒	右為末每服二錢用菖蒲浸酒調溫服更入斑猫五	分 去翅頭足糯米同炒黃去米	搐鼻香 治子宮久冷赤白帶下	牡蠣 煨 黃狗頭骨 煨 紫梢花 韶腦 母丁香	欽定四庫全書 婦人大全良方	蛇床子 破故紙 桂心 等分	右為細末煉蜜圓如雞頭大臨事用一粒	白礬圓治婦人血臟久冷赤白帶下補虛進食暖血海	北礬 四兩 大附子 二兩 黃狗頭骨灰 四兩	右為末粟米粥為圓如梧桐子大每服三十圓醋湯	吞下或飯飲亦可空心日三服忌生冷毒物	伏龍肝散 治婦人赤白帶下久患不差肌瘦黃瘁多	困乏力



棕櫚 不以多少燒灰火然 伏龍肝 於鍋竈直下去 屋梁上塵 懸長者如無以竈頭虛空中	右三味等分礮和令停入龍腦麝香各少許每服二	錢溫酒調下淡醋湯亦可患十年者半月可安 一親戚婦 人年四十五經年病崩漏不止面黃肌瘦髮黃枯槁 語言聲嘶服諸藥無效召僕診之六脉微濡問之服 何藥云凡是當歸川芎滋血諸品丹藥服之皆不 作效僕遂合博濟方伏龍肝散兼白礬圓服之愈	茯苓散 治婦人血海不調因虛冷成積經絡無定赤	白帶下崩中不止面色痿黃胎氣多損 三方出博濟	欽定四庫全書 婦人大全良方	白茯苓 青木香 杜仲 菖蒲 乾地黄 栝 子仁 秦艽 青皮 兔絲子 訶子皮 當歸	艾葉 青石脂 五加皮 牛角鯁 烏賊骨 等分 右為末每日空心以糯米粥一盞將一匙粥攤溫抄	藥一錢相和喫下後喫餘粥或有胎息用鯉魚糯米	粥下 治冷白帶下 桑寄生 芍藥 栝葉 各四分 桑耳 禹餘糧 各六分



吳茱萸 乾地黄 各八分 烏賊骨 五分	右為細末空心用飯飲調下二錢匕	治白崩中不絕	牡蠣 禹餘糧 鼈甲 各六分 黃皮 阿膠 烏賊	骨 續斷 白芷 各四分 當歸 赤石脂 各六分 白石	脂 龍骨 各五分	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心溫酒下	治帶下	欽定四庫全書 婦人大全良方	茅花 一握 棕櫚炭 三寸 嫩蓮葉 三張 甘草節 一錢	右為細末空心酒調方寸匕	治赤白帶下骨立者 崔元弼方	地榆 一斤 用水三升煮至一半去滓再煎如稠餳	絞濾空心服三合日二服	聖惠方治漏下五色亦治嘔血	地榆 三兩 木草 注云地榆主帶下十二病一日	餘缺五日子藏堅六日子門僻七曰合陰陽患痛 八曰小腹寒痛九日子門閉十日子宮冷十一曰



夢與鬼交十 曰五臟不足 用醋一升煮十餘沸去滓食前稍	熱服一合	治婦人漏下不斷方	亂髮皂莢水洗 燒為細末空心溫酒調下一錢	又一方 鹿角燒灰細研食前溫酒調下二錢	又一方 桃仁燒灰細研食前溫酒調下二錢	千金溫經湯 治女人曾經小產或帶下三十六病腹脹	唇口乾日暮發熱小腹急痛手足煩熱大腑不調時時	欽定四庫全書 婦人大全良方	泄利經脈不調久不懷孕	吳茱萸三兩 白芍藥 當歸 芎藭各二兩 麥門冬去心	半夏各二兩 人參 阿膠炒粉 牡丹皮去心 甘草 桂心	各一兩	右為粗末每服三錢水一盞薑五片煎七分去滓空	心食前溫服忌生冷羊肉生葱海藻菘菜等 千金	方同	紫金散 治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不斷



腰腹重痛凡是五色帶疾並皆治之 男六德續添	禹餘糧 煨赤驢醋中淬如此者七 次細研水飛搗乾秤三兩 赤石脂 煨 龍骨	煨石器研 白芍藥 川芎 附子 熟地黄 當	各一兩 歸 各一兩 乾薑 炮 肉桂 各半兩	右為細末每服二錢入麝香少許米飲調下空心食	前一日二服	文仲治婦人崩中漏下青黃赤白使人無子方	禹餘糧 煨 赤石脂 煨 牡蠣 煨 桂心 烏賊骨 去皮 伏	欽定四庫全書 婦人大全良方	龍肝 炒研	右等分為末溫酒調下方寸匕日二服忌生葱	又一方	鹿茸 酥炙 當歸 各二兩 蒲黃 半兩炒	右三味為末溫酒調下五分匕日三服	又一方京墨為末二匕若燒露蜂房為末三指撮酒調服	又一方常灸猪腎食之	千金療婦人白崩中方



乾地黄兩四 芎藭 阿膠 桂心 赤石脂 小蘗	根各二 伏龍肝七枚如雞子大 右七味切以酒六升水四升煮取三升去滓入膠令	洋分為三服日三服千金翼有白馬通汁二升用白石脂	沉香牡丹圓 治婦人血海久虛經候不利赤白帶下	血氣衝心多發刺痛四肢困煩博濟方	沉香三 牡丹皮去 赤芍藥 當歸 桂心 川芎	黃耆去蘆蜜炙 人參 茯苓 山藥 白芷 橘紅	欽定四庫全書 婦人大全良方	吳茱萸炮七次炒 白巴戟去 木香 牛膝酒洗去苗 枳殼去瓢	去瓢 肉豆蔻 製厚朴 生乾薑 白龍骨各半兩	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓空心溫酒	下若心腹痛煎白芷酒下	廣濟治帶下病方	芍藥七兩熬令黑 為末每服三錢匕以酒調下	千金治帶下方脉數者可用	枸杞根一斤 生地黃五斤



右二味以酒一斗煮取五升分為三服 白芷暖宮圓 暖血海實衝任治子宮虛弱風寒客滯 因而斷緒不成孕育及數嘗墮胎或帶下赤白漏下五 色頭目虛暈吸吸少氣胃腹苦滿心下煩悸臍腹刺痛 連引腰背下血過多兩脇牽急嘔吐不食面色青黃肌 膚瘦瘁寢常自汗	禹餘糧製一兩 白薑炮 芍藥 白芷 川椒製 阿膠 粉製 艾葉 川芎各三分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服四十圓米飲下或 溫酒醋湯亦得常服溫補胞室和養血氣光澤顏色 消散風冷退除百病自成孕育性平不熱	竹茹圓 治婦人赤白帶下方見崩暴下血不止方	地黃圓 治婦人月經不調每行數日不止兼有白帶	漸漸瘦瘁飲食少味累年無子麗安常方	熟地黃一兩一分 山茱萸 蕪荑仁各一兩 乾薑三分 白芍	藥微炒 代赭石各一兩 白殭蠶 厚朴各三分



右為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心溫酒下五十
 圓日三服許學士云凡婦人有白帶是第一病令人
 不產育宜遠治之此扁鵲過邯鄲聞貴婦
 人有此病所以
 專為帶下醫也

婦人白濁白淫方論第十八

論曰夫婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養水火
 不升降或由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅
 在陰陰為洩便之道胞冷腎損故有白濁白淫宜服局
 方金鑠正元丹或因心虛而得者宜服平補鎮心丹降

欽定四庫全書

婦人大全良方

心丹威喜元若因思慮過當致使陰陽不清濁相干
 而成白濁者然思則傷脾故也宜用四七湯吞白圓子
 此藥極能分利方見簡
 易方更宜小烏沉湯每貼加茯苓一
 錢重益智二十枚去殼碾鹽煎服

薑黃散 治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔

片子薑黃二兩大附子炮一兩赤芍藥 柳桂 紅藍

子 三稜各半兩牡丹皮 芫花醋浸炒木香 郁李

仁 皮沒藥各一分



右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥為末以水七分酒三分同煎至七分熱服		婦人天癸過期經脉不調方論第十九		許學士云婦人天癸過期而經脉不調或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損七益謂女子七七數盡而經脉不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善宜服當歸散		當歸 川芎 白芍藥 黃芩 白朮 各半兩 山茱		欽定四庫全書 婦人大全良方		莢肉 半兩		右為細末空心食前溫酒調下二錢日三如冷者去黃芩加桂心一兩		茱萸鹿茸圓 補氣固血治本臟因虛生寒月經行多或來不及期腹痛怯風臟腑不和		鹿茸 五味子 蓯蓉 杜仲 赤石脂 各一兩 吳茱萸 附子 乾薑 黑龍骨 肉豆蔻 白茯苓 各半兩 乾地黄 半兩	



右為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大空心食前熱 米飲吞下五七十圓一月後血氣已安 去龍骨加沉香半兩可	以常服中年已後婦人最宜服此藥	婦人血分水分腫滿方論第二十	夫婦人腫滿若先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不	通名曰血分水化為血血不通則復化為水矣宜椒仁	圓若先因小便不利後身面浮腫致經水不通名曰水	分宜服葶藶圓	欽定四庫全書 婦人大全良方	治血分椒仁圓	椒仁 甘遂 續隨子去皮 附子 郁李仁 黑	牽牛 五靈脂碎之 當歸 吳茱萸 延胡索各半	兩 芫花醋浸一宿炒黃 石膏各一分 信砒 膽礬各一錢 斑猫	糯米炒黃 去米不用 蜆青各三十枚去頭	右為細末麪作糊為圓如豌豆大每服一圓橘皮湯下	治經脉不利即為水水流走四肢悉皆腫滿名曰血分	其候與水相類醫作水治之非也宜此方 養生必用方



人參 當歸 大黃 濕紙裏三斗米下 桂心 瞿	麥穗 赤芍藥 白茯苓 各半 葶藶 炒別研	右為末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下十五圓至	二三十圓	葶藶圓 治水分 王氏指迷方	葶藶 炒刑 續隨子 去殼各半兩研 乾笋末 一兩	右為末棗肉圓如梧桐子大每服七圓煎扁竹湯下	如大便利者減續隨子葶藶各一分加白朮半兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	又有腸覃臃脹脾氣血氣血蠱水蠱石蠱血癭 此數證亦與腫	相 並見後拾遺門 出三十四卷	婦人大全良方卷一



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷三

詳校官太醫院醫官臣姜晟
編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒
校對官中書臣葉蘭
胥錄舉人臣張護



欽定四庫全書

婦人大全良方卷二

宋 陳自明 撰

衆疾門

經脉不調衆疾
生焉故以次之

極一方總論第一

夫天地造端於夫婦乾坤配合於陰陽雖清濁動靜之
不同而成象效法之有類原茲婦人之病與男子不同
者亦有數焉古方以婦人病比男子十倍難治不亦言
之深乎但三十六病產蓐一門男子無之其餘外傷風
暑寒濕內積喜怒憂思飲食房勞虛實寒熱悉與丈
夫一同也依源治療可得而知之

產寶方論第二

古書治婦人別著方論者以其胎妊生產崩傷之異况
婦人之病比之男子十倍難療盖女子嗜慾多於丈夫
感病倍於男子加之慈戀愛憎嫉妬憂恚染着堅牢情
不自抑所以為病根深治之難差况懷胎妊娠而挾病

欽定四庫全書

婦人大全良方



也不特避其毒藥仍須審其虛實冷熱而調治之無使
妄投湯劑以致夭枉

博濟方論第三

夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞
傷血氣則風冷乘虛而干之或作之於經絡或循入於
腹中內受風邪脾胃虛弱故不能消於飲食也食既不
充榮衛凝滯肌膚黃燥面不光澤若大腸氣虛則變為
下利若流入關元致絕子嗣隨其所傷而變成疾醫經
曰凡婦人三十六種病皆由子臟冷熱勞損而挾帶下
起於胞內也是故衝任之脉為十二經之會海婦人之
病皆見手少陰太陽之經而候之

冠宗奭論第四

治婦人雖有別科然亦有不能盡聖人之法者今豪足
之家居奧室之中處帷幔之內復以帛幪手臂既不能
行望色之神又不能殫切脉之巧四者有二闕焉黃帝
有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色

欽定四庫全書

婦人大全良方



澤已浮謂之易已形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以為診法若患人脉病不相應既不得見其形醫人止據脉供藥其可得乎如此言之烏能盡其術也此醫家之通患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁遂謂醫業不精徃徃得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯之色尚不肯信况其不得見者乎嗚呼可謂難也已

通用方序論第五

欽定四庫全書

婦人大全良方

夫通用方者蓋產前產後皆可用也或一方而治數十證不可入於專門皆是名賢所處世之常用有效之方雖曰通用亦不可刻舟求劍按圖索驥而膠柱者也
加減四物湯 治婦人經病或先或後或多或少疼痛不一腰足腹中痛或崩中漏下或半產惡露多或停留不出妊娠腹痛下血胎不安產後塊不散或亡血過多或惡露不下服之如神 張聲道云此方治婦人百疾只是四物湯加茱萸煎服若陽臟少使茱萸若陰臟多



使茱萸吳興周端仁郎中頃赴省試照矚一鄰案出場 云某本醫家凡婦人百病只是四物湯加茱萸無不效 者謹以此為報	徐明仲方 加香附子	當歸 白芍藥 川芎 陸氏云川芎減半 生乾地黃 洗焙	必用方熟者和劑亦然本草云男子宜熟者女子宜生者合用生者為是	右等分為粗末每服四錢水一盞半煎至八分去滓	取六分清者帶熱服食前 若平常血氣不調及常	服只用本方日二三服 治經血凝滯腹內血氣作	欽定四庫全書 婦人大全良方	疼加莪茂官桂等分用之 王碩膚云熟地黃滯血安能止痛不若用五味子代之	如因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生薑煎	若胎動不安下血每服加艾葉五七片更加葱白	阿膠末減四味之半當歸用小半如疾勢甚者以四	味各半兩細剉以水四盞熟艾一塊如雞子大阿膠	五七片煎至二盞半去滓分作四服一日令盡 一方有粉	草乾薑 日二三服至二臈 以一七日為一臈 以前產後每日	可一二服 如氣虛弱血海不調服一月不妨 如



產後被驚氣滯種種積滯敗血一月內惡物微少敗	血作病或脹或疼胸膈脹悶或發寒熱四肢疼痛加	延胡索沒藥香白芷與四物等分為細末淡醋湯或	童子小便酒調下 如血風於產後乘虛發作或產	後傷風頭痛發熱百骨節痛加荊芥穗天麻香附子	石膏藿香各一分四物料共一兩中加之每服三錢	水一盞煎七分服 如虛熱心煩與血相搏口舌乾	渴欲飲水者加栝樓根一兩麥門冬 _{去心} 三分 如腹	欽定四庫全書 婦人大全良方	刺痛惡物不下加當歸芍藥一分 如血崩不止加	熟地黃蒲黃各一兩 嘔逆加白朮人參各半兩	如寒熱往來加炮了乾薑牡丹皮各一分 因熱生	風加川芎一分柴胡半兩 腹脹加厚朴枳實各一	分 身熱脉數頭昏項強加柴胡黃芩各半兩 如	臟腑滑泄加桂心附子 _{炮熟} 各一分 若虛煩不睡加	竹葉人參各一分 煩躁引飲頭痛大渴加知母石	膏各半兩若水停心下微吐逆加朮猪苓防己各三



分同煎 若平常些少虛眩肢體瘦倦月信不調只用生薑薄荷如常煎服 此是婦人常服之藥蓋味寡而性緩效遲而功深	方治婦人血虛心腹疔痛不可忍者去地黃加乾薑	名四神湯 治老人風秘加青皮等分煎服 一方	治小便澁大便秘加大黃桃仁去皮尖炒黃減半煎	一方治血痢不止加阿膠艾葉煎 陳氏方治痢疾腹痛難忍以此	名六物湯 一方治婦人腹痛作聲經脈不快加熟地黃一倍添桂心半倍煎治瘡疾加荊芥酒煎常服 一方	欽定四庫全書 婦人大全良方	添柴胡名五神湯柴胡大能補虛退虛熱 一方以	四物湯共四兩為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心	米飲下三四十圓以療年高婦人白帶又良驗也請	詳用之 一方四物湯共四兩加甘草半兩細末煉	蜜為圓每兩作八圓酒醋共半盞溫湯同化調停下	名當歸煎去敗血生好血如人行五里再進一圓無	時候 用生地黃為正 此藥不知起於何代或云始自魏華佗	按巢氏云佗之術精微方類單省傳稱佗術鍼灸不



過數處千金方云自三代以來醫方論藥未有如此
 詳條者其間有漢晉名公諸方今產寶方乃朱梁時
 節度巡官咎膺所撰其中有四物散國朝太平興國
 中修入聖惠方者數方自後醫者易散為湯雖無傑
 特之功但善用者若馭良馬以意驅策之則隨意無
 所不至自可珍也自皇朝以來名醫於此四物中
 增損品味隨意虛實寒燠無不得其效者然亦非
 止婦人之疾可用而已

欽定四庫全書

婦人大全良方

懷娠產前後加減良方

川芎洗 當歸 桂心不見火 白芍藥洗

右四味各為細末取淨一兩各隨病證加減用

產前初覺胎動川芎芍藥各半錢米飲下 臨產腹

痛甚川芎芍藥當歸各半錢桂末一錢溫酒下扶產

後惡露未快川芎當歸各半錢童子小便調下仍時

時打醋炭令香不絕則血脉自收安樂無病切不可

妄投藥恐逐血過多則心虛氣劣三日內只服當歸



欽定四庫全書		婦人大全良方		錢童子小便調下心曾煩悶當歸芍藥各一錢童子	一盞煎至八分溫服 腹痛當歸末一錢桂心末半	半錢童子小便調下未滿月已滿月四味各半錢水	錢童便調下 產後頭昏目暈川芎芍藥當歸末各	服補藥補得太早則留住惡血 纔平善四味各半	芎末各一錢童子小便或米飲調下 七日外方可	理中圓空心童子小便吞下 七日內補虛當歸川	川芎末各一錢童便調下日三服三日後只服四順
佛手散		治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾纔產了		未進別物即先服此藥能除諸疾逐敗血生新血	川芎 ^二 兩 ^三 當歸 ^三 兩 ^三		右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七分溫服		一方為粗末每服四錢水七分酒三分同煎至七分		熱服將產前先安排此藥將兩服藥末煎之產了速



進之三日內日二服三日外日一服 一方名芎歸	湯只是此二味等分咬咀水煎專治失血傷胎去血	產後去血崩中去血金瘡去血拔牙去血不止及一	切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事頭重目暗舉	頭欲倒悉能治之若產後眩暈宜加芍藥服之一	名桂香散治產後腹疼不可忍者加桂心等分酒與	童子小便合煎服之立效 一名當歸湯治妊娠子	死或未死胎動不安每服用酒水合煎連進數服胎	欽定四庫全書	婦人大全良方	若已死服之便下若未死其胎即安此經累效萬不	失一 一名琥珀散臨月服之則縮胎易產兼治產	後諸疾 一名羊肉湯治虛損羸乏腹中疝痛往來	寒熱吸吸少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服	用精羊肉一兩薑十片水二盞煎至六分溫服 一	名君臣散治婦人室女心腹疝痛經脉不調用水煎	服若妊婦胎氣不安產後諸疾加酒煎服 一名芎	當散治婦人血氣上喘下腫二味等分為細末每服



二錢空心煎艾湯調下 又治產後損身血衝心及	腹脹氣絕者神驗 難生倒橫子死腹中先用黑豆	一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥末四錢煎	至一盞以上分為二服未效再作 產後惡血注心	迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁半合煎	服 又此藥兼治臟毒每服一錢半入炒槐花末半	錢水一盞煎至六分無時候服三日取下血塊即愈	如產後頭痛加荊芥煎 如吐血亦宜服	欽定四庫全書 婦人大全良方	論丹參散主治 出明理 方論	四物湯婦人多用者以其不問產前產後經水多少皆	可通用惟丹參散一味其主治頗相類何者以其能破	宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經脉大類	當歸地黃芍藥川芎也	丹參散 治婦人經脉不調或前或後或多或少產前	胎不安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞暖脊痛骨	節煩疼



丹參 不以多少
去土切

右為細末每服二錢溫酒調下經脉不調食前服冷

熱勞無時候服

勝金圓

一方名不換金圓治婦人諸虛不足
心腹疼痛一名勝金丹有沉香

治婦人从

虛無子產前產後一切病患兼療男子下虛無力此藥

能安胎催生妊娠臨月服五七圓產時減痛婦人無子

是子宮冷如服二十圓男女自至又治積年血風脚手

麻痺半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結

欽定四庫全書

婦人大全良方

痛吐逆心痛子死腹中遶臍痛氣滿煩悶失蓋汗不出

月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中風不

語口禁產後痢疾消渴眼前見鬼迷運敗血上衝寒熱

頭痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無度血痢不止飲食無

味產後傷寒虛煩勞悶產後血癖產後羸瘦凡婦人衆

疾不論年月日深並皆治之

白芍藥

藁本

石脂

赤白
皆可

川芎

不見
火

牡丹皮

當歸

白茯苓

人參

白薇

白芷

桂心



延胡索 白朮 沒藥 甘草
炙 江西安撫司
沒藥 甘草減半
右十五味等分為細末煉蜜為圓如彈子大每服一
圓溫酒化下初產了並用熱醋湯下空心食前 此
方係王承宣臺祖傳渠家凡婦人懷身便服此藥甚
神妙常服尤好係在京師於能家傳到

金釵煎 專治婦人諸疾產前產後風虛痼冷手足

痺豆淋酒化下血風頭痛產後中風荊芥酒化下產前

產後痰涎咳嗽桑白皮湯下經脉不調或前或後或多

欽定四庫全書

婦人大全良方

或少血氣攻刺腰脇重痛溫酒化下經脉不通產後血

喘蘇木人參煎湯化下血崩不止赤白帶下側栢燒灰

調酒下姙娠將理失宜或因驚動痛極妨悶漏胎下血

膠艾煎湯化下臨產艱難乳香研酒化下子死腹中胎

衣不下用朴消三錢重研細童便和酒化下產後勞倦

傷敗血氣如瘧寒熱遍身疼痛喘嗽盜汗地黃烏梅煎

湯化下產後敗血浮腫薑汁少許和酒半盞化下產前

服之則安胎臨產亦易產產後則逐去惡血不生諸疾



用童便和酒化下常服活血駐顏大暖血海升降陰陽		滋養榮衛或子宮久冷多病少子能久服之見效立致		忌生冷油膩魚腥猪母白猪一切毒物		當歸 白芍藥 川芎 石斛 酒炒 香附子 炒 糯米		各二兩 炒 降真香 剉細 熟地黃 各四兩 秦艽 貝母 去心 羌活		桂心 粉草 乾薑 炮 北細辛 牡丹皮 大		豆卷 炒 茴香 炒 枳殼 去穢炒 延胡索 白芷 各一兩 人		參 木香 石膏 煨 沉香 黃芩 各半兩 川椒 三分 交		欽定四庫全書 婦人大全良方		加 修製 八兩		右為細末煉蜜為圓每兩作七圓依前服餌常服溫		酒化下 檀峯曉公方		交加散 治產前後百病治婦人榮衛不通經脉不調		腹中撮痛氣多血少結聚為瘕產後中風尤妙		生地黄 一斤研取自然汁 生薑 十二兩研取自然汁		右將地黄汁炒生薑滓薑汁炒地黄滓各稍乾焙為		細末每服三錢溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後尤	



不可缺		交加散 治榮衛不和月經湛濁大能滋養血絡逐散		惡血臍腹撮痛腰腿重墜血經諸疾並皆治之		生薑 十二兩 生地黄 一斤 二味 製度如前法 白芍藥 延胡索		醋紙裏煨令熟 用布揉去皮 當歸 桂心 各一兩 紅花 炒無惡 沒		藥 別研各 蒲黃 一兩隔 紙炒		右為細末每服二錢溫酒調下如月經不依常蘇木		煎酒調下若腰疼用糖毬子煎酒調下無時候		欽定四庫全書 婦人大全良方		玉露通真圖 治婦人諸疾 出經驗婦人方		半夏 薑汁 製炒 人參 各半 食茱萸 醋製厚朴 各兩 澤蘭		葉 二兩 甘草 蟬蛻 炒 白芍藥 石膏 蚕蛻 炒 用		如無以蚕繭 紙三張代 白朮 當歸 羌活 熟地黄 洗白		茯苓 各二兩 防風 乾薑 栝子仁 蒼朮 白薇		木香 黃耆 川牛膝 附子 白蕪荑 與蟬 蛻同		炒然此方無蟬蛻 想馬鳴蛻是也 川芎 藁本 各一兩 川椒 苦梗		各三兩 白芷 一兩	



右為細末煉蜜為圓每九錢重分作十圓切記煉蜜	無令太過及生 男子婦人諸虛不足狀如勞疾黃	耆煎酒下 血氣痛燒秤鎚淬酒下 產前安胎用	醋湯下 產後諸疾用酒或鹽湯下 產前產後瀉	用米飲送下 男子婦人牙疼用半圓揩疼處良久	鹽湯嚥下 產前產後血悶用童子小便送下 經	脉不調用紅花煎酒送下 產後風毒生瘡疥荊芥	茶下 冷痰翻胃醋心乾嚼下 婦人子宮久冷崩	欽定四庫全書 婦人大全良方	漏赤白帶下用童子小便米醋好酒一處煖熱下	補中圓常服	川芎 白芍藥 黃耆 當歸 人參 陳皮 各半	兩 白朮 地黃 各一兩	右為末煉蜜圓如梧子大每服五七十圓溫水下	二聖散產前服之則安胎產後惡血不盡胎衣不下方	川芎 羌活 二味等分	右為細末每服二大錢水七分盞酒少許煎七沸溫



服	二聖大寶琥珀散	生地黄 一斤二味修製 生薑 如前交加散 當歸 川芎 牡	丹皮 芍藥 莪茂 蒲黃 香白芷 羌活 味八	各 炒 桂心 不見火 熟地黄 炒	右十味各一兩同前二味為細末於甕合內收之湯	使于後 婦人冷氣痛并血海不調膈氣炒薑酒下	二錢 產後胞衣不下暖酒調下二錢 產婦臨月	欽定四庫全書 婦人大全良方	日進三服則滑胎易產溫酒調二錢產後血犯心	眼見鬼神用童便半錢酒半盞同煎調二錢 婦人	以服則顏色紅白無血來相攻一生無子者以服則	有孕 此藥治療婦人百病空心日午食前日二服	產後百病並暖酒調下	朱翰林白朮煎 治婦人胎前產後血氣諸疾 出明理方論	木香 半分 三稜 莪茂 白朮 各一兩 枳殼 去穢數	白茯苓 當歸 延胡索 人參 熟地黄 洗 牡



丹皮 粉草 各半 兩	右為末米糊圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓	常服溫酒吞下湯使于后 胎前渾身并脚手痛炒	薑酒下 胎前腹內疼并安胎紫草煎酒下 胎前	嘔逆吐食糯米飲下 胎前飲食不得渾身倦怠豆	淋酒下 胎前渾身發熱甘草湯下 胎前咳嗽煨	薑鹽湯下 胎前頭痛煨葱茶下 胎前產後瀉紫	蘇薑酒下 催生胎衣不下嚼葱白三寸煖酒下	欽定四庫全書 婦人大全良方	產後赤白痢乾薑甘草湯下 產後下血不止燒紗	帽灰一錢調酒下 無燒漆亦可 產後渾身虛腫陳皮去白	焙乾浸酒下 頭疼薄荷茶下 常服飯飲下 赤	白帶下燒棕櫚灰三錢調酒下 以年血氣成塊築	心痛溫酒下炒薑酒下及良薑浸酒下皆可 婦人	室女經脉不通煎紅花蘼木酒下 經脉不調或前	或後或多或少煎當歸酒下 大小便秘結燈心煎	湯下 乳汁不行苦蘼煮猪蹄羹下 產後腰疼煎



芍藥酒下	沉香琥珀煎 益榮衛滋氣血經脉不調心忪倦乏腰	膝疼痛赤白帶下五心煩熱面無顏色血海久冷胎孕	不固增寒壯熱婦人諸疾並能治之	沉香 琥珀 研別 附子 炮 川芎 肉桂 五味子	石斛 去根切 辰砂 研 阿膠 各半 沒藥 研 續斷 蓯	蓉 酒洗 人參 當歸 牛膝 各三 木香 地黃 各一	右為末蜜圓如梧桐子大每服四十圓空心酒吞下	欽定四庫全書 婦人大全良方	日午再服	滋血湯 滋養榮血補婦人諸虛治血海久冷 二方並出 胡氏方	當歸 川芎 芍藥 人參 麥門冬 牡丹皮	阿膠 各二 琥珀 三分 酸棗仁 炒 粉草 桂心 各一	兩 半夏 一兩	右為粗末每服三大錢水一盞薑三片煎七分去滓	溫服一日三服	烏雞煎圓 治婦人百病 出三因方



吳茱萸 良薑 白薑 當歸 芍藥 延胡索	炒 椒 炒 陳皮 青皮 劉寄奴 生地黄 莪茂	川芎 各一兩 荷葉灰 四兩 北艾 二兩 破故紙 炒一兩	右為細末醋煑麪糊元如梧子大每服四五十圓	月水不通紅花蘓木酒下 白帶牡蠣粉酒下 子	宮以冷白茯苓煎湯下 赤帶建茶清下 血崩豆	淋酒調綿灰下 胎不安蜜和酒下 腸風陳米飲	調百草霜下 心疼菖蒲煎酒下 漏胎下血烏梅	欽定四庫全書 婦人大全良方	溫酒下 耳聾腦茶煎湯下 胎死不動斑猫三箇	煎酒下 腰脚痛當歸酒下 胞衣不下芸臺研水	下 頭風薄荷茶下 血風眼黑豆粉草湯下 生	瘡生地黄湯下 身體疼痛黃耆末調酒下 四肢	浮腫麝香湯下 咳嗽喘滿桑白皮湯下 腹痛芍	藥末調酒下 產前產後白痢乾薑湯下赤者甘草	湯雜者二宜湯常服溫酒醋湯任下並空心食前服	婦人大全良方卷二



欽定四庫全書

婦人大全良方卷三

宋 陳自明 撰

此一卷論中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口
眼喎斜風眩頭痛血風心神驚悸癲狂骨節痛風血風
走注瘙癢癰疹風痰脚氣腰痛諸疾已上諸症雖各有
方論亦要先明其大體察脉之虛實辨證之冷熱相人
之強弱入臟入腑在絡在經首以局方調治未要猛浪

欽定四庫全書

婦人大全良方

用藥今之治法先宜順氣然後治風萬不失一蓋有中
風中寒中暈中痰中氣皆能令人涎潮昏塞所謂朱紫
相凌玉石不分醫者不可不詳而究之如中風若作中
氣治之十愈八九中氣若作中風治之十無一生所以
疑惑之間不問中風中氣首以蘊合香圓麝香煎五積
散如中痰則有參蘊飲如中寒則有理中湯如中暈則
有白虎湯如的然見得是中風如三生飲木香煑散排
風續命風引大小竹瀝大八風湯至寶丹牛黃清心圓



辨其冷熱虛實而投之未有不妥者也然此疾積襲之
以非一日所能致今人服藥三五服便責無效其責醫
者亦速矣正宜大劑以服方有其效孟子曰七年之病
求三年之艾也

婦人中風方論第一

夫中風者虛風中於人也風是四時八方之氣常以冬
至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來者主長養
萬物若不從其鄉來者名為虛風賊害萬物人體虛者

欽定四庫全書

婦人大全良方

則中之當時雖不即發停在肌膚後或重傷於風前後
重沓因體虛則發入臟腑俞俞皆在背中風多從俞入
隨所中之俞而乃發病婦人血氣虛損故令中風也當
察口眼開闔以別重輕涎沫有無以明證治如眼開口
閉手足不開涎不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡
遺尿者死

至寶丹

蘓合香圓

五積散

加麝香煎

牛黃清心圓

和見

方劑

大八風湯

方見偏枯
第七篇



排風湯 治男子婦人風虛濕冷邪氣入藏狂言妄語 精神錯亂及風入五藏等證 詳見和劑方		白鮮皮 白朮 白芍藥 桂心 川芎 當歸		防風 杏仁 去皮尖 熬炒 甘草 各二兩 白茯苓 麻黃		去節獨活 各三兩		右咬咀每服三錢水一盞半生薑四片煎至八分去滓溫服無時候 癸丑春有一婦人年四十四五其證說話氣短足弱行得數步則口若含霜七十日內三次經行遇行則口中冷氣不相續有時鼻中熱則透心冷痛每行則口中冷氣不相續有時鼻中熱		欽定四庫全書 婦人大全良方		面赤翕然而熱身體不仁不能行步手足不隨不能俛仰冷痺骨疼有時悲傷夢與前夫相隨則上氣奄然而極心驚志意不定恍惚多忘却能食如此僅一年許醫者投熱藥則面翕然而熱氣滿胸中咽中窒塞悶絕投冷藥則瀉又一醫者以十全湯服之則發煩躁心驚而跳一醫者以饅和湯服之覺得面上與腹中甚如火燁心愈驚欲吐不吐大府秘裏急後重求僕診之六脉弦緩喜見於春此是可治之疾未供藥問忽然吐瀉瀉後覺肛門如火雖瀉六次却不多僕一時識證未盡且與俞山人降氣湯八服次日診之脉差有力云服藥之後覺鼻中熱心煩悶絕齒噤與參蘓飲八服黃連圓一兩許越三日云服藥之後其疾如故與茯苓補心湯服之皆無效僕以脉證詳之只有排風湯甚對此證或曰何以見得是此證一能食飲此風飢也二七十日三次經行此是榮經有風血得風散也三頭目眩暈此肝風也四面赤翕然	



而熱悲傷此心風也五身體不仁不能行步夢與前
 夫相隨此脾風也六手足不隨腰痛難以後仰冷痺
 骨疼此腎風也諸有此候令人心驚志意不定恍惚
 多忘真排風湯證也或曰風脉當浮今脉弦緩微弱
 恐非風也答曰風無一定之脉大抵此證虛極生風
 然排風湯所用之藥有十全大補湯料亦有平補之
 意却不僭燥供十服越三日云服之有效脉亦差勝
 只是心中如烟生似有微熱大便尚秘此真是風證
 再與排風湯十服兼牛黃清心圓皂角圓助之越三
 日云服前藥一二日大煩躁與熱諸證悉除只是足
 弱不能支持脉亦弱與秘傳降氣湯十服又越三日
 云諸證悉退只是夢裏虛驚大便滑泄如食傷相似
 奏厠頻數脉尚弱與五積散數服加人參塩煎菴感
 應元即愈自後云皆無恙矣但上重而頭眩不能以
 立从坐再與排風湯則脫然安矣以此
 方知要依古法不可杜撰臆度處方

欽定四庫全書

婦人大全良方

三生散 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉
 作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏
 或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉
 有神效

生南星

兩一

生烏頭

尖 去皮

生附子

各半兩 去皮

木香

一分

右咬咀每服半兩水二大盞生薑十片煎至六分去
 滓溫服或口噤不省人事者用北細辛皂角各少許
 為細末或只用半夏為細末用少許以蘆管吹入鼻



中俟噴嚏其人少甦然後進藥如氣盛人只用南星	五錢重木香一錢加生薑十四片煎作兩服飲之名	星香飲	參蘇飲 治痰飲停積胃中中脘閉塞嘔吐痰涎眩暈	嘈煩忪悸噦逆及痰氣中人停留關節手足譚曳口眼	喎斜半身不遂食已即嘔頭疼發熱狀如傷寒	人參 紫蘇葉 半夏 茯苓 乾葛 前胡 各三	分 甘草 木香 陳皮 枳殼 苦梗 各半兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右呔咀每服四錢水一錢半薑七片棗一枚煎七分	去滓空心溫服腹痛加芍藥	木香煮散 治左癱右瘓并素有風濕諸藥不效常服	調氣進食寬中 蘇沈良方言之甚詳	羌活 麻黃 去節各一兩 防風 三分 白朮 陳皮 黑附	子 炮 南木香 檳榔 牛膝 大川烏 炮 草豆蔻	連皮 杏仁 去皮尖 人參 白茯苓 川芎 當歸	甘草 桂心 各半兩



右咬咀每服四錢重水一大棧半生薑五片煎至八分去滓熱服大便不通加大黃心腹脹加苦葶藶滑石膈上壅滯咳嗽氣促加半夏川升麻天門冬知母 繆安人年六十五六忽然中風不省人事無汗有痰已辦後事衆醫以為不可治也召僕診之六脉浮緩脾脉溢關此真風脉也先投參蘘飲六服先寬氣下痰次以木香煑散而愈又享十年之壽	附子理中湯 治五臟中寒口噤四肢強直失音不語 昔有武士守邊大雪出帳外觀瞻忽然暈倒時林繼作隨行醫官灌以此藥兩劑遂醒	欽定四庫全書 婦人大全良方	大附子炮 人參去蘘 乾薑炮 甘草炙 白朮分	右細剉每服四錢重水一棧半煎七分去滓不以時	候服口噤幹開灌之 開慶己未年七月間裕齋馬觀文夫人曹氏病氣弱倦怠四肢厥冷惡寒自汗不進飲食一醫作虛寒治之投熱藥無效召僕診之六脉雖弱一醫作虛寒治之投熱藥無效召僕診之六脉雖弱而兩關差甚裕齋問曰此何證也僕荅曰以脉觀之六部雖弱而獨甚此中焦寒也中焦者脾也脾胃既寒非特但有是證必有腹痛吐瀉之證今四肢厥冷四肢屬脾是脾胃虛冷無可礙者荅云未見有腹痛吐瀉之證合用何藥治之僕荅曰宜用附子理中湯未服藥間旋即腹痛而瀉莫不神之神之即治此藥一差役而	差役而



加減小續命湯 治卒暴中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手足戰掉語言蹇澁肢體麻痺神情昏亂頭目眩重痰涎併多筋脉拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側及治諸風服之皆驗若治脚氣緩弱以服得差久病風人每遇天色陰晦節候變更宜預服之以防瘡	麻黃去根節 防己 人參去蘆 黃芩 桂心 甘草	白芍藥 川芎 杏仁各一兩 附子炮半兩 防風一兩半	欽定四庫全書 婦人大全良方	右咬咀每服五錢水一錢半薑七片棗兩箇煎至七分去滓不以時候服取汗隨人虛實與所中輕重有人脚弱服此六七劑得瘥 精神恍惚加茯神遠志骨節煩痛有熱者去附子倍芍藥心煩多驚者加犀角半兩骨間冷痛者倍用桂附 嘔逆腹脹者倍人參加半夏一兩 躁悶大便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎服 臟寒下利者去防己黃芩倍附子一兩加白朮一兩古今錄驗有白朮無杏仁 救急無芎藭杏仁



止十味 延年無防風 一云達失 便利產後失血并老人	小兒用麻黃桂心甘草各二兩 一法治或歌哭或	笑語無所不及用麻黃三兩人參桂枝白朮各二兩	無附子防風生薑有當歸一兩自汗者去麻黃杏仁	加白朮 脚弱加牛膝石斛各一兩 身疼痛加秦	芎一兩 腰疼加桃仁杜仲各半兩 失音加杏仁	一兩 春加麻黃一兩 夏加黃芩三分 秋加當歸四兩 冬加附子半兩	小風引湯	欽定四庫全書 婦人大全良方	防風 獨活 細辛 川芎 北五味子 白茯苓	苓 人參 白芍藥 白朮 甘草 等分	右咬咀每服三錢水一錢薑三片杏仁五箇去皮尖	槌碎同煎至七分去滓溫服 如加麻黃薏苡附子	當歸羚羊角六味 等分 即大風引湯	千金竹瀝湯 大治熱即生風	竹瀝 二升 生葛汁 一升 生薑汁 三合	右三味相和溫暖分三服朝晡夜各一服



必效竹瀝湯 治中風涎潮譫語昏塞四肢緩縱

秦艽 防風 獨活 附子

各一分

右咬咀以水四瓊煎至二瓊入生地黃汁淡竹瀝各半瓊再煎四五沸去滓分作四服無時熱服病勢去以他藥扶持未愈再作近世貴人用之多有神效

燒竹瀝法

新竹截尺許長去節作兩邊用兩磚對立相去八寸置竹仰在磚上急着焰火燒之磚外兩頭以椀盛瀝

欽定四庫全書

婦人大全良方

瀝盡以絹澄清夏秋湏沉冷水中以防瀝酸凡大熱有風人亦可單服冷暖隨人勿過度荆瀝亦然

婦人中風角弓反張口噤方論第二

夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽之經也人之陰陽經絡周環於身風乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀宜用小續命湯

方見前

活人書論曰婦人產後血虛多汗出喜中風身體強直口噤背反張作瘧治之屬太陽經先因傷風又感寒濕



而致然也古人謂之瘧病外證發熱惡寒與傷寒相似	但其脉沉遲弦細而項背反張強硬如發癰之狀此為	異耳 新產血虛多汗出 當察有汗無汗以分剛柔二瘧	無汗惡寒名剛瘧有汗惡寒名柔瘧 陽瘧屬剛瘧陰瘧屬柔瘧無汗葛	根湯主之有汗桂枝加葛根湯主之凡剛柔二瘧小續	命湯並可與之有汗者去麻黃加葛根若審知剛瘧者	曾滿口噤其人卧不着席脚攣急咬齒當行大承氣湯	注云外臺云熱而瘧者死熱病瘧者反折瘧瘵齒噤斷也 附朮湯 桂心白朮散	欽定四庫全書 婦人大全良方	附子防風湯 八物白朮湯 桂枝煮散可選而用之	解惑論云合面而卧為陰瘧仰卧者為陽瘧又云或因濕寒發汗多則發瘧也	葛根湯 治剛瘧無汗惡風 產後有疾凡用麻黃更宜斟酌	葛根 一兩 麻黃 二兩 去根節 各三 薑皮 分 桂枝 粉草 芍藥	各半 大棗 三 兩	右咬咀每服三錢水一椀煎七分去滓溫服取汗為	度	桂枝加葛根湯 治柔瘧有汗不惡寒



桂枝 芍藥 甘草 各六錢 乾薑 一兩 生薑 一兩 棗 四枚	右咬咀每服三錢水一錢煎七分去滓溫服取汗為度	大承氣湯 愚詳之產後難用此藥故不錄	附木散 治傷寒手足逆冷筋脉拘急汗出不止項強直搖頭口噤	附子 白朮 各一兩 川芎 三錢 肉桂 二錢 獨活 半兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末每服三錢棗二箇水一中錢煎至一半溫服	桂心白朮湯 治傷寒陰瘧手足厥冷筋脉拘急汗出不止	白朮 桂心 附子 炮 防風 川芎 甘草 各兩半	右咬咀每服五錢水二錢薑四片棗三枚煎八分去滓溫服	附子防風散 治傷寒陰瘧閉目合面手足厥逆筋脉



拘急汗出不止	柴胡 半一兩 五味子 白朮 各一兩 茯苓 甘草 乾	薑 附子 炮 防風 各三分 桂心 半兩	右為粗末每服三錢薑四片水一錢煎七分去滓溫服	服	八物白朮散 治傷寒陰瘧三日不差手足厥冷筋脉	拘急無汗恐陰氣內傷	白朮 麻黃 去根 茯苓 五味子 羌活 各半兩 附	欽定四庫全書 婦人大全良方	子 炮 桂心 各三分 良薑 一分	右為粗末每服四錢水一錢薑四片煎七分去滓溫服 凡用麻黃宜斟酌	白殭蚕散 治婦人中風角弓反張口噤不能言皮膚	頑痺筋脉抽掣	殭蚕 一兩 烏蛇肉 炙 天麻 獨活 南星 炮 川烏 炮	皮 防風 蟬蛻 洗 白附子 炮 犀角屑 朱砂 研 桑	尖 防風 蟬蛻 洗 白附子 炮 犀角屑 朱砂 研 桑	螵蛸 各半兩 麝香 一分



右為細末每服一錢溫酒調下無時候	烏蛇圓 治婦人中風牙關緊急手足頑麻心膈痰涎	壅滯	烏蛇肉 炙 天麻 白附子 炮 南星 炮各一兩 獨活 烏	犀屑 殭蚕 炒 全蝎 炒 半夏麴 麻黃 去根節 當歸	晚蚕沙 各半兩炒	右為細末煉蜜元如梧桐子大每服七元溫酒吞下	亦治角弓反張	欽定四庫全書 婦人大全良方	婦人中風口噤方論第三	夫婦人中風口噤者是體虛受風風入領頰夾口之筋	也手三陽之筋結入於領頰足陽明之筋上夾於口而	風挾冷乘虛入其筋則筋攣故引牙關急而口噤也	天南星散 治婦人中風口噤四肢拘急	天南星 薑汁炒黃 白附子 炮 黑附子 炮 烏蛇肉 酒炙 全蝎	等分炒	右為細末每服半錢以生薑汁溫酒調下無時拗開



口灌	走馬散 治婦人中風口噤四肢強直	黑附子 炮 天麻 各半 桂心 石膏 麻黃 去根節 蝎	梢 炒 川烏 炮去皮尖 南星 炮各一分 麝香 半分	右為細末入研藥令停每服一字無時豆淋酒調灌	烏蛇散 治婦人中風口噤	烏蛇肉 炙 全蝎 炒 天麻 南星 炮 殭蚕 各半兩炒 膩粉	分半	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末入膩粉令停每服一字以生薑酒調灌下	婦人中風不語方論第四	巢氏云脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉係舌	本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也喉嚨者氣之	所以上下也會厭者音聲之尸舌者聲之機唇者聲之	扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故	謂之中風失音不語經云醉卧當風使人發瘡	神仙解語丹 治心脾經受風言語蹇澁舌強不轉涎



唾溢盛及療淫邪搏陰神內鬱塞心脉閉滯暴不能言	白附子 炮 石菖蒲 去毛 遠志 去心甘草水炙十沸 天麻 全蝎	酒炒 羌活 白殭蚕 炒 南星 牛膽酸如無只炮各一兩 木香 半兩	右為細末煑麪糊為圓如梧桐子大量入辰砂為衣	每服二十圓至三十圓生薄荷湯吞下無時候	防風湯 治中風內虛脚弱語蹇	石斛 一兩半酒炒 乾地黄 杜仲 去皮切薑汁炒 丹參 各一兩一分	防風 川芎 麥門冬 去心 桂心 川獨活 各一兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右呶咀每服五錢水盞半棗二枚煎至八分去滓溫服	竹瀝湯 治中風入肝脾經年四肢不遂舌強語蹇	葳靈仙 附子 炮 苦梗 蔓荊子 防風 枳殼	去穢 川芎 當歸 各等分	右呶咀每服四錢水一盞竹瀝半盞薑三片煎至八分溫服日四服忌茶	婦人風痺手足不隨方論第五



夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而為痺風多者為風 痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起於手足而循行於身 體風寒之氣客於肌膚始為痺復傷陽經隨其虛處而 停滯與血氣相搏血氣行則遲緩使機關弛縱故風痺 而復手足不隨也									
三痺湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆療									
川續斷 杜仲 去皮切 防風 桂心 華陰細辛									
人參 白茯苓 當歸 白芍藥 甘草 各一兩									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
秦艽 生地黄 川芎 川獨活 各半兩 黃耆 川									
牛膝 各一兩									
右咬咀為末每服五錢水二錢薑三片棗一枚煎至									
一錢去滓熱服無時候但腹稍空服有人病左臂不									
隨後已痊平而手指不便無力試諸藥不驗服此藥									
纔半即安									
三五七散亦妙 方見局方不復贅錄									
婦人中風自汗方論第六									



尋古治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用麻黃令人不得慮虛凡以風邪不得汗則不能泄也然此治中風無汗者為宜若治自汗者更用麻黃則津液轉使脫泄反為大害中風自汗仲景雖處以桂枝湯至於不住發搐口眼瞤動遍身汗出者豈勝對治當此之時獨活湯續命煮散復榮衛却風邪不可闕也									
獨活湯 治風虛昏憤不自覺知手足棄縱坐卧不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
川獨活 羌活 人參 防風 當歸 北細辛									
茯神 _{去木} 半夏 桂心 白薇 遠志 _{去心} 菖蒲 _{去毛}									
川芎 _{各半} 甘草 _{三兩}									
右咬咀每服五錢水盞半薑五片煎七分去滓無時溫服									
續命煮散 治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼瞤動或時搐搦亡失津液渴欲引飲此能扶榮衛去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之									



防風 獨活 當歸 人參 細辛 葛根 芍	藥 川芎 甘草 熟地黄 半夏 遠志 去心 荊	芥穗 各半 桂心 七錢	右咬咀每服五錢水一錢生薑三大片煎至七分去	滓溫服不拘時汗多不止者加牡蠣粉一分半	婦人臂痛方論第七	論曰夫婦人臂痛筋脉攣急不得屈伸遇寒則劇由肝	虛為風寒邪氣流於血脉客於經絡搏於筋筋不榮則	欽定四庫全書 婦人大全良方	乾急而痛其脉緊細宜服栝子仁圓舒經湯若臂痛不	能舉或左或右時復轉移一臂由中腕伏痰脾氣滯而	不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而氣不下上	攻於臂故痛其脉沉細宜茯苓圓控涎丹	栝子仁圓 王氏指迷方	栝子仁 乾地黄 各二兩 茯苓 枳實 去穢 覆盆子	炒 北五味 附子 炮 石斛 去根切 鹿茸 酥炙 酸棗仁	炒 桂心 沉香 黃耆 各一兩 蜜水 各一方等分



右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心酒下三十圓 舒經湯 治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾	片子薑黃兩四 甘草 羌活兩各一 白朮 海桐皮	當歸 赤芍藥兩各二	右為粗末每服三錢水一錢半煎至七分去滓溫服 如腰以下疾空心服腰以上疾食後服	茯苓圓	茯苓兩一 半夏兩二 枳殼兩半 風化朴硝兩一	欽定四庫全書 婦人大全良方	右四味為末薑汁煮糊為圓如梧桐子大生薑湯下 二十圓食後服	控涎丹 凡人忽患曾背手足頸項腰跨隱痛不可忍 連筋骨牽引釣痛坐卧不寧時時走易不定俗醫不曉 謂之走疰便用風藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚 欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰涎伏在心膈上下 變為此疾或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲 食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流睡涎手脚重



則有似癱瘓		白芥子散 治臂痛外連肌肉牽引背胛時發時止此		由榮衛之氣循行失度留滯經絡與正氣相搏其痛發		則有似癱瘓		此藥不過數服其疾如失		圓如痰猛加至十圓		右為細末糊圓如梧桐子大臨卧淡薑湯吞下五七		甘遂^{去心}大戟^{去皮}真白芥子^{各等分炒}		隨冷痺氣脉不通誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但以	
流氣飲子		右為細末入研藥令停每服一錢溫酒調下		紫蘇葉 青皮 苦梗 大黃^煨 當歸 芍藥		烏藥 茯苓 川芎 黃耆 枳殼^{去穢炒} 防風^{各半}		甘草^兩 橘皮^{各三} 木香 連皮大腹^{二兩剉}		右咬咀每服五錢水二錢薑三片棗一枚煎一錢去		真白芥子 木鼈子^{各二兩} 沒藥^{別研} 桂心 木香		各半		欽定四庫全書 婦人大全良方	



滓服

婦人賊風偏枯方論第八

論曰賊風偏枯者是體偏虛受風風客於半身也人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半體名為偏風也其風邪入深真氣去邪氣留發為偏枯此由血氣衰損為風所客令血氣不相周榮於肌故令偏枯也

論曰夫偏枯者其狀半身不隨肌肉枯瘦骨間疼痛神智如常名曰偏枯僕原疾之由皆由陰陽偏虧臟腑怯

欽定四庫全書

婦人大全良方

弱經絡空虛血氣不足當風衝坐風邪乘虛而入疾從斯作內經云汗出偏沮使人偏枯詳其義理如樹木或有一邊津液不蔭注而先枯槁然後被風所害人之身體或有一邊血氣不能榮養而先枯槁然後被風所苦其理顯然王子享有云舟行於水人處於風水能泛舟而亦能覆舟風能養體而亦能害體蓋謂舡漏水入體漏風傷古人有云醫風先醫血血行風自滅是也治之先宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風湯增損茵



芋酒續斷湯		大八風湯 治中風偏枯失瘖半身不遂時復恍惚		當歸 杏仁去皮尖 甘草 桂心 乾薑各二兩 五		味子 升麻各兩 川烏炮去皮尖 黃芩 芍藥 獨活		防風 川芎 麻黃去節 秦艽 石斛去根切 人		參 茯神 石膏 黃耆 紫苑各一兩 大豆三兩 炒		右為粗末每服五錢水二盞酒一合煎至一盞去滓		欽定四庫全書 婦人大全良方		溫服恍惚者不用酒煎		增損茵芋酒 治半身不隨肌肉乾燥漸漸細瘦或時		痼痛病名偏枯		茵芋葉 川烏炮去皮尖 石楠葉 防風 川椒炒出汗		女萎 附子炮 北細辛 獨活 卷栢 肉桂		天雄炮去皮 秦艽 防已各一兩 躑躅花炒 當歸 生		乾地黄各二兩 芍藥一兩		右呶咀酒二斗漬之冬七日夏三日春秋各五日初	



服一合漸增之以知為度令酒氣相續 出指迷方	續斷湯 治偏枯少血	當歸 ^三 兩 陳皮 芍藥 北細辛 ^{各一} 兩 生乾地黄 ^二 兩	右為粗末每服五錢水二錢煎至八分去滓溫服臍	寒多利者入熟附子一兩和前藥	偏風口喎方論第九 凡五方	論曰偏風口喎者是體虛受風風入於夾口之筋也足	陽明之筋上夾於口其筋偏虛風因虛而乘之使其筋	欽定四庫全書 婦人大全良方	偏急不調故令口喎僻也	防風湯 治卒然口喎斜言語牽急四肢如故別無所	苦	防風 ^一 兩 羌活 ^半 兩 甘草 ^{一分}	右為粗末每服五錢水二錢煎至一錢去滓入麝香	研一字溫服	治口眼喎斜	用草麻子七粒去皮殼細研作餅安在手心 右喎安左手左



喝安 右手却用銅盂乘湯坐于藥上纔正即洗去一方用巴豆不 用草麻 出本草	廣濟療風著口面喝斜語聲不轉方 生地黄汁一升竹瀝一升獨活切三兩	右相和煎取一升頓服未正更進一劑	深師續命湯 療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起死神方	人參 防己 麻黃去根 芍藥 川芎 甘草	欽定四庫全書 婦人大全良方	黃芩 白朮各半兩 桂心 附子炮 防風各一兩 生薑五兩	右切以水一斗二升煮取三升分為三服不差復作忌海藻菰菜桃李生菜葱雀肉猪肉	又千金方	炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服 又方用大皂莢五兩去皮子為末以三年大醋調如左喝塗	右右喝塗左乾更塗



婦人血風心神驚悸方論第十									
夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為諸藏									
之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致									
風邪乘虛干之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變									
恍惚而憂懼也									
排風湯亦可用									
茯神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志									
去 茯神 木 人參 龍齒 研別 獨活 酸棗仁 各一兩炒 防風									
去 遠志 心桂心 細辛 白朮 各三分 甘草 乾薑									
各半 兩炮									
各半 兩炮									
右為粗末每服四錢水淺半煎至八分去滓溫服									
龍齒圓 治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不安									
研別 龍齒 茯神 各一兩 朱砂 研 人參 當歸 天麻 各三									
分 犀角屑 檳榔 防風 生乾地黄 各半兩 遠志									
去 心赤箭 各一分 麝香 一錢									
右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓薄荷溫									
酒下									



朱貴琥珀散 治婦人血風	琥珀 研 沒藥 研 木香 當歸 芍藥 白芷 羌	活 乾地黄 延胡索 川芎 各半 土瓜根 牡	丹皮 去心 白朮 桂心 各一兩	右為末每服一錢水一錢煎至七分益酒三分再煎	少時熱服重者數服效	失血過多心神不安方第十一	寧志膏 治婦人因失血過多心神不安言語失常不	欽定四庫全書 婦人大全良方	得睡	辰砂 研 酸棗仁 炒 人參 白茯神 去木 琥珀 各一分 滴	乳 一錢	右為末和停每服一錢濃煎燈心棗湯空心調下方一	無茯苓琥珀蜜圓如彈子大薄荷湯化下一粒	婦人風邪顛狂方論第十二	夫婦人顛狂病者由血氣虛受風邪所為也人稟陰陽之氣而生而風邪入并於陰則為顛入并於陽則為狂



素問云陽厥狂怒飲以鐵落 狂怒出於肝經肝屬木鐵落金也以金制木之意		右為粗末每服三錢水淺半煎七分溫服無時		生乾地黄 各三分		神 去木 石膏 麥門冬 去心 龍齒 研別 白蘚皮 各一兩 人參		羚羊角屑 三分 獨活 遠志 去心 菖蒲 去毛 防風 各半兩 茯		又一方		右為粗末每服三錢水淺半煎七分去滓溫服		甘草 兩三分 蛇蛻 一尺		蒲 去毛 石膏 牡蠣 各一兩 秦艽 禹餘糧 桂心 各半		防風 茯神 獨活 人參 遠志 去心 龍齒 菖		或心神恐懼或言語失常		防風散 治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌笑無度		自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休故曰顛狂也		所覺知良久乃甦狂者少卧不饑自高賢也自辨智也		卒發意不樂直視仆地吐涎沫口喎目急手足撩戾無		陰之與陽有虛有實隨其虛時為邪所并則發也顛者	



愚曾治一女人眼見鬼物言語失常循衣直視衆醫多
用心藥治之無效僕投養正丹二貼煎乳香湯送下以
三生飲佐之立愈又一男子亦曾病此證亦用此藥
收效然養正丹與百一方抱膽圓無異抱膽圓內中無
硫黃有乳香也
自合方見效

婦人飛尸血厥方論第十三

夫飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常遁尸
者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見尸喪聞哀哭
便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沉得風
雪便作沉尸者纏骨結藏衝心脇每發絞切遇寒冷便
作注尸者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至變
輒成大惡皆宜用此方

欽定四庫全書

婦人大全良方

忍冬葉

劉數斛羹令
濃取汁煎之

服如雞子大日三服

太一神精丹

出千
金方

治中風之要藥治客忤霍亂腹痛脹

滿尸注惡風顛狂鬼語蠱毒妖魅癥瘕積聚溫瘧積久
百方不差但是一切惡毒無所不治但近世少得曾青
磁石為難合爾故不錄

蘇合香元亦治此疾方見和劑更不贅錄



雄朱散 治因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣而成變動不 已似冷似熱風氣觸則發	雄黃^研 朱砂^研 苦梗 羌活 當歸 升麻 川	烏^炮 龍齒^研 犀角屑 白朮 芍藥 鬼箭羽	白殭蚕^炒 木香 虎頭骨^炙 紫蘇子^炒 川芎 南	星^炮 山梔子 陳皮 莽草 枳殼^{去穢} 黃芩^各	分 麻黃^{半兩去根節} 蜈蚣^{二條炙} 檳榔^{二箇} 全蝎^{一分炒}	右為細末每服二錢溫酒調下一日三服	欽定四庫全書 婦人大全良方	人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人目閉 不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移 時方寤此由汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣 壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方 寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜服白薇湯倉公 散	白薇湯方	白薇 當歸^{各一兩} 人參^{半兩} 甘草^{一分}



右咬咀每服五錢水二錢煎至一錢溫服	倉公散 治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血便死不	知人及卧魔嚙脚趾不覺者并諸毒氣等疾	爪帶末 九籥衛生方無爪 梨蘆末 雄黃 研 礬石	等分 煅研各	右為末研停用少許吹入鼻中得嚏氣通便活未嚏	再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂莢者為正	白朮散 治中風身體麻痺不仁	欽定四庫全書 婦人大全良方	白朮 炒 芍藥 藁本 去苗土 續斷 去枯 當歸 酒洗	二虎骨 酥炙 烏蛇肉 各半	右為細末每服二錢匕溫酒調下藏寒多利者加附	子半兩骨中煩熱者加生地黃一兩				婦人大全良方卷三



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷五

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄舉人臣張護



欽定四庫全書

婦人大全良方卷四

宋 陳自明 撰

婦人血風身體骨節疼痛方論第一

凡五方

夫婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風
 冷所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣
 與正氣交擊故令疼痛也

芎藭散 治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思

欽定四庫全書

婦人大全良方

飲食

川芎一兩 赤茯苓 赤芍藥 酸棗仁炒 桂心 當

歸 木香 川牛膝各三分 羌活 枳殼去穢炒 甘草

各半兩

右為麤末每服三錢水一大盞薑三片煎至七分去

滓熱服無時候

羚羊角散 治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑 酸棗仁炒 生乾地黄 檳榔各一兩 五



加皮 防風 赤芍藥 當歸 骨碎補 炒去毛 海 桐皮 川芎 各三分 甘草 兩半	右為末每服二錢溫酒調下	通靈圓 治男子婦人手足痛風不可忍者	白附子 殭蚕 各一兩 全蝎 炒半兩 麝香 一字	右為末煉蜜元如梧子大每服七圓溫酒下一日三	服	當歸沒藥圓 療婦人血風血氣腹脇刺痛筋攣骨	欽定四庫全書 婦人大全良方	痺手足麻木皮膚瘙痒	當歸 五靈脂 各一兩 沒藥 炒兩半	右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十圓生薑湯空	心下	大效虎骨散 治血風走疰疼痛丈夫筋骨疼及打撲	傷損疼痛甚者	虎骨 炙酥 敗龜 炙醋 當歸 桂心 地龍 去土 牛膝 漏	蘆 葳靈仙 玄胡索 自然銅 製



右各等分為末每服二錢熱酒調下每日一服	婦人血風白虎歷節走疰方論第二 凡七方	夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫易皮膚卒然 掣痛遊走無有常處故名為走疰也加減小續命湯主	之	漏蘆散 治婦人血風走疰疼痛無有常處	漏蘆 當歸 牛膝 各三 桂心 地龍 去 防風	羌活 白芷 沒藥 研 甜瓜子 各半 虎脛骨 酥 敗	欽定四庫全書 婦人大全良方	龜 各一兩 醋炙	右為細末每服二錢熱酒調下無時候	四生圓 治血風骨節疼痛擡舉臂不起行履不得并	渾身麻痺	白殭蚕 炒去 地龍 去 白附子 生 五靈脂 草烏 去	尖各 等分	右為末以米糊元如梧桐子大每服二十元茶酒任 下或作末酒調半錢亦可



麝香圓 治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲嚙	晝靜夜劇及一切手足不測疼痛	大八角川烏頭 三箇去皮尖生 生全蝎 二十箇 生黑豆 二十粒	生地龍 去土淨半兩	右為細末入麝香一字同研停糯米糊為元如綠豆	大每服七圓甚者十元夜卧令鬲空溫酒吞下微出	冷汗一身便瘥 許學士云予得此方凡是歷節及不測疼痛一二服便瘥在歛川日有一	貴家婦人遍身走症疼痛至夜則發如虫嚙其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服愈	欽定四庫全書 婦人大全良方	芍藥知母湯 治諸肢節疼痛身體魁癢脚腫如脫頭	眩短氣溫溫欲吐 三因方	桂心 知母 防風 各四兩 芍藥 甘草 麻黃 去根	節各三兩 附子 三兩	右咬咀每服四錢水一錢半生薑五片煎七分去滓	空心服一法有白朮川芎杏仁半夏	附子八物湯 治風歷節四肢疼痛如鎚鍛不可忍	附子 乾薑 芍藥 茯苓 人參 甘草 桂



心 各三兩 白朮 四兩

右咬咀每服四大錢水二錢煎七分去滓食前服一

方去桂用乾地黄二兩

獨活寄生湯最治歷節風近人用之甚效

見本卷第七論

小續命湯大治白虎歷節痛不可忍

方見第三卷 有一婦人先自

兩足踝骨痛不可忍次日流上於膝一二日流於髀骨甚流至於肩流於肘肘流於後溪或如錘鍛或如虫嚙痛不可忍晝靜夜劇服諸藥無效召僕診之六脉緊予曰此真歷節證也非解散之藥不能愈但用小續命湯一劑而愈 又鄧安人夏月亦病歷節痛不可忍諸藥無效召僕診之人迎與心脉虛此因

欽定四庫全書

婦人大全良方

中暑而得之合先服酒蒸黃連元衆醫莫不笑用此藥服一貼即愈自後與人良驗

婦人血風癰瘡痒方論第三 凡八方

局方治婦人時發遍身瘙痒或赤腫癰疹五心煩熱血

風攻疰與人參荊芥散消風散四物湯加荊芥煎或人

參當歸散或逍遙散兼服導赤圓如不通者食後服皂

角元 氣虛老人不可从服 如服皂角圓不退者此凝滯熱甚者宜

先服青木香圓三兩服以開氣道却服前藥即效

夫婦人體虛為風邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起



風瘙癢瘡若赤瘡者由涼濕折于肌中之極熱結成	赤瘡也得天熱則劇取冷則差白瘡者由風氣折於肌	中肌中熱熱與風相搏所以為白瘡也得天陰雨冷則	劇出風中亦劇得晴暖則減着衣暖亦差也脉當浮而	洪浮即為風洪即為氣風氣相搏則為癰瘡身體為痒	凡人汗出不可露卧及浴 素問云汗出見濕乃生瘡癰 使人身振寒	熱生風瘡也	雷公炮炙序云遍體瘡風酒調生側	欽定四庫全書 婦人大全良方	何首烏散 治婦人血風皮膚瘙痒心神煩悶及血風	遊走不定並宜服之	何首烏 防風 白蒺藜 枳殼 天麻 殭蚕	胡麻 芫薺子 蔓荊子 各等分	右為細末每服二錢煎茵陳湯調下無時候	附子酒 治痛風婦人血風身上瘙痒 出張氏方	生附子 不去皮重一兩一隻 皂角刺 二十箇 黑豆 一合	右三味細剉分為二處用好酒二瓶入上件藥慢火



煇候乾至半瓶却合作一處密縛泥頭經二宿每服	一瓊溫服無時候未效再服	治女人風痒癰瘡不止 聖惠方	蒼耳花葉子 各等分	右為細末用豆淋酒調下二錢	治癰瘡	白蜜 不以多少 好酒調下已試有效	治皮膚有風熱遍身生癰瘡方 初虞世	欽定四庫全書 婦人大全良方	牛蒡子 水煮一兩淨 浮萍 蒸過焙乾等分	右為細末每服二錢薄荷湯調下日二服	又治風氣客於皮膚搔之不已方	蟬蛻 洗 大葉薄荷	右等分為細末無時溫酒調下方寸匕 此一方出本草	又方	露蜂房 洗過蜜炙令焦 蛇蛻 洗炙令焦等分	右為細末溫酒調下一錢日二三服



婦人虛風頭目眩暈及心眩方論第四 凡七方	夫婦人風眩是體虛受風風入於腦也諸臟腑之精皆上注於目其血氣與脉并上屬於腦也循脉引於目系目系急故令眩也其眩不止風邪甚者變成癩疾也	養正丹 治虛風頭旋吐涎不已蓋此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已	黑鉛 水銀 硫黃 研 朱砂 各一兩研	右用建瓔一隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳杖子	欽定四庫全書 婦人大全良方	打停取下歇少時入二味打停候冷取下研為粉以糯米軟飯元如綠豆大每服三十元棗湯吞下空心食前日二服	鈎藤散 治肝厥頭暈清頭目 出本事方	鈎藤 陳皮 半夏 麥門冬 去心 茯苓 茯神	人參 去蘆 甘菊花 防風 各半兩 甘草 一分 石膏 一兩	右咬咀每服四錢水一椀半生薑七片煎至八分去	滓熱服 素問云頭痛顛疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招搖目眩耳聾下實上虛



過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈狗蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝厥頭暈腎厥頭痛不同也	斗門方 治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者	喝起草 取其嫩心不以多少陰乾為末以常酒服一大錢匕無時候其功大効服之多連腦蓋善通頂門	蔓荊子散 治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語謇澁痰欽定四庫全書 婦人大全良方	逆不下飲食	蔓荊子 防風 羌活 川芎 羚羊角屑 枳	殼 前胡 石膏 赤茯苓 麻黃去根節 荊芥穗	各三分 北細辛 甘菊花 白芷 藁本 旋復花	甘草各半兩	右為粗末每服四錢薑三片水一瓊煎七分去滓溫服無時候	四神散 治婦人血風眩暈頭痛 九齋衛生方



菊花 當歸 旋復花 荊芥穗 各等分	右為細末每服一錢水一錢葱白三寸茶末一錢煎至七分通口服良久去枕仰卧少時	川芎散 治風眩頭暈 龐安常方	小川芎 山藥 白茯苓 甘菊花 野菊 不用人參 各半	兩 山茱萸肉 兩	右為細末無時候酒調二錢日三服	治女人頭旋即天動地轉名曰心眩非血風也 見普濟方	欽定四庫全書 婦人大全良方	膽子礬一兩細研用胡餅劑子一箇拌停放版子上按平一指厚以篦子勒成如骰子大塊不須界斷於瓦上焙乾每服一骰子大為末煎燈心竹茹湯調下	婦人血風頭痛方論第五 腎厥頭痛 附 凡九方	許叔微云婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車船上蓋因血虛肝有風邪襲之爾予嘗處此方以授人比他藥效而捷	川芎 兩 當歸 三 羌活 旋復花 華陰細辛 蔓



荊子 防風 石膏 藁本 荊芥穗 半夏麴 乾地黄 甘草 各半兩	右咬咀每服三錢水一錢薑三片煎至七分去滓溫服	七生元 治男子婦人八般頭風及一切頭痛痰厥腎厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治療 徐明仲先生方	川烏 草烏 南星 三味並生去皮 半夏 冷水洗去滑 川芎	石膏 白芷 並生用等分	欽定四庫全書 婦人大全良方 右為細末研韭菜自然汁圓如梧子大每服七圓加至十圓嚼生葱茶送下 僕常療鄧安人頭痛如破服諸藥無效加北細辛等分全蠲減半為貪服二十粒即愈	芎辛湯 治狀如前但發熱者不可服 生附子 去皮 生烏頭 去皮 南星 乾薑 炮 北細辛	川芎 各一兩 甘草 三分	右咬咀每服四錢水二錢薑七片茶牙少許煎至六分去滓食前溫服中脘素有寒者不用茶牙



局方如聖餅子加北細辛如半夏數自合服之見効甚	速若頭痛筋攣骨重少氣噦噫腹滿時驚不嗜卧欬嗽	煩冤其脉舉之則弦按之石堅由腎氣不足而內著其	氣逆而上行謂之腎厥頭痛宜玉真圓與硫黃圓	玉真圓方	石膏 研 煨 半夏 洗為末 硫黃 二兩 硝石 一分 各一兩	右研令停生薑自然汁打糊圓如梧桐子大生薑湯	下三十圓 一方無半夏 用天南星	欽定四庫全書 婦人大全良方	硫黃圓 治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不治	服此除根	硝石 一兩 硫黃 二兩	右研令極細滴水負如指頭大空心蠟茶清嚼下百	一方云中暑者以冰水服之下咽即洒然治傷冷以	艾湯下	若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒中於骨髓	留而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜



白附子散灸曲鬢穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右	白附子散方	麻黃 不去根節 烏頭 炮去皮 南星 炮各半兩 白附子 炮一兩 全蝎	右為細末酒調一字服訖去枕卧少時	裕陵傳王荆公偏頭疼方云是禁中祕方用生蘆菔汁 即蘿 一蜆殼仰卧注鼻中左痛注左右痛注右或兩鼻	欽定四庫全書 婦人大全良方	皆注亦可數十年患皆一注而愈東坡云荆公與僕言已愈數人 此方自後晁將仕 明甫 是有効	治頭風痛不可忍者	硝石 人中白 腦子 等分	右研令極細用一字搐入鼻中	項筋強痛方論第六 凡五方	此一卷論項筋拘攣強痛每得斯疾療之似易而實難然方冊中所載亦少縱有言之議論亦畧以僕考之然



既有斯疾必有是方何古人言此疾證尚且略又無的
然之論詳之必是挾諸疾而生所以絕無專門予因暇
日撫古名方以備檢閱然自明學識淺鄙未必全備博
學之士見其遺缺儻能補而完之不亦宜乎咸淳元年
上元日藥隱老人書于存心堂

夫頸項之處乃屬足太陽膀胱之經又許太學云是足
少陰腎之經蓋腎與膀胱為表裏故也以感外邪論之
則有太陽經先因感風又感寒濕致令外證發熱惡寒

欽定四庫全書

婦人大全良方

與傷寒相似頸項強急腰身反張如中風狀瘓瘓口噤
其身體凡古人以強直為瘓其脉沉遲弦細新產血
虛多汗出喜中風亦有此證已上並載第三卷第二論
中言之甚詳不復贅錄 又有挫枕轉項不得者與三
五七散 方見和劑 追風散仍與急風散搽項上 若因被風
吹頭目昏眩太陽并腦俱痛項背筋脉拘急可與蝎附
散都梁貲 許太學治項筋強痛不可轉側者以木瓜
煎



追風散 治年深日近偏正頭疼又治肝藏久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血風攻症頭目昏痛皆治之	川烏 炮去皮 防風 去蘆 石膏 煨 川芎 甘草 炙 荊芥	穗 白殭蚕 炒去絲 天南星 炮 羌活 天麻 地	龍 白附子 炮 全蝎 去尾 白芷 各半 草烏 炮去皮	欽定四庫全書 婦人大全良方	沒藥 研 乳香 研 雄黃 研各一分	右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨卧服常服清頭目利咽高消風化痰	急風散方	草烏頭 三兩一半燒存性於醋內蘸令冷餘一半生用 生黑豆 一分兩味一處為末	丹砂 一兩 麝香 一分	右為細末研令停酒調塗痛處	蝎附散 治一切風邪頭痛夾腦風氣痰涎壅盛嘔逆



惡心口吐清水暗風旋暈眼見黑花牙關緊急口眼喎	邪面目瞤動頭項拘急肩背引疼耳痒目昏四肢麻木	及沐頭浴出暴感風邪頭目昏痛兩太陽穴疼遠年頭	風經隔歲月乍差乍發服藥無效者並皆治之	附子 炮去皮 川烏 炮去皮尖 麻黃 去節 僵蚕 炒 南星 防風	各三錢 雄黃 朱砂 全蝎 各半錢 白芷 藁本	右為細末每服半錢葱茶調下食後服孕婦不可服	京城之醫用此藥兼嚼如聖餅子治眼生眵糞眊眊	欽定四庫全書 婦人大全良方	不明羞明多淚見物不明有效	都梁負方	香白芷 擇大塊白色新潔者先以棕刷去塵土用沸湯泡洗四五次為細末 煉蜜負	如彈子大每服一負多用荊芥點蠟茶細嚼下食	後常服只乾嚼下亦可都無所忌此藥大治諸風	眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血風	頭痛服之令人目明凡浴沐後服一二粒尤佳暴	寒乍暖神思不清傷寒頭目昏暈並宜服之



木瓜煎方

宣木瓜 二箇取
蓋去穢 沒藥 二兩
研 乳香 一分
研

右二味內木瓜中用蓋子合了竹簽定之飯上蒸三四次爛研成膏子每服三匙生地黄汁半瓊無灰上
 醞二瓊和之用八分瓊熱暖化膏子服 有人患此病
自午後發黃
昏時定予曰此患必先從足起經言十二經絡各有
筋惟足下少陰之筋自足至項大抵筋者肝之合也
日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺
也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶畢法云離至乾
腎氣絕而肝氣弱肝腎二藏受陰氣
故發於是時予授此方三服而愈

欽定四庫全書

婦人大全良方

婦人腰痛方論第七

二方

夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若腎氣虛弱外感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有五種之說如風腰痛
 宜小續命湯加桃仁杜仲煎服脾胃氣蔽及寒濕腰痛
 宜五積散加桃仁如虛損及五種腰痛者青蛾元神應
 元 諸方並
見和劑 皆可用也如氣滯腰痛如神保真黑牽牛茴
 香橘核必有功也

如神湯

治男子婦人腰痛

陳總領方



延胡索 當歸 桂心 等分一方無 當歸有杜仲	右為末溫酒調下二錢甚者不過數服 澤人膝珂云 此方得之於	歙川祈門老醫真 是如神故以名之	獨活寄生湯夫腰痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕地當風	所得不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或	腰痛拘攣脚重痺宜急服之	獨活 三兩 桑寄生 續斷 杜仲 北細辛 川牛	膝 秦艽 茯苓 白芍藥 桂心 川芎 防	欽定四庫全書 婦人大全良方	風 人參 熟地黄 當歸 各二兩	右咀咀每服三錢水一錢煎至七分去滓溫服空心	氣虛下利除地黄并治新產腹痛不得轉動及腰脚	攣痛痺弱不得屈伸此藥最能除風消血肘後有附	子一枚無寄生人參當歸粉草近人將治歷節風脚	氣流注亦效	婦人腰脚疼痛方論第八 凡三方	夫腎主於腰脚女人腎藏繫於胞絡若勞傷腎氣虛弱



而風冷客於胞絡邪氣與真氣交爭故令腰脚疼痛也 酸棗仁散 治婦人血氣風虛腰脚疼痛頭目昏悶食 少無力
酸棗仁 ^炒 川牛膝 當歸 ^{各三} 羌活 川芎 桂
心 防風 木香 海桐皮 杜仲 附子 ^炮 萆
薛 川續斷 粉草 ^{各半} 兩
右咬咀每服四錢水一盞半薑三片煎七分去滓溫 服
欽定四庫全書 婦人大全良方
骨碎補散 治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急肢 節不持
骨碎補 ^炒 萆薢 川牛膝 桃仁 海桐皮 當
歸 桂心 檳榔 ^{各一} 赤芍藥 附子 川芎 ^{各三} 枳殼 ^分 兩半
右為粗末每服三錢水一大盞薑三片棗一箇煎至 七分去滓食前熱服
婦人脚氣方論第九 凡十一方



凡頭痛身熱肢節痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜檳榔生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痺或行起忽倒或兩脛腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁 皮頑不知有無也 或舉體轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或曾滿氣急或遍體酸痛皆脚氣候 或之一字有無是也 黃帝所謂緩風濕痺是也頑弱名緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續命湯主之 煎成入生薑自然汁最 暑中三陰所患必	欽定四庫全書 婦人大全良方	熱小續命湯去附子減桂一半主之大煩躁者紫雪最良若無紫雪以自合薄荷煎冷水調服極妙大便秘者脾約員麻仁員三和散主之 方並見和劑局方中 仍針灸為佳服補藥與湯淋洗皆醫之大禁也	聖惠方婦人脚氣論	夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎臟虛弱為風濕所乘女子以胞絡氣虛為風毒所搏是以胞絡屬於腎也腎主於腰脚又肝脾腎三臟經絡起於十足指若臟腑



虛損則風邪先客於脚從下而上動於氣故名脚氣也	此皆由體虛或當風取涼或久坐卑濕或產後勞損或	悲怒傷肝心氣滯致令月候不通因其虛傷風毒搏於	肌骨則令皮膚不仁筋骨抽痛五緩不遂六急拘攣或	即冷痛或即腫滿或兩脚痺弱或舉體轉筋目眩心煩	見食即嘔精神昏憤肢節煩疼小便赤黃大便秘澀並	皆其證也其婦人脚氣治之與丈夫不同者以其氣血	不調懷胎難產崩傷之異是以褚澄療寡婦師尼與妻	欽定四庫全書 婦人大全良方	妾殊別即其義也 凡婦人有脚氣疾者必無生育	牛膝散 治脚氣浮腫心神煩悶月候不通	川牛膝 羚羊角 檳榔 大黃 炒 芒硝 各一兩 防	已 桂心 牡丹皮 赤芍藥 甘草 各三分 桃仁	五十粒製	右為粗末每服三大錢水一瓊煎至七分去滓溫服	利下惡物為度亦要相其強弱用之	大腹皮散 治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶



木香散 治婦人脚氣卒發衝心悶亂	右呔咀每服四錢水一錢煎至七分去滓溫服	赤芍藥 紅花 各三分 紅雪 一兩半	犀角屑 木香 各半兩 紫蘇 赤茯苓 檳榔 各一兩	犀角散 治婦人脚氣忽發衝心悶亂四肢煩疼有熱者	服	右呔咀每服四錢水一錢半薑三片煎七分去滓溫服	欽定四庫全書 婦人大全良方	一兩 赤茯苓 紫蘇 各兩半	半夏 陳皮 人參 大腹皮 桂心 各三分 檳榔	不止	半夏散 治婦人脚氣發動心腹脹滿飲食不下嘔逆	分去滓空心溫服	右呔咀每服四錢水一錢薑五片葱白七寸煎至七分	赤芍藥 青皮 木瓜 獨活 各一兩 枳殼 二兩	大腹皮 紫蘇 木通 桑白皮 羌活 荊芥



木香兩半 郁李仁 赤芍藥 大腹皮 紫雪兩各一	桑白皮 桂心 檳榔 茯苓各三	右咬咀每服三錢水一錢薑三片煎至七分去滓溫服	治婦人脚氣衝心悶亂不識人宜服此藥	紫蘇 松節各二 吳茱萸兩半 檳榔 乾木瓜各一	陳皮三分	右咬咀每服四錢水一錢煎至一半入童子小便二	欽定四庫全書 婦人大全良方	合再煎三沸溫服	紫蘇散 治婦人風毒脚氣腹內壅塞痰惡不思飲食	脚重虛腫	紫蘇葉莖 木通 桑白皮 茴香根各一 枳殼兩二 羌	活 獨活 荆芥穗 木瓜 青皮 甘草各半	大腹子十箇	右咬咀每服三錢水一錢薑三片葱白一莖煎至七分去滓溫服



桑白皮散 治婦人脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澁腹 脇脹滿氣急坐卧不得	桑白皮 郁李仁 各一兩 赤茯苓 二兩 木香 防已	大腹皮 各半兩 紫蘇子 木通 檳榔 青皮 各三分	右咬咀每服三錢水一錢薑三片煎至七分去滓溫 服	薏苡仁散 治婦人脚氣緩弱及頑痺腫滿心下急大 便澁	欽定四庫全書 婦人大全良方	薏苡仁 防風 猪苓 川芎 防已 檳榔	郁李仁 大麻仁 各一兩 桑白皮 二兩 枳實 三分 甘草 半兩	羚羊角屑 一兩 右為散每服三錢水一錢煎至七分去滓放溫服 四白散 治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲食 四肢羸瘦骨立拘攣脚痛不能行 黃耆 厚朴 益智仁 藿香 白朮 白扁豆 陳皮 各一兩 半夏 白茯苓 人參 白豆蔻仁



天台烏藥 甘草 各半 京南芍藥 兩半 檀香 沉	香 各一 右為細末每服三錢水一盞薑三片棗子一箇煎至七分溫服	自後諸證退只有脚攣痛不能行以蒼朮元治之效此藥大治乾濕脚氣筋脉拘攣疼痛不能行履兼補下部	蒼朮元方	乳香 沒藥 各二錢 川牛膝 青鹽 各半 熟艾 四錢	欽定四庫全書 婦人大全良方	川烏 三錢 全蝎 一錢	右除研藥為細末入研藥令停以木瓜一箇大者切	一頭留作蓋去穰入上件藥於木瓜內將蓋簽定安	木瓜於黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成膏却	入生蒼朮末拌令得所負如梧桐子大每服五十負	空心用木瓜湯下或溫鹽酒亦得一日三服忌血與	蒜 乙巳年羅安人病發熱自汗心煩身體骨立足痛	治之六脉弦弱僕曰雖脉似勞實非勞也似脚氣而非正脚氣但當調脾生血其熱必退然後攻足則可



婦人大全良方卷四										欽定四庫全書		婦人大全良方		大便祕者可與七宣員神功員七聖檳榔員三和散服之効		諸方並見和劑方		愈而		望安遍尋諸方皆無對證之藥遂處四白散子與服不半劑熱退能食又處蒼朮負繼之筋脉伸足能行	



欽定四庫全書

婦人大全良方卷五

宋 陳自明 撰

勞瘵叙論第一

凡二十一方

夫骨蒸殭殍復連尸疰勞疰虫疰毒疰熱疰冷疰食疰
鬼疰等皆曰傳尸以疰者注也病自上注下與前人相
似故曰疰其變有二十二種或三十六種或九十九種
大畧令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聾或
腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或散
沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復下
利羸瘦困乏不自勝持積月累年以致於死死後乃疰
易傍人乃至滅門者是也更有蜚尸遁尸寒尸喪尸尸
注等謂之五尸及大小附着等證不的知其所苦無處
不惡乃挾諸鬼邪而害人以三因攷之內非七情所忤
外非四氣所襲雖若麗乎不內外因奈其證多端傳變
遷移難以推測故自古及今愈此病者十不得一所謂

欽定四庫全書

婦人大全良方



筋	版齒黑燥大杼酸痛其蒸在骨	背脊疼痛胛骨	如針刺其蒸在脉	爪甲焦枯眼昏兩脇急痛其蒸在	在內	髮焦鼻衄或復尿血其蒸在血	身熱煩躁痛	甲錯其蒸在皮	外人覺熱自反惡寒身振濶劇其蒸	所謂勞蒸者二十四種隨證皆可考尋毛折髮焦肌膚	二十四種蒸病論	胸痛其傳在腎	者增寒發熱面黃耳輪焦枯胛骨痛痛小便白濁遺瀝	欽定四庫全書	婦人大全良方	燥毛折咯嗽喘急時吐白涎或有血線其傳在肺	病	羸瘦吐涎沫其傳在脾	病者增寒發熱面赤鼻白乾	者增寒發熱面青唇黃舌本強不能嚥飲食無味四肢	病	燥忽忽喜忘大便苦難或復泄瀉口瘡其傳在心	病	守恐畏不能獨卧其傳在肝	病者增寒發熱面黑鼻	不濟也	病者增寒發熱自汗面白目乾口苦精神不	俞崔氏穴名四花有六穴若聞早灸之可否幾半晚亦	狸骨獺肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗見效唯膏育



酸癰其蒸在髓	頭眩熱悶口吐濁涎眼多眵淚其蒸	在腦	男子失精女子白淫其蒸在玉房	乍寒乍熱	中脘與臍中煩悶其蒸在三焦	小便赤黃凝濁如膏	其蒸在膀胱	傳道不均或秘或泄腹中雷鳴其蒸在	小腸	大腹隱痛右鼻乾疼其蒸在大腸	口鼻乾燥	腹脹睡卧不安白汗出其蒸在胃	口苦耳聾脇下痛	其蒸在膽	裏急後重肛門澁秘其蒸在回腸	小腹	疔痛筋脉縱緩陰器自強其蒸在宗筋	眼昏淚下時	欽定四庫全書	婦人大全良方	復眩暈躁怒不常其蒸在肝	舌焦黑氣短煩悶洒洒	浙浙其蒸在心	唇乾口瘡胃腹脹悶畏寒不食其蒸	在脾	咳嗽喘滿咯痰吐血聲嘶音遠其蒸在肺	耳	輪焦枯脚氣酸疼起居不得其蒸在腎	情想不寧無	故泄精白物綿綿而下其蒸在右腎	心主胞絡心膈	噎塞攻擊疼痛俛仰煩冤其蒸在鬲諸證雖曰不同其	根多有垂嚙其心肺治之不可不絕其根也	神仙秘法	取傳尸勞重服此藥須先擇良日焚香禱



祝令病人設榻面向福德方服即有神效不可使病人知其藥味及子細	青桑皮 楊柳枝 梅枝 桃枝 已上要取東引者各七莖	葱白 七莖 青蒿 一握如無以子代 真安息香 一分研 阿魏 一分	右八味除阿魏外用童子小便一升半煮取藥耗及	一半去滓將藥汁化阿魏再煮十數沸去滓候溫作	貳次調下件藥末	朱砂 兩半 小檳榔 兩半 麝香 分半	欽定四庫全書 婦人大全良方	右三味研令極細分為二服用前湯使調下五更初一服三點再一服辰時間取下虫遂絕根本若見虫色白者此病必差若黑色則已傳入腎經不可救也服藥後只以淡粥補之並不動元氣効驗無比切須秘之世傳勞虫有靈輕易傳之則傷醫者此說殆醫者祕惜其方不可以授人耳要須密重之則無洩慢天機乃起死還生功同造化鬼神護助自有靈效大凡傳屍勞者必須先服此一藥後十五方隨證治不



可以槩用藥調治三五箇月再服此取虫藥則永除根本如取下虫色已黑縱服後藥亦無補也然亦能使不傳它人	治心胃積氣作胃痺引兩脇痛昏悶不收音聲不清虛熱上壅作鼻衄方	桑白皮分三枳殼 木通 子芩 生乾地黄 白芍藥 甘草各半	右為粗末每服三錢重水浸半煎至七分去滓溫服	欽定四庫全書 婦人大全良方	食後 治伏瘀血在心肺時作衄心胃徹背痛方 白芍藥 牡丹皮各一 生犀屑半 生地黄三兩 槌碎入	右咬咀每服半兩水一大錢煎至七分去滓溫服	調榮衛消瘀血出聲音治痰嗽方 川當歸 牡丹皮 白芍藥 子芩 木通 麥門冬 甘草 華陰細辛各半 生乾地黄一兩	右咬咀每服三錢水一錢薑三片煎至七分去滓溫



服	治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血雞蘇圓	雞蘇葉 半斤 黃耆 半兩 甘草 各一分 防風 一兩 苦梗	半兩 荊芥穗 一兩 甘菊花 一分 真腦子 半錢 生乾地黃 半兩	右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓用麥門冬去	心煎湯嚼下又治肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不	得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前	子一分每服一圓煎桑枝湯嚼下日可六七服桑枝	欽定四庫全書 婦人大全良方	剉炒香每用水三錢煎至一錢去滓下藥	治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此病因失血榮衛損也	宜防風湯方	黃耆 一兩 白芍藥 各三 防風 分 甘草 半兩 當歸 半兩 生乾	地黃 各三	右呿咀每服三錢水一錢薑三片棗一箇煎至七分	去滓溫服食前服	治勞嗽溫金散



甘草 黃芩 桑白皮 防風 各一兩 杏仁 二十七粒製	人參 去蘆 茯苓 各半兩 麥門冬 一分	以前五味用米泔浸一宿曬乾次入人參茯苓麥門冬三味同為細末每服二錢水一錢蠟一豆大煎至八分食後溫服	治勞嗽有四滿員極妙 方見勞嗽門	治心氣不足解勞倦益血桔梗飲子	苦梗 甘草 黃耆 人參 去蘆 麥門冬 各一兩 青皮	欽定四庫全書 兩半 婦人大全良方	右為末每服二錢水一錢煎至七分溫服	治胃痺瓜樓湯	枳殼 四箇 厚朴 薤白 各一兩 瓜樓 一箇 桂枝 一兩有熱	右呖咀水七升煎取四升去滓溫服	涼心肺解勞除熱使榮衛順血不絕子苓散	黃耆 一兩 白芍藥 子苓 人參 白茯苓 麥門	冬 苦梗 生乾地黃 各半兩



右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三錢薑三片煎至水一錢半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服	治積氣堅硬作氣噎膈脅引背痛方	白芍藥一兩 鱉甲醋炙 枳殼去穢炒 北柴胡各一兩 甘草	赤茯苓各半兩	右咬咀每服三錢水一大盞薑三片棗一箇煎至七分去滓溫服	分去滓溫服	欽定四庫全書 婦人大全良方	治伏連傳注腹中有堅硬積氣壅心脅作痺痛引脇背痛腕膈滿悶方	鬼臼 天門冬去心各三分 巴豆一分去皮心炒 莽草 不蛀	皂角酥炙各半兩 葉子雄黃一兩	右為細末煉蜜為圓如小豆大每服一圓漸加至三二圓空心湯水吞下臨卧一服常宜斟酌勿令泄瀉忌鯉魚山猪蘆笋	出聲音方



訶子炮去核 木通各一兩 甘草半兩	右咬咀用水三升煎至升半入生地黃汁一合再煎數沸放溫分六服食後日作半料	治咽喉痛方	百藥煎去黑皮 鵬砂 甘草 生白礬等分	右四味為細末每服一錢食後米飲調細細呷嚥	治肺間邪氣胸中積血作痛失音含化圓方	蛤蚧一雙去口足炙 訶子去核 阿膠粉炒 麥門冬去心 北細辛	欽定四庫全書 婦人大全良方	甘草 生乾地黃各半兩	右為細末煉蜜為圓如雞頭子大食後含化一圓	已上諸方辰州李倅名景適錄示云傳之於五羊大	帥方侍郎上務下德	治療疾得效方河車圓 治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸	等疾	河車一枚初生男子者尤良於長流水中蕩洗盡血淨入鍋內煑熟以手擘成小片焙乾	須在一日內便碾成末纔經宿即不乾碾不成末矣按本草云人肉治療病胞衣飄生者尤佳主血



氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸疾漸瘦悴者以五味和之如餅法與服之勿令病者知亦治天行熱癘立效胞衣埋地中七八年化成水澄清如真水南方之人以甘草升麻和諸藥罐盛埋之三五年揆之此為藥服	雪白茯苓半揀參一乾山藥二	右為細末麪糊為圓如梧桐子大以少麝香末為衣	每服三五十圓米飲溫酒鹽湯送下空心服嗽甚者	五味子湯下	又方治肌瘦咯血肺痿等疾	蛤蚧一雙全者酒浸一宿酥炙知母貝母去心人參去蘆甘草	欽定四庫全書 婦人大全良方	杏仁去皮尖枇杷葉去毛鹿角膠粉炒	右各一兩依方事治淨秤為末每服三錢水一椀入	桑白皮煎至八分溫服日三夜二	治勞嗽補肺湯	桑白皮熟地黃各二兩人參去蘆紫苑黃耆川	五味子各一兩	右為細末每服二錢水一椀煎至七分入蜜少許食	後溫服



又四君子湯加秦艽黃蠟煎服尤妙 辰陽李倅云已上藥方乃趙世則微之次子公璵並服此乃安傳之仲弟屢救人甚驗服藥止可食淡羹猪蹄肉仍須先煮熟肉去元汁再以白湯熟煮仍忌房勞一切生冷魚腥鹹毒醃藏等物無不痊愈修合藥及煎藥時忌生人孝子婦人雞犬猫畜見仍勿令病人知用藥味大有功效	治傳尸出汗取虫辟邪養正膏	鼈甲一兩醋炙一兩青蒿一握淡鼓三七粒葱白兩安息香一分	桃柳桑枝各七莖桃仁四十九箇去皮尖去天靈蓋用七頭	炙 酥	欽定四庫全書 婦人大全良方	右十味隔夜以水一升浸至五更煎至半升再以童便半升同煎取四合又用檳榔一箇為末麝香一錢匕將所煎藥去滓調下至日高二丈時放溫頓服以衣覆出汗審看十指汗出如藕絲五色臭穢汗出後仍瀉下虫狀惡物盡甚者旬日再服永效	猪肚元 治骨蒸勞唇頰赤氣粗口乾遍身壯熱或多	虛汗大腸澀秘小便赤黃飲食全少 出博濟方	青蒿 鼈甲醋炙北柴胡 木香 生乾地黄各一兩



青皮半兩宣黃連二兩

右為末以猪肚一箇洗淨入藥在內繫定蒸令極軟
研如泥為圓如綠豆大湯下十五元空心日三服忌
濕麪毒物

婦人骨蒸勞方論第二 九十五方

夫骨蒸勞者由熱毒氣附骨故謂之骨蒸也亦曰傳尸
亦謂殭殍亦稱復連亦名無辜丈夫以瘰癧為根女人
以血氣為本無問少長多染此病內既傷於臟腑外則

欽定四庫全書

婦人大全良方

損於肌膚日久不痊遂至羸瘦因服冷藥過度則傷於
脾脾氣既衰而傳五臟脾初受病或脹或妨遂加洩痢
肌肉瘦瘠轉增痿黃四肢無力飲食少味脾既受已次
傳於腎腎既受病時時盜汗腰膝冷疼夢鬼交侵小便
赤黃腎既受已次傳於心心既受病徃徃忪悸或喜或
嗔兩頰常赤唇色如朱乍熱乍寒神氣不守心既受已
次傳於肺肺既受病曾滿短氣咳嗽多唾皮膚甲錯狀
如鱗片肺既受已次傳於肝肝既受病兩目昏暗脇下



妨痛不欲見人常懷忿怒五臟既病漸漸羸瘦即難療也	天靈蓋散 治婦人骨蒸勞四肢無力每至晚間即熱兩頰紅色食飲不下心神煩躁	天靈蓋 炙酥 安息香 地骨皮 當歸 山梔子仁	人參 去蘆 貝母 去心 黃連 桃仁 去皮尖雙仁麩炒 黃檳榔 各一兩	鼈甲 炙醋 北柴胡 生乾地黄 赤茯苓 麥門冬	各一兩半 阿魏	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為粗末以童子小便一大瓊桃柳枝各七寸薑五片葱白五寸藥四錢煎至七分去滓溫服	獺肝元 治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食	獺肝 具一 鼈甲 炙醋 北柴胡 各兩 朱砂 桃仁 去皮尖雙仁麩	炒黃川升麻 天靈蓋 炙酥 犀角屑 梔子仁 地骨	皮 知母 各一兩 黃耆 三分 甘草 兩半 麝香 一分	右為細末煉蜜負如梧桐子大溫水下三十負無時候



黃耆元 治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦疼痛口乾心躁 不得眠卧	黃耆 麥門冬_{去心} 茯神 北柴胡 甘草 生乾	地黃_{各一兩} 酸棗仁_炒 郁李仁 杏仁_{去皮尖雙} 黃耆_炒 枸	杞子 人參_{去蘆} 黃芩_{各三分} 百合 枳殼_{去穰} 赤芍	藥 知母_{各半兩} 鼈甲_{二兩製}	右為細末煉蜜為負如梧桐子大清粥吞下三十負 無時候	欽定四庫全書 婦人大全良方	煞鬼負 治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連_{已上出聖惠方}	麝香_{三分} 犀角屑 木香 白朮_{各一兩} 鬼箭羽 虎 頭骨_{酥炙} 天靈蓋_{酥炙} 辰砂 桃仁_{去皮尖雙} 雄黃_{各半兩}	右為細末煉蜜為負如梧桐子大溫水下二十負此 藥亦辟瘟疫亦可帶之	鼈甲煎 治勞_{見專治婦人方}	雄鼈_{一个重一斤者} 杏仁_{去皮尖} 北柴胡 貝母_{去心} 知母



各四兩		右除鼈外諸藥細剉以好酒五升入鍋內將活鼈在 中以藥和停圍定上用板子石壓定令鼈在藥內喫 酒藥候來日却以慢火煮候酒盡為度却取鼈令患 人喫盡次將鼈甲用醋炙黃入在前項諸藥內焙乾 為細末用酒煮麪糊元如梧桐子大用米飲吞下三 十元無時候日五服		麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胃 欽定四庫全書		婦人大全良方		煩壅	
赤茯苓		當歸		乾漆 _生		鼈甲 _{醋炙}		常山	
北柴胡		白朮		生乾地黄		石膏 _{各一兩}		甘草 _{半兩}	
右為細末每服二錢水一錢小麥五十粒煎至六分		食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩蘇東坡云		此黃州吳判官方療骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗極效		麥煎散甚多此方吳君寶之如希世之珍其效可知		筒骨煎	
治諸虛勞疾羸瘦乏力腰背引痛心煩喘嗽									



睡膿嘔血頑涎壅盛睡卧有妨曾滿氣促夜多盜汗髮 焦耳鳴皮寒骨熱一切五勞七傷骨蒸等候並皆療治		許元林 先生方	地骨皮 粉草 北柴胡 前胡 烏藥 麻黃	節 乾葛 青蒿 苦梗 知母 天仙藤 北	黃芩 人參 生乾地黄 秦艽 鼈甲 黃	耆 者 兩 各半	右呖咀每服三錢水一錢酒一分猪筒骨一莖炙焦	欽定四庫全書 婦人大全良方	分為四服桃柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖槌碎煎 至七分去滓溫服加烏梅半箇尤妙 一方加當歸白芍藥	華佗方大靈治傳尸明月丹方	雄黃 木香 天靈蓋 輕粉 鼈甲 各半 兩 炙一 分 一 醋炙	兔屎 兩 二	右為末用法酒一大升大黃半兩為末熬膏入前藥 為元如彈子大朱砂為衣傳尸勞肌瘦面黃嘔吐咳 嗽不定先燒安息香令烟出吸之不嗽非傳尸也不



可用此藥若烟入口咳不能禁止乃傳尸也宜用此藥五更初服勿令人知以童便共酒一瓊化一元服如人行十里必吐出虫狀如燈心細長及寸或如爛爪李又如蝦蟇狀各不同未效次日再服以應為度	蘓沈良方治諸勞明月丹 兔糞四十枚 硃砂如兔屎大	右細研生蜜元如梧桐子大以甘草半兩碎之水浸一宿取汁五更初下七元勿令病人知勞藥下後頻看若有虫急打殺以桑火油煎使焦棄急水中三日不下更服須在月望前日服忌見喪服色衣婦人猫犬之類後服治勞補氣藥取差	欽定四庫全書 婦人大全良方 江陰萬融病勞四體如焚垂困一夜夢人腹墜一月如大盤明爛不可正視逼人心骨皆寒已而悸寤俄頃扣闕乃威怒使人遺之藥服之遂差問其名則明月丹也始悟向之所夢大體此藥最治熱勞又云傷寒煩躁骨熱皆能治	療一方有鵬砂等分 鮮勞生肌進食活血養心地黃煎元有人云甚妙 華佗方



生地黄汁 杏仁汁 生薑汁 藕汁 薄荷 汁 鵝梨汁 各一升 法酒 二升 沙蜜 四升	右慢火熬成膏入後藥	北柴胡 三兩 木香 人參 茯苓 山藥 栝子	仁 炒 遠志 心 枳實 去穢 白朮 各一兩 秦艽 苦梗	並去蘆 麝香 半兩 熟地黄 洗焙酒 各二兩 研 熟四兩	右為末以前膏子和負如梧桐子大食後甘草湯下	二十元	欽定四庫全書 婦人大全良方	治骨蒸寒熱名醫錄云睦州楊寺丞有女事鄭迪功女 有骨蒸肉熱之病時發外寒寒過內熱附骨蒸盛之時 四肢微瘦足跌腫者其病在五臟六腑之中衆醫不瘥 因遇處州吳醫看曰請為治之只單用石膏散服之體 微涼如故	石膏散方 見靈苑方	真石膏 不以多少 研令極細	右新汲水和服方寸匕取身無熱為度 外臺秘要 本草同



青蒿散 治男子婦人肢體倦疼虛勞寒熱 靈苑方	青蒿八九月間成實時採去枝梗以蒿用童子小便浸三日曬乾為末每服二錢烏梅一箇煎至七分溫服	青蒿鼈甲煎元 治骨蒸勞退熱解肌進食 出博濟方	九肋鼈甲 一箇 北柴胡 二兩 甘草 杏仁 桔梗 當	歸 人參 地骨皮 赤芍藥 各一兩 胡黃連 宣	連 各一 官桂 木香 各半兩 麝香 一字 酥 蜜 各三兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右十四味同為細末用青蒿一斤童子小便五升好酒一升熬青蒿汁約二升已來攙去青蒿不用入酥	蜜再熬成膏冷後入藥末搜和為元如梧桐子大每服十五元溫酒下米飲亦得日進三服如秋後合時	更入桃柳枝七莖此藥甚妙	五心煩熱附	五心煩熱頰赤宜局方逍遙散秦艽散 方見第六卷第一論	逍遙散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重



心忪煩赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏	月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女血弱陰虛榮	衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸	白茯苓 白朮 當歸 白芍藥 北柴	胡 去苗各 甘草 炙兩	右咬咀每服三錢水一錢煨生薑一塊切片薄荷三	葉同煎至七分去滓熱服無時候	枳殼散 治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁經候	欽定四庫全書 婦人大全良方	不調四肢煩倦心胃滿悶狀如勞氣	枳殼 去穢 半夏 赤芍藥 柴胡 黃芩	各一 兩半	右為細末每服二錢水一錢生薑一塊擘破棗二枚	煎至八分去滓溫服候五心煩熱及身體壯熱潮熱	退方續服	婦人血風勞氣方論第三 凡十四方	夫婦人血風勞者由氣血虛損經候不調或外傷風邪



或內挾宿冷致使陰陽不和經絡否澁腹中堅痛四肢酸疼月水或斷或來面色萎黃羸瘦又有因產後未滿百日不謹將護臟腑虛損百脉枯竭遂致勞損之疾也 人參荊芥散 治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目澁心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胃滿精神不爽或月水不調臍腹疼痛瘕塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍卧甚即着床	欽定四庫全書 婦人大全良方	荊芥穗 人參 桂心 生乾地黄 北柴胡	鼈甲醋炙 酸棗仁炒 枳殼製 羚羊角屑別為末 白朮各七	半錢 川芎 當歸 防風 甘草各半兩	右為粗末每服三錢水一錢半生薑三片煎至八分	去滓熱服無時候日二服常服除一切風虛勞冷宿	疾孕婦休服	鼈甲元 治婦人血風勞氣四肢羸瘦疼痛經脉不利	飲食無味漸加虛困



鼈甲 紫苑 桂心 川芎 防風 川牛膝	當歸 秦艽 人參 桃仁 琥珀 各一兩 麝香 一分	黃耆 赤芍藥 蟲虫 製 水蛭 製 鬼箭羽 白朮	羌活 各三分 熟乾地黄 兩半	右為細末煉蜜元如梧桐子大食前溫酒吞下三十	元	琥珀元 治血風虛勞上熱下冷或發動即心中煩燥	困乏無力不美飲食醋心口瘡月水不調肌肉黃瘁腹	欽定四庫全書 婦人大全良方	痛腸鳴或有氣塊攻衝或時作寒熱頭旋痰逆手足麻	痺大宜常服 出傳濟方	琥珀 當歸 木香 川芎 防風 檳榔 各四分	三稜 炮 乾薑 炮 桂心 各五分 吳白朮 洗 柴胡 人參	各二 青皮 吳茱萸 洗 全蝎 炒 附子 炮 草豆蔻	赤芍藥 柏葉 白芷 各三分 桃仁 去皮尖炒 敗龜 醋炙	鼈甲 各六分 天麻 三分 右為細末煉蜜元如梧桐子大每日空心酒下二十



元午前近晚更進一服如覺煖近晚不須服如腹內	塊積攻築於鼈甲桃仁檳榔三稜各加一倍為妙忌	生冷葱荳菜毒魚等物	香甲散 治婦人血氣虛勞四肢少力肌肉黃瘁多困	減食遍身痠疼真邪相擊心腹撮疼	木香 乾薑 各三 鼈甲 醋炙 牡丹皮 赤芍藥	橘紅 桂心 人參 茯苓 熟地黄 秦艽	柴胡 白朮 炒 當歸 炒 附子 炮去皮 甘草 半	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為粗末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分去滓稍熱服如煩渴心躁入烏梅一兩同杵為末	地黄煎 治婦人血風勞心忪發熱不退 出經驗方	生乾地黄 熟乾地黄	右二味等分為細末用生薑自然汁入水相和打糊為元如梧桐子大每服三十元用地黃湯下或只茶酒醋湯下亦可食後日三服覺臟腑虛冷早間先服



八味員一服 不可謂地黃性冷沮洳壞脾大藥陰虛則發熱蓋地黃大能補陰精血也		荊芥散 治血風諸般疾產後並宜服食久服諸疾除		去		荊芥 雀腦芎 各三兩 當歸 人參 各半兩 桂心 牡		丹皮 羌活 防風 苦梗 大腹子 甘草		蒲黃 白茯苓 枳殼 厚朴 半夏 杏仁		欵冬花 各三分 附子 炮 乾地黃 鼈甲 白芍藥		北柴胡 黃耆 各一兩 乾薑 木香 各半 沉香 一分		欽定四庫全書 婦人大全良方		右為細末每服二錢薑三片棗一枚水一瓊煎至七分溫服		荊芥煮散 治婦人血海虛冷手足煩疼頰赤口乾背		甲勞倦寒熱往來咳嗽痰涎飲食進退血經不調多驚		盜汗胃膈不快但是風勞氣冷並皆治之		荊芥穗 四兩 比柴胡 秦艽 白芷 黃耆 各二兩 當		歸 莢茂 川芎 麥門冬 白茯苓 人參		白芍藥 沉香 海桐皮 枳殼 熟地黃 甘	



草 酸棗仁 木香 檳榔 各一兩 鼈甲 製 白豆蔻	桂心 苦梗 各二兩	右為細末每服二錢生薑三片烏梅一箇煎至七分	無時溫服如極虛去檳榔每日兩服臨卧服尤佳忌	生冷動風甜物腹有顆塊服之便消	如聖散 治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易冒疾傷	月水不調以而心虛狀若心勞四肢易倦筋骨少力盜	汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間作頭昏飲食	欽定四庫全書 婦人大全良方	無味胃膈不利或產前產後受病並可服之	北柴胡 白茯苓 甘草 熟地黄 人參 當	歸 各一兩 鼈甲 胡黃連 沉香 知母 各半兩 桑寄	生 乾葛 各三分	右為細末每服二錢水一盞烏梅一箇棗二枚麥門	冬數粒煎至八分無時候	乞力伽散 治血虛肌熱又治小兒脾虛蒸熱羸瘦不	能飲食



白朮 白茯苓 白芍藥 各一兩 甘草 半兩	右為細末薑棗煎二錢服	油煎散 治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦瘁不進飲食	日三服	川烏 海桐皮 地骨皮 五加皮 桂心 牡	丹皮 陳橘皮 白芍藥 川芎 當歸 烏藥	白芷 莪茂 等分	右為末每服二錢水二錢入生麻油三四點煎至七	欽定四庫全書 婦人大全良方	分溫服無時候	大效油煎散 治血風勞氣攻注四肢腰背疼痛嘔逆	醋心不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻痺血海冷	敗服此神效	五加皮 川烏 炮 芍藥 海桐皮 牡丹皮 各一兩	桂心 乾薑 川芎 各半兩	右為細末每服二錢水一錢油浸錢一文同煎至六	分溫服常服以油浸二錢煎藥時不可攪喫藥時不



可吹	局方亦有油煎散 方見和劑 四白散子亦妙 見四卷第九論	治血風勞方	牡丹皮 地骨皮 防風 甘草 黑豆 白芷	白芍藥 各一兩 荊芥穗 二兩 川芎 一分	右為細末每服二錢水一錢薑三片棗一箇葱白一寸煎至八分溫服無時候	香甲散 治熱病後虛勞或四肢倦怠脚手疼痛飲食	欽定四庫全書 婦人大全良方	無味肌膚黃瘦或熱瘧盜汗頭暈虛煩此藥以服駐顏	其妙不可具述	鼈甲 三兩醋浸去裙炙黃又入醋蘸炙七次 當歸 木香 人參	羌活 川芎 沉香 肉豆蔻 酸棗仁 附子	檳榔 大腹子 各半兩 北柴胡 半兩 厚朴 川牛膝	白茯苓 秦艽 各一兩 桂心 半兩	右咬咀每服五錢水一錢生薑三片烏梅一箇煎至八分去滓溫服日三服空心忌生冷麪食雞肉鮓醬



之類	馬鞭草散 治血風攻透肢體疼痛或覺癢痺或覺痺 麻作寒作熱飲食減味並皆治之 已上出專治婦人方	馬鞭草 梗 去粗 荆芥穗 北柴胡 烏梅肉 各二枳	殼 白朮 羌活 白芍藥 各一兩 秦艽 天台烏	藥 麻黃 各兩半 木香 半兩 當歸 川烏 炮 甘草 各一兩	右為細末每服二錢水一盞生薑二片棗一枚葱白 二寸煎至七分日午臨卧溫服常服無忌有孕莫服	欽定四庫全書 婦人大全良方	婦人風虛勞冷方論第四 凡二方	夫婦人風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫人將 攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷氣血 便至虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡或入於腹 內其經絡得於冷則氣血凝滯不能自溫於肌膚也腹 內得於風冷則脾胃氣弱不能消於飲食也隨其所傷 變成疾病若大腸虛者則變下利若風冷入於子臟則 令臟冷致令無子若搏於血則澁壅亦令經水不利斷



絕不通也	澤蘭散 治婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛肢節拘急	體瘦無力經候不調飲食減少	牡丹皮 赤芍藥 栝子仁 續斷 各半 麝香 一分	澤蘭葉 二兩 當歸 延胡索 桂心 附子 炮 川牛	膝 川芎 桃仁 乾漆 炒 琥珀 沒藥 木香	各三分	右十七味為細末每服二錢溫酒調下	欽定四庫全書	婦人大全良方	紫石英圓 治婦人風虛勞冷氣經候不調四肢羸弱不能飲食	紫石英 熟乾地黄 白石英 各二兩 續斷 白芍	藥 桂心 木香 當歸 白朮 乾薑 白薇	各半 兩 川牛膝 川芎 北五味子 人參 各三分 椒	紅 炒 附子 黃耆 各一兩	右為末煉蜜為元如梧桐子大每服三十元溫酒吞	下空心服



婦人冷勞方論第五

九七方

夫婦人冷勞者由血氣不足表裏俱虛臟腑久挾宿冷致令飲食不消腹內積聚臍下冷痛月候不調骨節痠痛手足無力肌膚羸瘦面色痿黃故曰冷勞也

桃仁散 治婦人冷勞氣滯經脉不通腹脇妨悶四肢羸瘦不思飲食

木香 訶子 白薑 桃仁 人參 各半 陳皮

琥珀 桂心 各一 赤芍藥 延胡索 赤茯苓

欽定四庫全書

婦人大全良方

川牛膝 當歸 白朮 各三分

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分去滓空心溫服

木香元 治婦人冷勞經脉不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味漸加羸瘦

木香 琥珀 吳茱萸 泡 當歸 牡丹皮 赤芍

藥 三稜 附子 炮 延胡索 川芎 各三分 乾薑

人參 桂心 各半 北柴胡 白朮 鼈甲 醋煮去



厚朴 熟地黄 陳橘皮 各一兩	右為末煉蜜元如梧桐子大每服三十元空心溫酒	下	熟乾地黄元 治婦人冷勞虛損肌體消瘦顏色痿黃	四肢無力月候不調少思飲食	乾熟地黄 鼈甲 陳皮 各一兩 北五味子 當歸	川芎 桂心 各半兩 川牛膝 人參 白芍藥	白朮 附子 白茯苓 黃耆 各三分 甘草 一分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下三十元	礪砂煎元 治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢羸	瘦不食	鼈甲 醋炙 桃仁 去皮尖 木香 五靈脂 去砂 當歸 各一兩	兩 礪砂 二兩 升 熬成膏	右為細末用礪砂膏為元如梧桐子大空心溫酒下	二十元	養肝散 治婦人冷勞脾胃虛乏大腸轉洩水穀不化



四肢羸瘦口内生瘡不思飲食漸加無力宜服此藥	北柴胡 縮砂仁 蒔蘿 華撥 各三 白朮 白	芷 胡椒 白薑 陳皮 山茵陳 人參 蕪	荑仁 木香 紫苑 白芍藥 北細辛 桂心	兩 各半	右為細末以獾猪肝一具去脂膜切如柳葉片以新汲水洗過入葱白三寸細切入藥末半兩於銚內以新水二大瓊入鹽醋少許以瓷碗合煮令水盡空心	欽定四庫全書	婦人大全良方	以意食之喫粥飲下食後良久飲暖酒一盞為妙晚食前再服亦佳	煮肝散 治婦人冷勞面色痿黃不多思食或時腹痛	四肢少力積漸羸瘦	白芍藥 川芎 苦梗 厚朴 桂心 各三 陳皮	一兩 白薑 當歸 荊芥穗 蒔蘿 胡椒 蕪	荑仁 藁本 柴胡 紫苑 各半	右為細末每服半兩以獾猪肝一具用鹽醋葱白各



少許相和如尋常煮熟空心任意食之然後飲溫酒	二璣尤佳	大香甲元散 治婦人血臟風虛冷氣肌肉黃瘦飲食	進退經候不調心腹多脹漸變如勞補血海調氣	鼈甲 醋炙 沉香 柴胡 人參 川芎 羌活	當歸 附子 炮去 木香 安息香 桔梗 茯苓	藿香葉 陳橘皮 牡丹皮 三稜 厚朴 薑汁	桂心 炙 桃仁 去皮尖炒 牛膝 去苗各半兩 檳榔 和皮大	欽定四庫全書 婦人大全良方	腹子 各一分	右為細末每服二錢水一璣生薑烏梅各少許煎至	八分溫服餘一半更加乾漆 炒一分 阿魏 半 赤芍藥 一分	同為末煉蜜元如梧桐子大空心煎烏梅地黃湯下	二三十元與散子相間服 博濟方	婦人大全良方卷五



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷六

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄舉人臣馮盡



欽定四庫全書									
婦人大全良方卷六									
宋 陳自明 撰									
婦人熱勞方論第一									
夫婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血氣血不調臟腑 壅滯熱毒積蓄在內不得宣通之所致也其候心神煩 躁頰赤頭疼眼澁唇乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡 神思昏沈多臥少起飲食無味舉體痠疼或時心怔或									
欽定四庫全書									
婦人大全良方									
時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也									
黃耆散 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲 飲食									
人參 黃芩 當歸 各三 分 北柴胡 去苗 兩半 黃耆 地									
骨皮 赤茯苓 麥門冬 生地黃 赤芍藥 各 一兩 甘草 一分									
右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎六分去滓溫服 無時									



欽定四庫全書		婦人大全良方		猪肚元 治婦人熱勞羸瘦		分去滓溫服無時候		右為粗末每服四大錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓溫服無時候		或時寒熱痰逆嘔吐不思飲食		半夏散 治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛	
北柴胡		赤茯苓		人參		黃耆		黃連		地骨皮		秦艽散	
骨皮		木香		桃仁		鼈甲		黃耆		麥門冬		秦艽	
右為細末用好嫩猪肚一枚淨洗將藥末入猪肚內		以線縫合蒸令爛熟於砂盆內研如膏員如梧桐子		大食前粥飲下三十元午食前再服		秦艽散		治血經有熱月脈凝滯五心煩倦		麥門冬		秦艽	
鬱金		蘇木		生地黃		當歸		地骨皮		赤芍藥		麥門冬	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分		各一分	
各一分													

右為細末每服一錢半水一盞紅花少許同煎至七分溫服若經脉調不用紅花忌酒與熱物此方可服									
一年									
婦人客熱方論第二 凡三方									
夫婦人有氣血陰陽臟腑虛實實則生熱虛則受邪邪熱加人陰陽冷熱自相乘也今云客熱者是體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上焦胃鬲之間虛熱口躁心煩手足壯熱者是也									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食									
麥門冬 北柴胡 赤茯苓 各一兩 羚羊角屑 赤芍藥 桑白皮 黃耆 各三分 生乾地黄 甘草 各半兩									
右呶咀每服四錢水一盞薑三片煎六分去滓溫服無時候									
犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食									
犀角屑 赤芍藥 地骨皮 紅花 甘草 各半兩									



北柴胡 一兩 黃耆 一兩 麥門冬 人參 枳殼	赤茯苓 各三	右咬咀每服四錢水一盞半薑三片煎七分去滓無時溫服	黃耆散 治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼不思飲食	生乾地黄 黃耆 各一兩 犀角屑 甘草 瓜樓子	仁 黃芩 各半兩 人參 茯苓 各三	右為細末每服二錢水一中盞淡竹葉五片煎至七	欽定四庫全書 婦人大全良方	分溫服無時候	婦人寒熱方證第三 凡四方	經云陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒夫婦人勞傷氣血虛弱令陰陽交爭虛實不調故令寒熱如瘧也	地骨皮散 治婦人血風氣體虛發歇寒熱	北柴胡 地骨皮 一兩 桑白皮 枳殼 前胡	黃耆 各三 白茯苓 五加皮 人參 甘草 桂



心 白芍藥 各半兩	右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓	溫服無時候	生地黄散 治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思飲	食	生乾地黄 北柴胡 各一兩 羌活 木香 桂心	防風 各半兩 酸棗仁 羚羊角屑 白芍藥 白朮	黃耆 川牛膝 白茯苓 當歸 枳殼 各三分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫	服空心	柴胡散 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲	飲食	北柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮 各一兩 人參 地	骨皮 枳殼 製 生乾地黄 苦梗 桑白皮 赤	芍藥 各三分 鱉甲 炙二兩 麥門冬 三兩 甘草 半兩	右咬咀每服四錢水盞半薑三片煎七分去滓溫服



無時候

荊芥散 療時氣風溫寒熱瘴瘧往來潮熱並宜服之

陳皮 麻黃 香附子 甘草 各一兩 荊芥穗 厚

朴 各二兩 草果仁 三箇 川白芷 桂心 各半兩

右咬咀每服二錢水一大盞薑三片棗兩枚煎至七

分去滓溫服無時候

寡婦寒熱如瘧方論第四 九一方

論曰寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄略而

欽定四庫全書

婦人大全良方

論及言寡者孟子正謂無夫曰寡是也如師尼喪夫之

婦獨陰無陽欲男子而不可得是以慼慼成病也易曰

天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可

乎夫既處閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱

有類瘧疾久則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞

悶面黧瘦瘠等證皆寡婦之病診其脉獨肝脈弦出寸

口而上魚際究其脈原其疾皆血盛而得經云男子精

盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣



生地黄元 許學士云有一師尼患惡風體倦乍寒乍
 熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷
 寒治之大小柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部
 無寒邪脈但厥陰肝脈弦長而上魚際宜服抑陰等藥
 予製此方治之愈

北柴胡 秦艽 黄芩 各半
 生地黄 二兩 赤芍藥 一兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大烏梅煎湯下三十

元無時候日三服 許學士云嘗讀史記倉公傳載齊
 北王侍人韓女病腰背痛乍寒乍

欽定四庫全書

婦人大全良方

熱衆醫皆以為寒熱病也倉公曰病得之欲男子而
 不可得也何以知欲男子而不可得診其脈肝脈弦
 出寸口是以知之又有婦人熱入血
 室寒熱如瘧一證在本卷第十論

婦人惡寒方論第五 凡一方

論曰夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發
 於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脈
 必浮數發於陰者宜溫裏脈必沈細又有汗後利後惡
 寒及背惡寒已上疾證方治并載百問不復繁引僕嘗
 治一婦人但惡寒別無他證六脈平靜遂用敗毒散而



安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家慎不可過當
覆衣被及近火氣寒熱相薄脈道沈伏愈令病人寒不
可過但去被徹火兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人
惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能
治矣

敗毒散 見局方

婦人血風煩悶方論第六 凡四方

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之

欽定四庫全書

婦人大全良方

搏於血使氣不宣而否澁則生於熱或肢節煩疼口乾
少臥皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也

川烏頭元 治婦人血風虛冷月候不調或即脚手心

煩熱或即頭面浮腫頑麻

川烏頭

一斤用好清油 各四兩一處於銚內炭
火炒不住手攪候裂者仍須如桑根色為

度逐旋取出了於新瓦上或不
裂者不用裂者則去皮尖臍

五靈脂 去土石揀
淨四兩生

右為細末更入白中或乳鉢內研令停後將蒸餅水
浸後却瀝去水漸漸入白中和杵直待元得即元如



梧桐子大空心溫酒或鹽湯下二十元忌動風物丈	夫風疾亦治	赤芍藥散 治婦人氣血不和心胃煩悶不思飲食四	肢少力頭目昏眩身體疼痛	牡丹皮 白茯苓 赤芍藥 白芷 甘草 各一兩	柴胡 一兩半	右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎	至七分溫服食後臨臥	欽定四庫全書 婦人大全良方	酸棗仁散 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁喫	食減少	酸棗仁 赤芍藥 當歸 羚羊角屑 赤茯苓	紅花 生地黃 各三分 防風 羌活 川牛膝 麥	門冬 桂心 川芎 地骨皮 甘草 各半兩	右呖咀每服四錢水盞半薑三片薄荷少許煎七分	溫服	當歸散 治婦人血風潮熱



當歸 _{二兩} 芍藥 延胡索 不灰木 熟地黄 _{各一兩}	大黃 _{三三分} 桂心 _{半兩} 甘草 _{一分}	右為細末每服二錢水一盞胭脂一小角子煎至六	分去滓如躁時放冷服細呷清者	婦人血風攻脾不能食方論第七 _{凡四方}	夫脾象於土脾為中州意智之藏也其肝心肺腎皆受	脾之精氣以榮養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃	為水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人血氣	欽定四庫全書 婦人大全良方	不調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在內攻於脾胃脾胃既	虛為邪所乘則不能摧伏五穀故令不能食也	草豆蔻散 治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納飲食	人參 _{一兩} 草豆蔻仁 _{麪裹} 白茯苓 _{各三分} 半夏 _{各三分} 良薑	白朮 縮砂仁 枇杷葉 _{去毛} 桂心 木香 青	皮 甘草 _{各半兩}	右為粗末每服三錢水一大盞薑三片煎至七分去	滓溫服無時候



神麴元 治婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲食	白朮 附子 ^炮 枳殼 ^製 訶子 桂心 人參 木	香 食茱萸 ^泡 陳皮 ^兩 各一 苦梗 乾薑 ^兩 各半	右為細末以酒煮神麴末二兩作糊為元如梧桐子	大每服二十元空心薑湯吞下	椒紅元 治婦人血風攻脾胃臟腑虛冷全不思食臍	腹多痛體瘦無力	椒紅 沉香 附子 ^炮 莪茂 訶子 當歸 白	欽定四庫全書 婦人大全良方	朮 ^兩 各一 良薑 白豆蔻仁 丁香 ^兩 各半 麝香 ^分 一	右為細末酒煮麴糊員如梧桐子大空心溫酒下三	十元	進食散 李潛云治脾胃虛寒不思飲食及以病人脾	胃虛全不入食者只兩服能食 ^{出蘇沈良方} 據愚見此方既	有川烏治血風攻脾不食豈無良驗	青皮 陳皮 粉草 良薑 桂心 ^{各一分} 川烏 ^炮	皮 草豆蔻仁 ^{各三} 訶子 ^五



右為細末每服一錢水一盞薑二片煎至七分溫服

婦人夢與鬼交方論第八 九三方

夫人稟五行秀氣而生承五藏神氣而養若陰陽調和則臟腑強盛風邪鬼魅不能傷之若攝理失節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼邪干其正然婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得為病也其狀不欲見人如有對晤時獨言笑或時悲泣是也脈息遲伏或如鳥啄皆鬼邪為病也又脈來綿綿不知度數而顏色不變此

欽定四庫全書

婦人大全良方

亦是此候也

茯神散 治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語雜亂

茯神 一兩半 茯苓 人參 石菖蒲 各一兩 赤小豆 半兩

右咬咀每服三大錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

桃仁元 治婦人與鬼魅交通

辰砂 檳榔 當歸 桃仁 各三分 水銀 一分 麝香 一分 肉桂 一分



麝香 阿魏 麝 各半 沉香 兩
右為細末煉蜜元如梧桐子大空心桃仁湯吞下十元
又方 似辟瘟丹
虎頭骨 二兩 朱砂 雄黃 雌黃 鬼白 皂莢
蕪荑仁 鬼箭 梨蘆 各一兩
右件生為末煉蜜為元如彈子大囊盛一元男左女
右繫臂上及用一元當病人戶前燒之一切邪鬼不
欽定四庫全書 婦人大全良方
敢近
太乙神精丹 蘇合香元皆可用也
婦人傷寒傷風方論第九 九八方
論曰古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血
血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相刑傷寒氣
口緊盛即宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可
下當發其汗以救血室榮衛得和津液自通浹然汗出
而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語



如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃
氣者言不可下也 小柴胡湯主之若行湯遲則熱入
胃令津燥中焦上焦不榮成血結胃狀須當針期門也
五行相尅以生相扶以出平居之日水常養於木水木
相生則榮養血室血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積則
剛燥不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜忘小腹
滿小便利屬抵當湯證也

傷寒胃實譫語宜下之婦人
熱入血室譫語者不可下也

雖然婦人傷寒與男子治法不同男子先調氣婦人先

欽定四庫全書

婦人大全良方

調血此大略之詞耳要知脈緊無汗名傷寒脈緩有汗
為傷風熱病脈洪大中暑脈細弱其證一也假如中暈
用白虎胃實用承氣豈必調血而後行湯邪仲景傷寒
論所以不分婦人者良亦在學者皆可隨病於男子藥
證中以意選用也 若姙婦傷寒藥性須涼慎不可行
桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋為姙
婦而去也大抵產前先安胎產後先補益次服傷寒藥
若病稍退則止藥不可盡劑此為大法 黃帝問婦人



重身毒之奈何岐伯曰有故無殞亦無損也大積大聚
其可犯衰其太半過其厄 男子婦人傷寒仲景治法
別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景所撰而
王叔和為之序以法考之間有可取疑非古方特假聖
人之名以信其說於天下今取金匱玉函治婦人傷寒
與俗方中可採者列為一卷雖不足以盡婦人傷寒之
詳並可以百問中參用也

婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不

欽定四庫全書

婦人大全良方

得往來宜桂枝紅花湯

桂枝 芍藥 甘草 紅花
三兩 二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半薑四片棗二个煎至七

分去滓溫服良以再服汗出而解

婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食黃芩芍藥湯療之

黃芩 芍藥 白朮 生乾地黄

右各一兩㕮咀每服五錢水一盞煎至七分去滓溫

服寒則加生薑



婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下宜	服當歸湯	柴胡 ^三 白朮 ^二 人參 甘草 赤芍藥 當歸 ^{各一}	五味子 ^兩 木通 ^{各半}	右呖咀每服半兩水一盞半生薑四片棗二枚煎至	八分去滓稍熱服	婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁譫語目赤	毒氣閉塞不得通宜瀉心三黃湯	欽定四庫全書	婦人大全良方	川大黃 鼠尾黃芩 鷹爪黃連 ^{等分}	右為粗末每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服取	微利如目赤睛疼宜加茯苓嫩竹葉瀉肝之餘氣	婦人傷寒差後猶有餘氣不去謂之遺熱宜乾地黃湯	乾地黃 ^{兩一} 大黃 黃連 黃芩 柴胡 白芍藥	甘草 ^{各一兩半}	右呖咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服取	澹利汗出解



男子病新差婦人與之交合得病名曰陽易其證裏急腰胯及腹內痛身重宜燒裨散
用男子裨襠燒灰為末以水調方寸匕服即愈
婦人病未平復因有所動致熱氣上衝曾手足拘急搐搦如中風狀宜青竹茹湯
栝樓根二兩 淡青竹茹半升
右以水二升半煮取一升二合去滓分作三服
婦人病未平復因有所動小腹急痛腰胯疼四肢不任
欽定四庫全書 婦人大全良方
舉動無力發熱者宜當歸白朮湯
桂枝 白朮 當歸 甘草 芍藥 人參 黃耆
耆各一分 生附子一箇破作八片各一分 生薑兩半
右呔咀水三升煮取一升半去滓通口服一湯盞食頃再服溫覆微汗差
婦人熱入血室方論第十 凡五方
婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦宜小柴胡湯



婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為	熱入血室其血必結故使如癰狀宜服小柴胡湯	柴胡 八錢 黃芩 人參 生乾地黄 甘草 各三錢	半夏 二錢	右呖咀每服五錢水盞半薑三片棗二枚煎至八分	去滓溫服	局方四物湯 不用熟地黄只用生乾地黄加北柴胡	等分煎服亦療此證	欽定四庫全書	婦人大全良方	婦人傷寒經脉方來初斷寒熱如癰狂言見鬼宜服乾	薑柴胡湯	柴胡 四兩 桂枝 半兩 枳椇根 二兩 牡蠣 乾薑 甘草	各一兩	右呖咀每服五錢水盞半煎七分去滓溫服初服微	煩再服汗出而愈	婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近宜海蛤散婦人	血結胃法當針期門仲景無藥方此方疑非仲景然其



言有理姑存焉

海蛤 滑石

甘草

各二兩

芒硝

一兩

右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胃膈
血散臍中血聚則小腸壅小腸既壅則臍中血不流
行宜此方小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗
則愈

婦人傷風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身

涼和胃脇下滿如結胃狀譫語者此為熱入血室也當

欽定四庫全書

婦人大全良方

刺期門穴隨其實而取之期門穴在乳直下筋骨近腹
處是也凡婦人病法當刺期門不用行子午法恐纏藏
膜引氣上但下針令病人吸五吸停針良久徐徐出針
此是平瀉法也凡針期門必瀉勿補可肥人二寸瘦人
寸半深也



婦人咳嗽方論第十一

凡九方

夫婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也肺為四臟之華蓋內統諸臟之氣外合於皮毛若為寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳也大抵治咳不可一槩治當以脈息辨之其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澁者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不妥者也

欽定四庫全書

婦人大全良方

咳嗽用溫藥方論第十二

經曰微寒為嗽寒甚為腸辟古人立方治嗽未有不本於溫藥如乾薑桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發散以此準之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因欬為肺痿又實則為肺癰虛則為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脈數發熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥如建中之屬今人但見發熱咳



嗽率用柴胡鱉甲門冬葶藶等藥旋踵受弊而不知非 可為深戒就使不可進以溫藥亦須妙以湯元委曲調 治無為鹵莽致傷人命
黃耆散 治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾
黃耆 四兩 甘草 二兩
右為細末湯點一二錢服日三 一方甘草一兩黃 耆六兩名黃耆六一湯只呬咀水煎服
蛤蚧元 治婦人咳嗽不止漸成勞氣宜服
欽定四庫全書 婦人大全良方
蛤蚧 一對 紫苑 炙 款冬花 鱉甲 炙 貝母 去心 皂莢
子仁 各一兩 杏仁 炒去皮尖
右為細末煉蜜員如梧桐子大每服二十元淡薑湯 吞下
含化元 昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺 勞服此安冠宗爽方
枇杷葉 去毛 桑白皮 款冬花 木通 紫苑 杏
仁 各等分 大黃 減半



右為細末煉蜜元如櫻桃大食後夜卧含化一元	貝母湯 治諸嗽久不差 出本	貝母 生薑汁浸半日 北五味子 黃芩 乾薑 熟者減半 陳皮	各一兩 半夏 桑白皮 桂心 北柴胡 熟者加一兩	木香 甘草 各一分	右為粗末每服五錢水一棧半杏仁七箇去皮尖碎	之生薑二片煎至七分去滓熱服黃師文云戊申冬	有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一投而瘥以此	欽定四庫全書 婦人大全良方	治諸嗽悉皆愈	定喘湯 治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急	喉中涎聲曾滿氣逆坐臥不安飲食不下及治肺感寒	邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之	半夏 炒 明阿膠 炒 甘草 各錢半 鷲粟殼 半兩製 北五	味子 桑白皮 麻黃 去節 人參 各一分	右咬咀每服三大錢薑三片烏梅半箇煎至七分去	滓漸漸溫服食後臨臥服 方同和劑分兩加減不同有效



滄州李官人宅補肺湯 治狀同前 又名清金湯	鷲粟殼 製二兩 人參 粉草 各半兩 陳皮 茯苓 杏	仁 製 白朮 明阿膠 炒 北五味子 桑白皮 薏	苡仁 紫蘇莖 各一兩	右呖咀為末每服三大錢水淺半薑三片棗兩枚烏	梅半箇煎至一瓊臨卧溫服僕每用則無效遂加百	合貝母去心半夏麴欵冬花各一兩服之良驗	金不換散 治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿	欽定四庫全書 婦人大全良方	悶咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅	痰及遠年日近一切喘咳疾諸藥不效者並治之	鷲粟殼 製半兩 杏仁 製 甘草 各三錢 枳殼 四錢	右呖咀每服三錢水一盞半薑三片烏梅半箇煎至	八分食後臨卧漸漸熱服 許元林先生方乙卯年七月僕嘗治一婦人咳嗽不	已服諸藥無效漸成勞瘵求余診之六脈濡弱以愚	考之比是血弱又因憂感太過而成斯疾合用當歸	等藥治之必愈遂先用古今錄驗橘皮湯空心服蘇	子降氣湯後用金釵煎熟地黃元當歸元調理得安	又治一婦人時行感熱咳嗽遂用小柴胡湯去人參薑



棗只加北五味子煎服愈

古今錄驗橘皮湯 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中

作聲上氣不得下頭痛方

陳皮 紫苑 麻黃去根 杏仁製 當歸 桂心 甘

草 黃芩各等分

右呖咀每服五錢水淺半煎至一錢去滓熱服

勞嗽方論第十三 凡二方

經曰人感於寒則受病微則為咳甚則為泄為痛凡咳

欽定四庫全書

婦人大全良方

嗽五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣合於皮毛

邪之初傷先客皮毛故咳為肺病五臟則各以治時受

邪六腑則又為五臟所移古人言肺病難愈而善卒死

者肺為驕藏怕寒而惡熱故邪氣易傷而難治以其湯

散遲過針灸不及故也十種咳嗽者肺咳心咳脾咳腎

咳肝咳風咳寒咳支飲咳膽咳厥陰咳華佗所謂五嗽

者冷嗽氣嗽躁嗽飲嗽邪嗽孫真人亦有方治寒毒注

嗽者歷代方論著之甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經



參 半夏 洗各一分	皮 各二分 蜈蚣 一枚去頭足炙 細辛 甘草 炙 鬼督郵 人	乾薑 桂心 躑躅花 芎藭 紫苑 芫花根	嗽五邪嗽	深師四滿元 療五嗽一上氣嗽二飲嗽三鰓嗽四冷	灸不及以藥含化蟲死即嗽止 見張銳方	意矣又肺中有蟲如蚕令人喉痒而咳嗽湯散逕過針	砂雄黃安息香之類以通神明之藥療之高出古人之	欽定四庫全書 婦人大全良方	名公能推原其旨意率用蛤蚧天靈蓋桃柳枝麝香丹	食者全用蜈蚣外臺方四滿元治五嗽亦用蜈蚣遇世	治注嗽通氣元方用蜈蚣四節又云夢與鬼交通及飲	挾邪惡傳症之氣所以特甚病之毒害無過此也真人	血而後嗽或先咳嗽漸就沈羸此則非特內損肺經又	時發時差又有因虛感邪惡之氣且傳注得之或先嘔	酒色過度勞極傷肺損動經絡其重者咯唾膿血輕者	見意其華佗所謂邪嗽真人所謂注嗽者是也此病蓋



右十二味為細末煉蜜元如大豆許每服五元米飲 下日三未知加至七八元服此藥無不差忌羊肉錫	生葱生菜海藻菰菜	古今錄驗四滿元 療五嗽一氣嗽二痺嗽三鰓嗽四	邪嗽五冷嗽悉療之方	蜈蚣 二枚 芫花 根五 躑躅花 炒 乾薑 芎藭 桂	心 各四 人參 細辛 各二	右為末煉蜜元如梧桐子大米飲下一十元日三服	欽定四庫全書 婦人大全良方	加至十五元忌生葱生菜	喘滿方論第十四 凡六方	夫喘之為病黃帝問岐伯岐伯對曰夜行則喘出於腎	淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘	出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時	勇者氣行則已怯者則着而為病也原疾之由雖曰皆	本於肺與氣然感外邪則有太陽證脈浮無汗而喘者	宜麻黃湯陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜



承氣湯若表邪未解誤服下利藥不止脈促喘而汗出者宜葛根黃連黃芩湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黃杏子甘草石膏湯若表邪未解心下停水發熱而喘或嘔者小青龍湯去麻黃加杏仁主之若陰證喘促者四肢逆冷脈息沈細或寸大尺小或六脈促疾或心下脹滿結硬或冷汗自出或大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜返陰丹主

欽定四庫全書

婦人大全良方

之已上方並見百問不復錄

僕且以大槩而言之諸藏相乘而喘者

以杏子散如感寒伏熱而喘者以華蓋散九寶湯若暴寒向火覆衣被過當傷熱肺實而喘促者其狀多有熱證宜洗心散冷水調服若因氣宇不調痰盛喘促者宜四七湯兼官局桔梗湯薑煎服若涎多而喘者宜千縉湯橘皮半夏湯若不得臥卧即喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則浮而開使氣不得通流其脈沈大宜神秘湯肺之積名曰息責在右脅下大如杯令人洒淅



寒熱喘咳發癰疽宜棗膏元若上氣喘者神授湯若上 盛下弱而喘促者宜蘇子降氣湯吞黑錫丹若尊年之 人素來稟賦太厚不任熱藥者不可輕投丹劑及諸熱 藥但以秘傳降氣湯分心氣飲論之梗槩不出於此矣 若素有脚氣而喘者當作脚氣治之又有骨蒸勞喘自 有專門不敢濫及	神秘湯 治水氣乘肺而喘兼療支飲而喘	陳橘皮 洗去白 紫蘇葉 人參 桑白皮 生薑 等分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右呶咀每服半兩水煎去滓溫服	杏子散 治諸藏相乘喘急	杏仁 去皮尖雙仁麩炒黃細研如膏 麻黃根 為細末等分	右和煎橘皮湯調下二錢無時候	千縉湯	齊州半夏 七枚炮裂 皂角 去皮炙 甘草 炙一寸 生薑	如指大	右同以水一椀煮去半頓服沈興宗待制嘗病痰喘



不能臥人扶而坐數日客有見之曰我曾如此得良	藥一服差我以千緡酬之謂之千緡湯可試為之興	宗得湯一服而差	棗膏元 療息賁	葶蘆 研 陳皮 苦梗 各等分	右後二味為末入葶蘆令停煮肥棗肉研為膏和圓	如梧子大每服五七元飲下 許學士云予嘗患停	飲水積肺經食已必噦漸喘覺肺系急服此良驗	欽定四庫全書 婦人大全良方	神授湯 治上氣喘急不得卧	橘紅 苦梗 紫蘇 人參 北五味子 等分	右呶咀每服四錢水一錢煎至六分去滓食後服	九寶湯 治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小兒	室女產前產後皆可服惟虛勞自汗不可服	薄荷葉 紫蘇 大腹皮 洗 麻黃 去根節 桑白皮	桂心 杏仁 去皮尖 陳橘皮 甘草 各二兩	右呶咀每服半兩水一錢半薑十片烏梅一箇煎至



六分去滓溫服食後 有兩浙張大夫病喘二十年
每至秋冬輒劇不可坐卧百方不差後得臨平僧法
本方服之遂差法本凡病三十年服此藥半年乃絕
根本永不復發凡服此藥須久乃差

官局桔梗湯

橘皮半夏湯

洗心散

華蓋散

並見局方

不復贅錄

四七湯

見本卷二十卷

僕嘗療羅安人年近六十遇秋

冬之交上氣喘促不能坐卧六脈洪實服諸藥無效問
疾之原少年自川中任所服餌丹砂又恐是丹毒為害

欽定四庫全書

婦人大全良方

遂服洗心散無效僕以華蓋散數服而愈謾記之

婦人風痰方論第十五

凡八方

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胸膈所成
也人皆有痰少者不能為妨多者成患但胸膈有痰飲
漬於五臟則令眼暈亦令頭眩頭痛也

評曰夫痰之為害多因外感五邪

五邪者寒暑燥濕風

內傷七

氣

七氣者喜怒憂思驚恐恚

因五邪而得者得風為風痰得寒為

寒痰得冷為冷痰得熱為熱痰得暑為暑痰因七氣



所傷者多因婦人性情執著不能容忍而有此證豈特只因風冷而成哉所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液淚汗涕唾身中濕者敗濁變而成痰乘間而為害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎飲沫四種相類宜仔細詳辯調治因風而生痰者宜服三生飲星香飲青州白元子化痰元方見局方因寒冷而得者宜服降氣湯黑錫丹養正丹並見局方因熱而得者宜服金沸草散柴胡半夏湯因	欽定四庫全書 婦人大全良方	暑而得者消暑元並見局方因氣宇不調鬱結而成者宜服參蘇飲四七湯二陳湯痰在上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹利之雖曰可吐可下亦要觀人之	勇怯察脈之虛實方可投之切記不宜痛擊暴下所以初虞世有金虎碧霞之戒者此也	三生飲 星香飲 參蘇飲方並見第三卷第一論	控涎丹方見第三卷第六論 養正丹方見第四卷第四方論	旋覆花湯 治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶



旋覆花 去蒂 枇杷葉 去毛 川芎 北細辛 藿香	桂心 枳殼 去穰 前胡 去麁 人參 去蘆 羌活 半夏	各半 甘草 羚羊角 屑 赤茯苓 各三	右為粗末每服三錢水一棧薑三片煎至七分去滓	溫服	天南星元 治婦人風痰心膈壅滯	天南星 白附子 並炮 皂莢仁 炒黃 半夏 各一 麝香	半兩 枯	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末以酒煮麪糊圓如梧桐子大每服十元生	薑薄荷湯吞下	又方	半夏 天南星 各二 肥皂莢 五挺 生薑 三	右以水五升一同煮令水盡去皂莢生薑只用半夏	南星焙乾為末以酒煮麪糊圓如梧桐子大生薑薄	荷湯下七元	柴胡半夏湯 治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱榮



衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治	五嗽痰癖	柴胡 八兩 半夏 三兩 人參 去蘆 甘草黃芩麥門冬	各三兩 白朮 二兩	右咬咀每服五錢水棧半薑五片棗一枚煎至八分	去滓服	金沸草散 治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋緊急	時發寒熱皆類傷風	欽定四庫全書	婦人大全良方	荊芥穗 四兩 半夏甘草北細辛 各一兩 赤茯苓 二兩	前胡旋覆花 各三兩	右為細末每服二錢水一棧生薑五片棗一枚煎至	六分熱服未知再服 局方有麻黃赤芍藥無細辛茯苓	瓜蒂散 療病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸	中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此為胸中有痰也當吐	之宜服此	瓜蒂 炒黃 赤小豆 各半兩



右為細末取一錢匕豉一合湯七合先漬之須臾煮
作稀糜去滓取汁和散溫頓服不吐少少加得快吐
乃止諸亡血虛家不可與之

脈微大忌
令人吐

大半夏湯 治痰飲及脾胃不和

半夏 白茯苓 生薑

各一分

右㕮咀作一服每遇膈間有寒痰以水二盞煎至一
盞去滓臨卧溫呷如有熱痰加炙甘草一分如脾胃
不和去甘草加陳橘皮一分同煎此即二陳湯加減

欽定四庫全書

婦人大全良方

得理

四七湯 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破
絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣所為
也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因
痰飲中節嘔逆惡心並宜服之 婦人性情執着不能
寬解多被七氣所傷遂致氣填胸臆或如梅核上塞咽
喉甚者滿悶欲絕產婦尤多此證宜服此劑間以香附
子藥久服取效切不可謂紫蘇耗氣且謂新產氣血俱



虛不肯多服用之效驗不可具述

紫蘇葉^二厚朴^三茯苓^四半夏^五

右咬咀每服四錢水一錢半薑七片棗一箇煎至六分去滓熱服無時候若因思憂過當小便白濁用此藥吞青州白元子極妙

婦人心胸嘈雜方論第十六 凡二方

夫心胸嘈雜婦人多有此證原疾之由多是痰也皆血液淚汗變成或云是血嘈今人多用猪餘血炒而食之

欽定四庫全書

婦人大全良方

則愈詳其此理是以血導血歸原爾恰如以鹽梅下涎之義不若用許學士旋覆花湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口中清水自出脇肋急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉遲弦細是其證也旋覆花湯方

旋覆花 北細辛 橘紅 桂心 人參 甘草

苦梗 白芍藥 半夏^{各半} 赤茯苓^三

右咬咀每服四錢水一錢半薑七片煎至八分去滓溫



婦人大全良方卷六										欽定四庫全書	局方治惡阻半夏茯苓湯亦妙 方見惡阻論中										服
										婦人大全良方											



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷七

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄舉人臣馮 蓋



欽定四庫全書

婦人大全良方卷七

宋 陳自明 撰

婦人嘔吐方論第一

凡六方

夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理所為也胃為水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃胃氣逆則令嘔吐也 愚詳曰夫嘔吐之疾非特脾胃虛冷而嘔吐也亦有胃熱而嘔者亦有胃中冷胃口熱而吐者

欽定四庫全書

婦人大全良方

亦有痰盛而嘔者亦有血弱而嘔者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥 如胃冷而嘔吐宜用局方人參丁香散理中元及許仁則半夏元人參七味元 如胃熱而嘔吐者宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯槐花散如胃中冷胃口熱而嘔吐者宜用局方藿香正氣散生薑棗子煎沈冷服即止 如痰盛嘔吐者宜局方半夏茯苓湯二陳湯 如惡阻兼服茯苓元 自有專門見十卷第二論 如血不歸原而嘔吐者宜用十全大補湯加陳皮半夏



藿香薑棗煎服 或有脚氣而嘔者自有專門不敢濫	及	益智子散 治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不下	食四肢無力	益智 一兩 附子 炮 縮砂仁 丁香 厚朴 黃耆	白朮 白茯苓 陳皮 川芎 良薑 藿香葉	當歸 各三分 人參 桂心 各半兩	右呖咀每服三錢薑三片棗一枚水一盞煎至七分	欽定四庫全書	婦人大全良方	去滓無時溫服	丁香散 治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水穀	不消	丁香 白朮 縮砂仁 草果仁 各三分 人參 一兩 當	歸 白豆蔻 藿香葉 甘草 各半兩 橘皮 三分 神麴	訶子 各半兩	右為細末每服二平錢煎薑棗湯調下	竹茹湯 治胃熱嘔吐



乾葛 三 半夏 湯洗十次薑汁半盞漿水一 甘草 三	右咬咀每服五錢水二盞薑三片竹茹一彈大棗一枚煎至一琰去滓溫服	許學士云胃熱者手足心熱政和中一宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃脘孫兆竹茹湯正相當爾	亟治藥與之即時愈	欽定四庫全書 婦人大全良方	良方槐花散亦相類方 皂莢 白礬 槐花 炒令黃 甘草 等分	右為細末白湯調二錢	許仁則半夏元 療積冷在胃嘔逆不下食方 半夏 一升真熊州者洗去滑 小麥麩 一升	右擣半夏為散以水搜麩圓如彈子大以水煮令麩熟則是藥成初吞四五元日二服稍加至十四五元旋煮旋服服此覺病減欲更重合服亦佳忌羊肉錫



救急同

又依前半夏元雖覺漸損然病根不除欲多合前元又
 慮藥毒不可以服欲不服又恐病滋蔓宜合人參七味
 元服

人參 白朮 各五兩 厚朴 炙 細辛 各四兩 生薑 八兩 橘

皮 三兩 桂心 二兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大飲下十元漸加至二
 十元與半夏元間服亦可忌桃李雀肉生葱生菜吳

欽定四庫全書

婦人大全良方

昇同

婦人霍亂方論第二 凡六方

論曰嘔吐而利者名霍亂也原疾之由皆因腸胃虛冷
 飲食過度觸冒風冷使陰陽不和清濁相干致令揮霍
 變亂也或先心痛而吐者或先腹痛而利者或吐利俱
 作者或頭痛身體壯熱而脈浮洪者或陽氣暴絕而手
 足逆冷而脈息微絕者治之當分陰陽察其虛實辨其
 冷熱觀其脈息熱者涼之冷者溫之以平為期百問云



凡霍亂吐利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中 元吐利已汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈 四逆加猪膽汁湯 夏月中暑霍亂大煩渴四肢逆冷 冷汗出脚轉筋者香薷散濃煎沈冷服即效 凡霍亂之脈得浮洪者易治微遲者并氣短者難治	加減理中元 主霍亂臨時方亦可治男子 出千金翼	人參 白朮 乾薑 甘草 各一兩	右為細末煉蜜為元每兩作五元取湯和一元服之	欽定四庫全書 婦人大全良方	日十服吐多利少者取枳實三枚炙去穰四破水三 升煮取一升和一元服之 吐少利多者加乾薑一	累 吐利乾嘔者取半夏半兩泡洗去滑水二升煮 取一升和一元服 若體疼痛不可堪者水三升煮	棗三枚取一升和一元服 若吐利大極轉筋者以 韭汁洗腹腎從臍至足踝勿逆即止 若體冷微汗	腹中寒取附子一枚炮去皮四破以水二升煎取一 升和一元服 吐利悉止脈不出體猶冷者可服諸				



湯補之

千金翼四順湯 治霍亂吐利腹痛手足逆冷脈微欲

絕

附子一箇破 乾薑三兩 人參 甘草各一兩

右咬咀水煎服

四逆加猪膽汁湯 治吐已下斷汗出而厥四肢拘急

不解脈微欲絕者

甘草二兩 乾薑三兩 附子一枚 猪膽汁半合

欽定四庫全書

婦人大全良方

右三味咬咀每服五錢水三瓊煮至二瓊去滓內猪
膽汁分作兩次溫服其脈即來

香薷散 治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷

過度或起居不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之

氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令

真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間便至吐

利心腹疼痛霍亂氣逆有先心痛而吐者或先腹痛而

利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩



者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷脉微欲絕者或煩悶昏塞欲死者姙婦霍亂吐利此藥悉能主之 香薷葉四兩 白扁豆 厚朴各二兩 右咬咀每服半兩水一大盞酒一分慢火濃煎至六分去滓井中浸令冰冷頓服無時候連併二三服立見神効蘇沈良方中名香薷散百問同有黃連無扁豆	欽定四庫全書 婦人大全良方	訶子散 治老幼霍亂吐利一服取効又治九種心痛及心脾冷痛不可忍其功如神	訶子 甘草 厚朴 乾薑 草薢仁 陳皮	良薑 茯苓 神麴 麥牙各等分	右為細末每服二錢候發刺痛不可忍用水一盞煎七分入鹽服急則鹽點	胡椒湯 治霍亂吐利甚妙	胡椒四十粒 菴豆一百七粒



右為細末木瓜煎湯調下二錢	婦人翻胃吐食方論第三 凡二方	白堊散 治婦人翻胃吐食千金翼云不特治婦人男	子亦可服一斤以上為妙	白礬土 以米醋一升煨白礬土令赤入醋內浸令冷再煨再浸以醋乾為度取一兩研乾	薑 一分 炮	右為細末研停每服一錢飯飲調下甚者二錢	白芷散 治婦人翻胃吐食	欽定四庫全書 婦人大全良方	右用白芷一兩切片於瓦上炒令黃為細末用猪血二十文切片以沸湯泡七次將血蘸藥喫七片如	剩藥末留後次用	婦人血膈方論第四 凡一方	牡丹煎 治婦人血膈	牡丹皮 苦參 貝母 去心 玄胡索	白芍藥	右等分為細末煉蜜圓如梧桐子大每服十五二十



圓米飲吞下無時候		婦人鼻衄方論第五		凡七方		夫婦人鼻衄者由傷動血氣所致也凡血氣調和則循環表裏經絡澁則不散若勞傷損動因而生熱氣逆流		溢入於鼻者則成鼻衄也只有產後見衄者不可治		凡鼻衄雖多因熱而得此疾亦有因怒氣而得之者曾		趙恭人鼻衄不止諸治不差召予治之先用蘇合香丸		四粒次用五苓散濃煎白茅花湯調服即止次用芎歸		湯調理又有一富室男子鼻血不止六脈洪數究竟云		服丹藥太過遂用黃連黃芩大		黃為末水煎服愈調服亦可		欽定四庫全書		婦人大全良方		刺薊散 治婦人鼻衄血流不止		刺薊 二兩 桑耳 亂髮灰 艾葉 各一兩 炒 生地黄 二兩 蒲		黃 半兩		右為細末每服二錢無時粥飲調下		伏龍肝散 治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆治		之		伏龍肝 生地黄 各一兩 竹茹 一升 芍藥 當歸 黃		芩 川芎 桂心 甘草 各二兩	



右咬咀水一斗三升煮竹茹減三升內藥煮取三升
分為三服千金無桂

百問有茅花湯 以白茅花濃煎飲之立止

一方擣生白茅根取汁一合飲之止 又方取生葱心

塞鼻中即定若因刺著并刀斧所傷血不止並用之立

定

又方取釜底墨細研入鼻中 又方取亂髮灰細研以

竹管吹入鼻中立止 又方取龍骨末吹入鼻中立止

欽定四庫全書

婦人大全良方

婦人吐血方論第六

凡十三方

夫婦人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於經
絡內榮於臟腑若傷損氣血經絡則虛血行失於常理
氣逆者吐血又怒則氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內傷
氣逆上者皆吐血也

雞蘇散 治婦人吐血心煩昏悶

雞蘇葉

兩

阿膠

刺薊

生地黄

兩

各一

黃耆

羚羊

羊角屑

茜根

甘草

兩

各半

麥門冬

黃芩

當



歸 伏龍肝 各三分	右為粗末每服四錢水一盞薑三片竹茹半雞子大煎至六分去滓溫服	雞蘇散 治婦人虛損氣逆吐血不止	雞蘇葉 黃芩 各一兩 當歸 赤芍藥 各半兩 伏龍肝	阿膠 各二兩	右為粗末每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服	治婦人熱毒上攻吐血不止	欽定四庫全書 婦人大全良方	生藕汁 刺薊汁 生地黄汁 各三兩 生薑汁 半合 白	蜜 一合	右和煎三兩沸無時以一小盞調炒麵塵一錢服	千金翼 治吐血百方不差療十差神驗不傳方詳	此藥性治熱毒吐血有效	地黄汁 半升 生大黃末 一方寸匕	右煎地黄汁三兩沸調大黃末 分為三服	又方



伏龍肝	右研令極細每服二錢新汲水調下頻服取効	又方	白茅根 一握長六寸	右以水一大棧煎取七分去滓溫服	又方 治吐血	桂心末	右水調方寸匕日夜可二十服	欽定四庫全書 婦人大全良方	又方	生地黄 三斤切 阿膠 二兩炒 蒲黃 六合	右水五升煮取三升分三服 僕嘗治一人吐血診其怒極而得之遂用蘇合香元和雞蘇元服即效養生必用方云凡吐血須煎乾薑甘草湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者服生地黃竹茹藕汁去生便遠	柔脾湯 治虛勞吐血衄血下白汗出方 出養生必用	甘草 白芍藥 黃耆 各一兩 熟地黄 三兩	右為末每服四錢水酒各一棧已上煎至七分去滓



取六分清汁溫服食前于嘗治一女年十九歲月經不行遂妄行而嘔血諸藥無效察其形容人肥脈不大不小僕投以四生元即安又嘗治一男子因飽低頭負重吐血諸藥無効亦投四生元及青餅子即安更不發僕觀初虞世治吐血不喜用竹茹生地黃藕汁然亦不可狎泥此說如陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢宜服涼藥以解之大黃犀角生地黃生艾藕汁豈能無效如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成冰宜服溫藥以煖之乾薑肉桂豈能無功學者更宜思之	四生元 療吐血凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥	生荷葉 生艾葉 生栢葉 生地黃	欽定四庫全書 婦人大全良方	右等分爛研圓如雞子大每服一圓水三瓊煎至一	瓊去滓溫服無時候陳日華云先公紹興初避福清靈石寺主僧留飲食將竟侍者	赴堂齋罷來侍立見桌子上不穩急罄折扱之舉首即嘔血蓋食飽拘破肺也明年再到寺因問去年嘔血者無恙否其主僧荅云得四生圓服之遂愈自得此方屢救人有效	療熱甚嘔血者以犀角地黃湯局方小三黃元以白茅	根煎濃湯吞之妙	犀角地黃湯 治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑	芍藥三分 生地黃半斤 牡丹皮去心一兩 犀角屑一兩如無升麻川芎



代	右咬咀每服五錢水煎服有熱如狂者加黃芩二兩	青餅子 治咯血	青黛 杏仁 各一兩華佗方以牡蠣粉炒杏仁去皮尖牡蠣不用	右一處同研成膏熔黃蠟和作三拾餅子每服一餅	子用乾柿半箇夾定以濕紙裹煨令香同嚼粥飲下	無時候	若陰乘於陽心肺經寒而嘔血者宜服乾薑一甘草湯	欽定四庫全書 婦人大全良方	甘草 乾薑 各半兩	右咬咀水煮頓服 局方理中湯亦妙 方見和劑	婦人痿痺諸氣方論第七 凡四方	夫婦人痿痺者本因邪氣積聚而生也痿者在腹內近	臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣	而成如弦之狀名曰痿氣也痿者為僻側在兩肋之間	有時而痛故曰痿也夫痿之與痺皆陰陽不和經絡否	隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則發



作疼痛故曰瘰癧者也	麝香元 治婦人瘰癧冷氣兼疰氣心腹痛不可忍	麝香 半兩 別研 阿魏 一分 麝 一分 五靈脂 桃仁 三稜	各三 分 芫花 醋炒 檳榔 各一 莪茂 桂心 沒藥 木	香 當歸 各半	右為細末入麝香令停用粳米軟飯為圓如梧桐子	大每服十元無時澹醋湯下	治婦人瘰癧及血氣等神效方	欽定四庫全書 婦人大全良方	右以獾猪肝一具可及十兩者用巴豆五十枚去大	皮剉在肝內用醢醋三椀慢火熬令肝爛熟入砂鉢	內研令極爛入京三稜末和就得所為圓如梧桐子	大每服五元食前熱酒下 肝熟後去巴不用 夫瘰癧瘰癧血氣塊硬發歇刺	痛甚則欲死究而言之皆血之所為僕嘗治一婦人	血氣刺痛極不可忍甚而死一二日方省登巫併治	數年不愈僕以葱白散烏雞元遂安又嘗治一婦人	止亦用此二藥而愈尋常小小血 氣用此二藥亦有奇效故錄于後	烏雞煎元 方見二十四 卷拾遺門



葱白散 專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛	大治婦人產前後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血	臟宿冷百節倦疼肌體怯弱勞傷帶癖久服盡除但婦	人一切疾病最宜服此	川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾薑 芍	藥 舶上茴香 青皮 苦楝子 木香 熟地	黃 麥牙 三稜 莢茂 茯苓 神麴 人參	各等分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末每服三平錢水一盞連根葱白二寸拍破	鹽半錢煎至七分溫服內大黃訶子宜相度病狀如	大便不利入大黃同煎却不入鹽如大便自利入訶子	煎 朱先生云此藥大治心氣脾疼用之見效僕嘗以此藥治浮腫立效陳宜人病血氣作楚痛不可忍	服諸藥無效召僕診之兩關脈沉弱為肝脈沉差緊此血氣漸成瘕癖也只以此二藥安愈 四明馬朝	奉後院亦病此用此二藥愈	羅安人每遇經脈行時則臍與小腹下痛不可忍服	藥無效僕以桂枝桃仁湯愈自後再發一投而差



桂枝桃仁湯 方見第一卷十二論	治經候來時先腹痛 男六德續添 局方七氣湯吞下來復丹	婦人疝瘕方論第八 凡四方	夫婦人疝瘕之病者由飲食不節寒溫不調氣血勞傷臟腑虛弱受於風冷冷入腹內與血相結所生疝者痛也瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃動也婦人之病有異於丈夫者或因產後血虛受寒或因經水往來取冷過度非獨因飲食失節多挾於血氣所成也診婦人	欽定四庫全書 婦人大全良方	疝瘕其脈弦急者生虛弱小者死又尺脈濇如浮牢為血實氣虛也其發腹痛逆氣上行此為婦人胞中絕傷有惡血久則結成瘕也	乾漆散 治婦人疝瘕久不消令人黃瘦疔羸兩脇妨	悶 心腹疼痛	乾漆 炒令烟盡 木香 芫花 炒醋 赤芍藥 桂心 當歸	川芎 琥珀 各半 大黃 炒二兩 牛膝 三 桃仁 一兩 麝香	分 一



右為細末無時溫酒調下一錢	礪砂元 治婦人疝瘕及積瘀血在臟時攻腹脇疼痛	川芒硝 礪砂 各一兩 當歸 雄黃 桂心 各半兩 大	黃 炮 三稜 各二兩	右為細末用米醋一椀熬大黃末為膏次入餘藥末	和元如梧桐子大空心溫酒吞十元漸漸加至二十	元以利下惡物為度	巴豆元 治婦人疝瘕及血氣疼痛	欽定四庫全書 婦人大全良方	巴豆 去皮心醋煮半日一分 礪砂 大黃 炒各一兩 五靈脂 桃	仁 各三分 木香 半兩	右為末煉蜜元如綠豆大淡醋湯空心下五元熱酒	亦可	良方黑神元	神麴 茴香 各四兩 木香 椒 炒香出汗 丁香 各半兩 檳榔	四 枚 漆 六兩半生半用重 湯煮半日令香	右除椒漆五物皆半生半炒為細末用前生熟漆和



元如彈子大茴香末十二兩鋪陰地蔭乾候外乾并
茴香收器中極乾去茴香腎餘育腸膀胱瘕癖及疝
墜五膈血崩產後諸血漏下赤白並一元分四服死
胎一元皆綿灰酒下難產炒葵子四十九枚擣碎酒
煎下一元諸疾不過三服瘕氣十服膈氣癥癖五服
血瘕三元當差子族子婦病腹中有大塊如杯每發
痛不可忍時子婦已貴京下善醫者
悉常服有藥莫愈陳應之曰此血瘕也
投黑神元三元杯氣盡消終身不復作

婦人八瘕方論第九

凡一方

欽定四庫全書

婦人大全良方

夫婦人八瘕者皆由胞胎生產月水往來血脈精氣不
調之所生也腎為陰主開閉左為胞門右為子戶主定
月水生子之道胞門主於子精精神氣所出入合於中
黃門玉門四邊主持關禁閉子精臍下三寸名曰關元
主藏魂魄婦人之胞三焦之府常所從止然婦人經脈
俞絡合調則月水以時來至故能生子而無病婦人榮
衛經絡斷絕不通邪氣便得往入合於其藏若生血未
盡而合陰陽即令婦人血脈攣急小腹重疼支滿胸脅



腰背相引四肢疼痛飲食不調結牢惡血月事不時或
 前或後因生聚如懷胎狀邪氣盛甚令人恍惚多夢寒
 熱四肢不舉陰中生氣腫肉生風甚者害於小便小腹
 築痛淋瀝面色黃黑則不復生子其八瘕者黃瘕青瘕
 燥瘕血瘕脂瘕狐瘕蛇瘕鱉瘕是也千金外臺言之詳
 矣

桃仁煎 治婦人血瘕血積經候不通 出本事方

桃仁 大黃 各一兩 燕蟲 半兩 炒黑川朴硝 一兩

欽定四庫全書

婦人大全良方

右四味為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一
 升五合下大黃桃仁燕蟲等不住手攪欲下手圓下
 朴硝更不住手攪良久出之圓如梧桐子大前一日不
 用喫晚食五更初用溫酒吞下五元日午取下如赤
 豆汁或如雞肝蝦蟇衣狀未下再作如鮮血來即止
 續以調血氣藥補之此方出千金 頃年在毗陵有一
 貴官妻患小便不
 通臍腹脹不可忍眾醫皆作淋治如八正散之類數
 種皆治不通痛愈甚予診之曰此血瘕也非瞑眩藥
 不可去予用此藥更初服至日午痛不可忍遂臥
 少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁一二升痛



止得愈此藥治病的切然猛烈太峻氣虛血弱者更宜斟酌與之

婦人腹中瘀血方論第十 凡二方

夫婦人腹中瘀血者由月經否澁不通或產後餘穢未盡因而乘風取涼為風冷所乘血得冷則成瘀血也血瘀在內則時時體熱面黃瘀久不消則變成積聚癥瘕也

桃仁散

蟲蟲 水蛭 烏賊骨 鯉魚鱗 灰 芫花 炒 枳殼

欽定四庫全書

婦人大全良方

當歸 炒 牛膝 赤芍藥 礪砂 桂心 各半 桃仁

分三

右為細末食前溫酒調下一錢

桃仁元 治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或來心腹滿急

桃仁 大黃 炒 各二兩 蟲蟲 炒 去翅足 水蛭 各四十枚 炒 焦

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五元熱酒吞下未知加至八圓



婦人癥瘕方論第十一 凡三方

夫婦人癥瘕者由冷熱不調飲食不節積在腹中或腸胃之間與臟氣結搏其牢彊推之不移者名曰癥言其病形徵可驗也氣壅塞為瘕言其氣瘕澁不宣暢也皆得冷則發動刺痛癥瘕之病其形冷結若冷氣入於子藏則使無子若冷氣入於胞絡搏於血血得冷則澁亦令月水不通也

川山甲散 治婦人癥瘕及惡血氣攻心腹疼痛面無

欽定四庫全書

婦人大全良方

顏色四肢瘦弱

川山甲灰炒 鱉甲醋炙 赤芍藥 大黃炒 乾漆炒令烟盡

桂心各一兩 川芎 芫花醋炒 當歸各半兩 麝香一分

右為細末入麝香令停每服一錢無時熱酒調下

蓬莪茂元 治婦人癥瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲

食

莪茂三分 當歸炒 桂心 赤芍藥 檳榔 枳殼

木香 昆布 琥珀各半兩 桃仁 鱉甲 大黃各一



兩	右為末煉蜜圓如梧桐子大食前粥飲下二十元	丁香元 治婦人癥痞結塊不散心腹疼痛	雄雀糞 炒 黃鱉甲 各一兩 礪砂 當歸 炒 芫花 醋炒乾	巴豆 一分去皮心油	右為末同研令停醋煮麴糊圓如小豆大當歸酒下	三元	婦人食癥方論第十二 凡二方	欽定四庫全書 婦人大全良方	夫婦人食癥者由臟腑虛弱月候來時食生冷之物脾	胃既虛不能消化與藏氣相搏結聚成塊日漸生長盤	牢不移故謂之食癥也	礪砂元 治婦人食癥久不消令人瘦弱食少	礪砂 青礪石 穿山甲 炙 三稜 炒 乾漆 炒令烟盡 硫	黃 各半 巴豆 三拾枚去皮心炒不出油	右為末用軟飯圓如小豆大每服五元生薑橘皮湯	下



礞石元 治婦人食癥塊久不消攻刺心腹疼痛	青礞石 末 巴豆 去皮 朱砂 粉霜 並 木香末 各一兩	礞砂 兩半	右研令停以糯米軟飲和圓如綠豆大每服二元空	心溫酒下取下惡物為度	婦人積年血癥塊方論第十三 凡七方	夫婦人積年血癥塊者由寒溫失節臟腑氣虛風冷在	內飲食不消與血氣相結漸生顆塊盤牢不移動者是	欽定四庫全書 婦人大全良方	也皆因血氣勞傷月水往來經絡否澁惡血不除結聚	所生也久而不差則心腹兩脇苦痛害於飲食肌膚羸	瘦	乾漆圓 治婦人積年血癥塊或攻心腹疼痛四肢不	和面少血色飲食全少	乾漆 炒令 大黃 炒各 琥珀 礞砂 研 硝石 研 莪茂	各三 紅花 延胡索 桂心 各半 膩粉 一 巴豆 七	粒去皮心研去油用 漿水二盞煎如錫



右為細末用棗肉和圓如梧桐子大每服五元於日未 出時煎蘇木湯吞下量患人輕重加減服之	治婦人積年血癥塊不消狀若鬼胎之候宜服琥珀元 琥珀 研 桂心 牛膝 芫花 製 檳榔 桃仁 炒各	生地黃 延胡索 當歸 各半 鱉甲 三稜 乾 漆 炒 礞砂 各一 大黃 二 蝨蟲 四十九枚 水蛭 四十九	右為末醋煮礞砂為膏入藥末和搗三二百杵圓如 梧桐子大每服十元空心溫酒下	欽定四庫全書 婦人大全良方	礞砂元 治婦人積年癥塊不消	礞砂 乾漆 雄黃 水銀 以少肥棗 雄雀糞 各 分 巴豆 十粒 去油	右研停用棗肉圓如綠豆大空心當歸酒下三元臨 卧再服取下惡物為度	沒藥元 理五積氣癖及驚悸血積癥癖血瘕發歇攻 刺疼痛嘔逆噎塞心中迷悶不醒人事及血鼓癥瘕脹	滿經脈不行者 靈苑方



芫花 去枝梗取二兩用好米醋三升煮至一升半 去滓不用只將醋入石器內入礪砂霜一兩	巴豆肉七粒爛研入醋 內煎成膏留元藥用	木香 沒藥 研當歸 桂 別研	心 華撥 兩 各一 檳榔 分一 肉豆蔻 炮一枚 斑猫 頭三枚去翅 糯米炒令焦 附子 一兩生 黃去米研細 用去皮	右一十二味除斑猫沒藥餘為細末與斑猫沒藥一	處合研令停入前膏子內和搗千百杵元如赤豆大	初服一元用醋炒蘿白子令焦黑以酒浸同煎一二	沸放溫吞下漸加至五圓七圓即止如急卒血氣攻	欽定四庫全書 婦人大全良方	心脾以酒醋共一銀錢煎沸吞下婦人血瘕癥癖結	塊攻心疼痛悶絕久醫不效者入禹餘糧一兩火煨	醋焙七次研細和藥為圓每服五圓用蘇木節二兩	細剉酒三升煎至七合去滓分為三服吞藥併進三	服當汗出則瘕隨大小腸逐下其病立差人弱者每	服只二圓如是丈夫元臟小腸氣脾積氣癥塊等疾	即入丹砂一兩細研和停以生薑鹽湯下三圓	五靈脂元 治婦人積年癥塊及惡血氣久不除



五靈脂 乾漆炒烟 川烏各一兩 麝香 硫黃 礞	砂並研各半兩 巴豆三十枚去皮醋煮赤 右為末研停醋煮麪糊圓如綠豆大每服五圓空心溫酒下	三稜煎 治婦人血癥血瘕食積痰滯出選奇後集 三稜 莪茂各二兩 青橘皮去白半兩 麥芽炒各一兩	右用好醋六升煮乾焙為末醋糊圓如梧桐子大每服三四十圓淡醋湯下痰積多薑湯下	欽定四庫全書 婦人大全良方	水府丹 治婦人久虛積冷經候不行癥瘕癖塊腹中卒暴疼痛而有黔黯黑羸瘠百病方	經煨花藥石研兩半 礞砂紙隔沸湯淋熬取霜半兩 桂心別為末 木	香 乾薑各一兩 縮砂仁二兩 紅豆半兩 斑貓百箇 臘月狗	膽七枚 生地黄汁 童子小便各一升 蜃青三百箇斑 物並去頭足翅以糯米一升同炒米黃去米不用	右九味為末同三汁熬為膏和上末圓如雞頭大朱砂為衣每服闕 圓溫酒嚼破食前服米飲亦可孕婦莫	砂為衣每服



服	婦人血氣心痛方論第十四 凡五方	夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪氣乘	於心也其痛發有死者有不死者成瘵者心為諸臟之	主而主於神其正經不可傷傷之而痛者名為真心痛	朝發夕死夕發旦死心之支別絡為風冷所乘而痛者	故痛發乍輕乍甚而成瘵者也	烏藥散 治婦人血氣攻心痛發歇不定	欽定四庫全書 婦人大全良方	烏藥 莪茂 桂心 當歸 炒 桃仁 青皮 木	香	右等分為末每服二錢熱酒調下	阿魏元 治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣	當歸 炒 桂心 青皮 附子 炮 阿魏 麪 麪 最 煨 其 白	木 川芎 各一 吳茱萸 泡 木香 乾薑 各三 檳榔	肉豆蔻 煨 延胡索 莪茂 各一 朱砂 細研	右為末先以醋一升煎阿魏成膏和藥末搗三百



杵圓如梧桐子大每服二十元食前熱酒下	雞舌香散 治男子婦人九種心痛一切冷氣	良薑 劉細麻油炒 桂心 赤芍藥 等分	右為細末每服二錢水一錢入鹽木瓜三片同煎七	分溫服鹽湯點亦可血氣疝瘕痛用熟醋湯調下忌生	冷	又一方名應痛散	治心脾痛不可忍者婦人脾血氣作心脾痛必効方同	欽定四庫全書 婦人大全良方	只無桂心用醋煎醋湯點亦可 乙丑年春初次女年十五經脈未行忽一	目心痛如刺吐飲不止脈沉緩弦細以蘇合香元沉香元神保元理中元訶子散七氣湯皆無効僕思之	此證非蟲即飲作梗非局方九痛元不可遂合就服一二元即愈	陳氏二神元 治婦人血氣不和作痛不止及下血無	時月水不調	真蒲黃 炒 華撥 鹽炒	右等分為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十元空	心溫酒吞下如不能飲米飲下兩服即止



陳日華抽刀散 治婦人血風血氣等疾武興戎司機	宜侯愷云見一道人用此方療病不一而足遂以為獻	真是奇妙	五靈脂 兩 炒一 莪茂 桂心 雲臺子 炒各半兩	右為末每服二大錢酒半盞水半盞煎至八分疾作	熱服	失笑散 見產後心痛門 訶子散 見霍亂門 亦妙	靈苑方 治婦人卒血氣心痛只用生五靈脂為細末	欽定四庫全書 婦人大全良方	每服一錢酒一盞煎沸熱服	婦人血氣心腹疼痛方論十五 凡二十方	夫婦人血氣心腹疼痛由臟腑虛弱風邪乘於其間與	真氣相擊而痛其痛隨氣上下或上衝於心或下攻於	腹故云血氣攻心腹疼痛也	延胡索散 治婦人血氣攻心腹疼痛	延胡索 當歸 川芎 桂心 各三分 木香 枳殼	赤芍藥 桃仁 各半兩 熟地黄 一兩



右咬咀每服三錢水一錢薑三片煎至七分去滓熱服	琥珀散 治婦人血氣攻心腹煩躁悶亂疼痛不止 琥珀 沒藥 當歸^炒 赤芍藥 牡丹皮 延胡	索 蒲黃 莪茂 桂心^{等分} 右為末每服一錢溫酒調下	沒藥散 治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒	枕塊痛^{出經驗方}	欽定四庫全書 婦人大全良方	血竭 沒藥^{並細研} 桂心 當歸 蒲黃 紅花	木香 延胡索 乾漆^炒 赤芍藥^{等分} 右為細末每服二錢熱酒調下食前服	治血塊衝心叫噉其痛至危者如喫不得可灌下	右用真大順散三錢熱酒調服立止	瑞金散 治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐疼痛及月信不通	片子薑黃^{四兩} 牡丹皮 莪茂 紅花 當歸 赤芍藥



川芎 桂心 延胡索 各兩半	右為末每服二錢水一盞酒三分煎七分溫服日三次	八仙散 治血氣心腹疔痛立驗	當歸 厚朴 芍藥 枳殼 製 人參 各四分 甘草	茯苓 各五分 肉豆蔻 二分	右為末水二升煎取八合空心分三服	八仙散 治婦人血氣心腹疔痛立驗 靈苑方	棕櫚 二兩 當歸 一兩並剉碎一錢 麝香 一錢 細研	欽定四庫全書 婦人大全良方	右同研令停每服一錢溫酒調下	不換金散 治婦人血刺痛不可忍者 靈苑方	三稜 莪茂 並細剉 巴豆 去殼各一兩	右三味以醎醋一椀熬醋成膏為度先將糠固濟一	罐子陰乾後將藥 醋膏一處置罐子中外用泥裹	以平瓦子一片蓋之用炭火五七斤煨常看守纔候	烟急出即取出看通黑則止不得燒過了便入乳鉢	內細研為末有患者炒生薑酒調一錢服



定命散 治婦人急血氣 靈苑方	大生烏頭 去皮 牡丹皮 桂心 各一兩	右為細末每服一錢酒半錢童子小便半錢煎至七分溫服如婦人血瘀血氣胎血積聚上衝心膈須臾	欲絕者用酒一錢生薑一片煎至七分去滓通口服	大效琥珀散 治婦人心膈迷悶腹臍撮疼痛氣急	氣悶月信不調等疾 靈苑方	烏藥 莪茂 各二兩 當歸 一兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右並生為細末溫酒調二錢服服後以食壓之忌生	冷油膩等物如是產後諸疾炒生薑酒調下	治血氣不調臍下痛	桑耳 菴蘭子 桂心 土瓜根 川芎 各四分 甘草 二分	牛膝 赤茯苓 各五分 大黃 白芍藥 各六分 乾地黄 八分	右為末煉蜜元如梧桐子大醋湯吞下二十元	蠲痛散 治婦人血氣刺痛	荔枝核 燒存性 香附子 去毛炒



右為細末鹽湯米飲調下二錢不拘時候服	沒藥散 治婦人血氣疼痛不可忍者 出博濟方	紅花 沒藥 當歸 延胡索 炒	右等分為末每服二錢童子小便酒各半錢同煎至	六分熱服只用秤錘淬過調亦可常服只用溫酒	牡丹散 治婦人久虛羸瘦血塊走疰心腹疼痛不思	飲食 出衛生方	牡丹皮 桂心 當歸 延胡索 各一兩 莪茂 牛	欽定四庫全書 婦人大全良方	膝 赤芍藥 各二兩 荆三稜 一兩半	右為粗末每服三錢水一錢酒半錢煎七分溫服	至聖湯 治婦人血氣產前產後百疾 出全前	當歸 芍藥 乾薑 莪茂 桂心 地黃 蒲	黃 炒各半兩 黑豆 炒去皮一兩	右為細末空心熱酒調下二錢	天仙散 方見二十卷第七論 葱白散 方見本卷第七論中 琥珀散 方見第十二卷	治婦人腹脇刺痛以局方七氣湯加延胡索少許同煎服若



胸膈不快惡心更間服局方烏沈湯兼治月水不調或前或後	葛蒲元 治婦人脾血積氣及心脾 男六德續添	葛蒲 九節者 六兩 吳茱萸 炮 香附子 炒去毛 各四兩	右三味並剉細以醎醋五升煮乾為度焙乾為細末	以好神麴打糊為元如梧桐子大空心食前以淡薑	湯吞下四五十元日三服橘皮湯亦好	延胡索散 治婦人血氣走作疼痛不可忍者及月水	不調面色痿黃喫食減少及產後諸疾並皆治之	欽定四庫全書 婦人大全良方	延胡索 生 三稜 生 當歸 去蘆 酒浸 莪朮 醋浸少時 各等分	右為末每服二錢空心溫酒調下血氣發甚者及月	水不調並皆童子小便酒紅花同煎調下	當歸煎元 治婦人久積血氣時發刺痛肌瘦乏力月候	不調	當歸 二兩 別末 檳榔 赤芍藥 牡丹皮 延胡索 各一兩	右除當歸末用米醋熬成膏入衆藥末和圓如梧桐



子大空心溫酒下二十元午食前再服	治婦人積年血氣攻刺心腹疼痛不可忍者及多方醫	療未差宜服神聖北亭元 靈苑方	北亭 去砂 沒藥 木香 當歸 各一 芫花 莪茂	各半 巴豆 去皮膜	右先研北亭沒藥巴豆如粉用好米醋三升同煮為	稀膏然後將餘四味為細末入於膏內搜合成塊用	新瓦合盛之臨時加減元數用酒醋各半燂煎數沸	欽定四庫全書 婦人大全良方	通口服不得嚼破仍須喫盡酒醋立差或男子元氣	亦依前方服食如急喉閉者男左女右以一元鼻中	嗅之立愈其中云臨時加減圓數皆不云大小數目	詳之古人亦鹵莽也既有北亭芫花巴豆合當圓如	綠豆大每服只五元	琥珀散 治產前產後血氣不和及一切疾	當歸 微 炒川芎 各一 赤芍藥 二 莪茂 一兩	右為末每服二錢空心溫酒調下如腰腹痛加陳皮



去白半兩乾薑炮半兩為末同和停如不喫酒以水一錢煎至七分溫服
婦人血氣小腹疼痛方論第十六 凡四方
夫婦人小腹疼痛者此由胞絡之間夙有風冷搏於血
氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛也
葳靈散 治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛
葳靈仙 一兩 當歸 沒藥 木香 桂心 各半兩
右為細末無時熱酒調下一錢服忌茶
欽定四庫全書 婦人大全良方
治婦人久積血氣疔刺小腹疼痛四肢無力不能飲食
宜當歸散
當歸 炒 赤芍藥 劉寄奴 沒藥 枳殼 延胡
索 等分
右為細末熱酒調下一錢無時候
追氣元 治婦人血刺小腹疼痛不可忍 靈苑方
芸臺子 微炒 桂心 各一兩 良薑 半兩
右為細末醋糊元如梧桐子大每服五圓無時淡醋



湯下常服補血虛破氣塊甚有效	石灰散 治婦人血氣痛不可忍者陳五婆方 出婦人經驗方	右取猪貼瘡血半錢於湯上煖用杖子攪停後用石	灰於火上燒令黃為末羅過入灰一錢同血攪停放	溫服立愈	婦人兩脇脹痛方論第十七 凡六方	夫婦人兩脇脹痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷之氣	客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏壅塞不宣邪正	欽定四庫全書 婦人大全良方	交爭衝擊故令兩脇脹痛也	草豆蔻散 治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛	草豆蔻 訶子肉 各一兩 桂心 苦梗 厚朴 各三分	甘草 一分 川芎 當歸 乾薑 檳榔 各半兩	右為粗末每服四錢水一錢煎七分去滓熱服食前	菴蘭子散治婦人臟腑虛冷宿冷氣攻兩脇脹痛坐卧不安	菴蘭子 延胡索 桃仁 桂心 琥珀 當歸	各一兩 赤芍藥 木香 沒藥 各半兩



弦緊而和，不似病脈，但診之時，兩手如火，以此知其		香櫛櫛大腹芍藥，薑桂之類，病益甚，召僕診之，六脈		家提幹上之五六百粒，是夜即愈。又已未，在金陵有		用氣針元五六，此大實也。經云：大滿大實者，可下之。		甚手不可向通，僕曰：實痛也。其腹必脹，但以人按之，痛		腑數日不通，僕曰：實痛也。其腹必脹，但以人按之，痛		脈不可準也，但以證辨，用藥觀其質，肥偉問其大		伏，乍來乍去，衆問僕診脈，古何如？荅曰：夫九痛之		有兩柴，十字插定，心脇叫聲，徹天召僕診之，六脈沉		薑桂等藥，而未敢投，痛甚，則築心築背，築定兩脇，似		六七十粒，大腑不通，其疾轉甚，亦有要用沉香、木香		忽然氣痛，投神保元，愈不一二日，再痛，再服神保元		右為末，煉蜜元如梧桐子大，溫水下三十元。鄧安人		木香 青皮 白 大黃 炮 檳榔 兩 各一 黑牽牛 二兩半 炒		欽定四庫全書 婦人大全良方		氣針元 治久積風壅，疎利滯氣，空胃鬲，止刺痛		湯下		右為末，米糊和圓如梧桐子大，每服三十圓，食後薑		木香 三錢		紫金皮 蒼朮 石菖蒲 兩 各一 香附子 二兩 人參 兩 半		不進飲食 饒武傳方		人參紫金元 治婦人榮衛不和，心腹刺痛，胃鬲脹滿		右為末，每服二錢，溫酒調下，無時候	



實痛也衆問如何治療僕曰大凡心腹刺痛不可便作虛冷治療有兩醫答曰非冷而何熱即生風冷生氣是也僕曰不然難經云虛則痺實則痛又仲景云腹痛者桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯家提幹云荆布素來質弱僕曰有可辨處過痛時使一婢按之若痛止是虛寒證也若按之轉甚手不可近此實痛也即令一婢按之手不可近叫喚異常僕曰此實熱無可疑者當用大柴胡湯治之衆皆不許僕責狀而投之八服愈	論脇肋疼痛服木通散 亦可治男子出明理方	心下脇肋少腹疼痛皆素有積寒而溫煖湯散亦可主	治甚者以溫藥下之心下與小腹痛諸書並有效方而	欽定四庫全書 婦人大全良方	脇肋下痛鮮獲治法此	木通散 治脇肋苦痛偏効併心下脇肋并小腹牽引	痛者皆主之	木通去皮 青皮去皮 白川楝子去皮核各一兩已上三味用巴豆半兩炒黃去	巴豆不用 蘿蔔子炒 舶上茴香炒一兩 莪茂 木香 滑	石各半兩	右為細末煎葱白酒調三錢一服愈甚者不過再服	三腕散 治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大便



祕澁兼治脚氣	大腹皮 紫蘇 沉香 乾木瓜 獨活 各半 白	術 川芎 木香 甘草 陳皮 檳榔 各三 分	右咬咀每服三錢水一錢煎至七分去滓空心熱服	日中服 戊午秋在京城有一婦人中 虛痞腹脇脹痛大便秘澁六脈虛弱更數醫服藥無効僕	投此藥不 終劑而愈	婦人心腹脹滿方論第十八 凡三方	夫婦人心腹脹滿者由臟腑久冷氣血虛損而邪氣客	欽定四庫全書 婦人大全良方	之乘於心脾故也足太陰脾之經也脾虛則脹足少陰	腎之經也其脈起於小指之下斜趣足心入跟中上股	內後廉貫腎絡膀胱從腎上貫肝膈入肺中其支者從	肺出絡於心臟虛邪氣客於三經與正氣相搏積聚在	內氣并於脾脾虛有脹故令心腹煩滿而脹也診其脈	遲而滑者脹滿也	白朮散 治婦人脾胃氣虛心腹脹滿不欲飲食四肢	少力



白朮 草薢仁 訶子肉 各三分 赤茯苓 檳榔	桂心 各半兩 陳皮 厚朴 人參 各一兩 甘草 一分	右為粗末每服四錢薑三片棗一枚煎至七分去滓	食前熱服	檳榔散 治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食	檳榔 前胡 川芎 青皮 三分 赤芍藥 桂心	大黃 苦梗 木香 枳殼 各半兩 甘草 一分	右為咀咀每服四錢薑三片煎至七分去滓溫服無	欽定四庫全書 婦人大全良方	時	局方分心氣飲亦妙 方見十卷 三腕散亦妙 方見本卷十七論	木香散 治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食	木香 桂心 白朮 乾薑 炮 陳皮 去白 草薢仁	訶梨勒 人參 各一兩 神麴 炒黃三分 甘草 炙半兩	右為細末每服一錢如茶點熱服	婦人大全良方卷七



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷八

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈履勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣周鈐



欽定四庫全書

婦人大全良方卷八

宋 陳自明 撰

婦人淋瀝小便不通方論第一

凡十一方

夫婦人淋者由腎虛而膀胱熱也膀胱與腎為表裏俱主於水行於脬者為小便也臟腑不調為邪所乘腎虛則小便數膀胱熱則小便澀其狀小便疼痛澀數淋瀝不宣故謂之淋也

小便不通脹滿氣喘急用藥無異

欽定四庫全書

婦人大全良方

木通散 治婦人五淋

木通 榆白皮 瞿麥穗 大麻仁 滑石

各一兩

貝齒 葵子 白茅根

各二兩

甘草

半兩

右為粗末每服五錢水煎空心溫服

石韋散 治婦人小便卒淋瀝

石韋 黃芩 木通 榆白皮 葵子 瞿麥穗

甘草

右等分為粗末每服半兩水盞半薑三片煎七分去



滓熱服	桃膠散 治婦人氣淋勞淋	桃膠 榆白皮各一兩 車前子 冬瓜子 鯉魚齒	葵子 瞿麥 木通各半兩 枳殼一分	右呔咀每服四錢重水一錢煎至七分去滓溫服	金沙散 治淋	海金沙草陰乾為末煎生甘草湯調二錢甚者不過	三四服	欽定四庫全書 婦人大全良方	又方	真琥珀研細不以多少研麝香白酒調下 此二方出陳總領方	雞蘇散 治婦人血淋	雞蘇葉 木通各二兩 生乾地黄 滑石各三兩 刺薊根一兩	右為粗末每服半兩水一錢半筴竹葉三七片煎至七	分去滓食前溫服	治婦人血淋及尿血澀痛	生乾地黄三兩 鬱金 蒲黃各二兩



右為細末每服二錢車前子葉煎湯調下日三服以利為度	亦有血瘕似淋小便不通臍腹脹滿痛宜桃仁煎	方見血瘕門第七卷第九論	後有用亂髮方治臍轉不得小便亦可治血淋尿血亦好	火府丹 治心經熱小便澁及治五淋加甘草咬咀煎名導赤散 本事方	生地黃二兩 木通 黃芩各一兩	右為細末煉蜜為圓如梧桐子大木通煎湯下三十	欽定四庫全書 婦人大全良方	圓此藥治淋瀝臍下滿痛許學士云壬戌年一卒病渴日飲水一斛不食者三月心中煩悶時已十月予謂心經有伏熱與此藥數服越二日不覺來謝當日三服渴止又三服飲食如故此本以治淋用以治渴可謂通變也	治婦人諸般淋	苦杖根俗呼為杜牛膝多取淨洗碎之以一合用水	五盞煎至一盞去滓用麝香乳香少許調下鄧綵武尉秋夢	得其內人患沙石淋者十三年每漩痛楚不可忍溺器中小便下砂石剝剝有聲百方不效偶得此方服之一夕而愈目所視也 本草云牛膝治莖中痛



婦人脬轉不得小便方論第二 凡十方									
夫婦人脬轉之病者由脬為熱所迫或忍小便俱令水									
氣迫於脬屈辟不得充張外水應入不得入內洩應出									
不得出內外壅滯脹滿不通故為脬轉其狀少腹急痛									
不得小便甚者至死不可治也									
局方有八味圓 治婦人脬轉不得小便									
滑石散 治婦人丈夫脬轉小便數日不通									
滑石 一兩 寒水石 二兩 葵子 一合									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
右為末以水一斗煮取五升時時服一升即利									
又方									
亂髮 燒灰 葵子 車前子									
右等分為細末每服二錢茶湯調下									
蒺藜散 治婦人脬轉小便不通亦可治男子									
裹茶蒺藜 燒灰一兩 滑石 研細半兩									
右研停沸湯調二錢服									
石葦湯 治脬轉小便不通 出指迷方前同									



石韋 去毛 車前子	右等分為粗末每服五錢水二錢煎至一錢去滓服	治婦人忍小便不得依時而起致令脬轉經四五日困	篤欲死方	滑石 二兩 亂髮灰 一兩	右研停取桃白皮一斤熟搗以水三錢絞取汁無時	溫半錢調二錢服	又方 以滑石末葱湯調下二錢服	欽定四庫全書 婦人大全良方	千金翼治婦人不得小便	杏仁 七粒去皮尖	右一味麩炒黃為細末水調服立通	又方	紫草為末井華水調取三指撮立通又云紫苑皆可用	若卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲死此由暴寒	乘并膀胱或從憂驚氣無所伸鬱閉而不流氣衝脬系	不正診其脉右手澁小左手急大宜葱白湯方



橘皮 三兩 葵子 一兩 葱白 一莖	右呔咀水五升煮取二升分三服 出指迷方	婦人小便數方論第三 凡二方	夫婦人小便數者由腎與膀胱俱主於水腎氣通於陰	此二經俱虛而有熱乘之則小便澁虛則小便數也	鹿茸散 治婦人久虛冷小便日夜三五十行	鹿茸 烏賊骨 桑寄生 龍骨 各一兩 白芍藥	當歸 附子 各三兩 桑螵蛸 半兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末食前溫酒調下二錢	桑螵蛸散 治婦人虛冷小便數	桑螵蛸 三十枚 鹿茸 牡蠣粉 甘草 二兩 黃耆 半兩	右為細末食前薑湯調一錢服	遺尿失禁方論第四 凡七方	經云膀胱不利為癰不約為遺尿者乃心腎之氣傳送失度之所為也故有小便澁而遺者有失禁出而不自知者又婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時又有



脬寒臟冷而遺尿不禁治之各有方	鹿茸圓 治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁	鹿茸 椒紅 桂心 附子 牡蠣 補骨脂	石斛 菴蓉 雞脰脰 沉香 各一兩 桑螵蛸 三分	右為細末酒煮麪糊圓梧桐子大空心溫酒下三十	圓	又方 以鹿角屑炒令黃為細末空心溫酒調二錢	又方 雞脰脰炙為末空心酒調二錢	欽定四庫全書 婦人大全良方	治婦人遺尿不知出時 出千金翼	白薇 白芍藥 等分	右為末酒服方寸匕日三服空心	又方 桑螵蛸酒炒為細末每服二錢生薑湯調下	又方	白礬 牡蠣 等分	右為細末飲服方寸匕亦能療丈夫遺尿	療婦人小便不禁 以雄雞翎燒灰為末酒服方寸匕



婦人小便出血方論第五

凡九方

夫婦人小便出血者由心主於血血之行身通遍經絡
 循環臟腑血牲得寒則凝澁得熱則流散失其常經溢
 滲入於腠肉故小便出血也

治婦人卒傷於熱尿血

陳總領云余頃在章貢時年二十
 十六忽小便後出鮮血數點不

勝驚駭全却不疼如是一月苦不飲酒則血少終不能
 止偶有鄉兵告以市醫張康者常療此疾遂呼之來供
 一器清汁云是草藥添少蜜解以水兩服而愈既厚酬
 之遂詢其藥名乃鏡面草一名螺曆草其色青翠所在
 石堦縫
 中有之

欽定四庫全書

婦人大全良方

鹿茸散 治婦人勞損虛羸尿血

鹿茸 當歸 熟地黄 葵子 蒲黃 續斷 等分

右為細末酒調二錢日三服

髮灰散 治小便尿血或先尿而後血或先血而後尿
 亦遠近之謂也又治飲食忍小便或走馬房勞皆致脬
 轉臍下急痛不通兼治肺疽心衄內崩吐血一兩口或
 舌上血出如針孔若鼻衄吹內立已

亂髮燒灰

本草云能療瘀血通關鬲利水道破癥
 瘕癰腫狐尿刺尸疰雜瘡療脬轉通大



小便止欬 嗽鼻衄	右一味用二錢以米醋二合湯少許調服并華水調	亦得服藥訖即炒黑豆葉蹲其上則通	生乾地黄散 治婦人尿血不止	生乾地黄 _{二兩} 栝葉 _{各半} 黃芩 _{各半} 阿膠 _{炒成珠一兩}	右為粗末每服三錢水一錢薑三片煎七分去滓溫	服	又方	欽定四庫全書 婦人大全良方	羚羊角屑 龍骨 當歸 蒲黃 _{各一兩} 生地黄 _{二兩}	右為細末粥飲調下二錢食前服	當歸散 治婦人小便出血或時尿血	當歸 羚羊角屑 赤芍藥 _{各半} 生地黄 _{一兩} 刺薊葉 _{三分}	右為粗末每服三錢水煎去滓服	又方 以生地黄搗取汁每服一小錢日三服	又方 以蒲黃末酒調二錢服之水調亦可	又方 鹿角膠三兩炙令黃以水一大錢煎至半錢去



澤分為三服食前服		婦人大便不通方論第六 凡八方		夫婦人大便不通者由五臟不調冷熱之氣結於腸胃		則津液燥竭大腸壅滯故大便不通也仲景云婦人經		水過多則亡津液亦大便難也		局方四物湯 加 青皮煎服		大三脘散 又名三和散見第七卷第十七論		七宣圓 麻仁 並見局方不復重錄		欽定四庫全書 婦人大全良方		牽牛子散 治婦人大便不通		木香 半兩 郁李仁 去皮微炒 青皮 去白 木通 枳殼 去白麩炒		桂心 各一兩 黑牽牛 三兩半炒		右為細末每服二錢如煎茶一沸攪起放溫空心服		通神散 治婦人大便不通 熱而實者方可投此藥其證心腹脹痛手不得近心		胃煩悶六脉沉滑而實是其證也		大黃 芒硝 檳榔 桃花 郁李仁 湯浸去皮微炒各一兩		木香 半兩	



右為細末空心粥飲調下二錢	牽牛圓 博濟方有大黃 檳榔名氣針員 治婦人大便不通心腹虛脹	黑牽牛 二 雨 青皮 去白 一 木香 半 兩	右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心溫水下二十圓	大麻仁圓 治婦人腸胃風結大便常秘	大麻仁 去殼秤別 研如膏 大黃 各二 兩 炒 檳榔 木香 枳殼 各一 兩	右為細末與麻仁研停煉蜜圓如梧桐子大空心溫	水下二十圓	欽定四庫全書 婦人大全良方	論老人虛人風人大便秘不可用駛藥	初虞世云余歷觀古人用通藥率用降氣等藥蓋肺氣	不下降則大腸不能傳送以杏仁枳殼訶子等藥是也	又老人虛人風人津液少大便秘經云澁者滑之故用	胡麻杏仁麻子仁阿膠之類是也今人學不師古妄意	斟酌每至大便秘燥即以駛藥蕩滌之既走津液氣血	大便隨手愈更秘澁兼生它病余昔在魯山日有一譚	少自稱太醫曹鎮有寄居王世安少府本京師人始病



風淫末疾為此生以駛藥累累利之後為肺痿咯膿血
卒至大便不通而死古人服藥尤所謹重不若今人之
輕生故舉此以戒後人

治風入腸間或祕或利方論第七 凡四方

經云春傷於風夏必飧泄蓋木氣刑土也土不能滲泄
則木氣勝故泄風氣行津液燥故祕即不可專以祕燥
為風也余家中宗親張公度母氏年七十日下利數十
行百方治之不愈又苦腰脚拘攣公度以蒺藜酸棗仁

欽定四庫全書

婦人大全良方

治拘攣而利愈黃魯直母安康郡太苦祕結以公度藥
投之而大便利故知祕與利皆出於風公度潞人名騃
世有令德公度承父醫學而克其家清修不妄取真有
德君子今見於此

治風人脚氣人大便或祕或利虛人尤宜方

皂莢子

三百枚破作兩片慢火炒燥甚即入酥一
棗大又炒至燥又入酥至焦黑為細末

右煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓煎蒺藜酸棗仁
湯下空腹服兩時久未利再進一服漸加至百圓不



妨以通為度	蒺藜湯方	蒺藜不以多少炒至赤黑色白內以木棒舂 去刺 揀簸	淨每蒺藜三兩以酸棗仁一兩炒令香同杵為麤末	馬尾羅篩每三錢水一錢煎至七分去滓溫服下前	圓子藥	大五柔圓主臟氣不調大便難通榮衛利九竅進飲食方	大黃 剉米下 枳殼 去穰 白芍藥 炒香 葶藶 別研	欽定四庫全書 婦人大全良方	牛脂 去筋膜熬成油 茯苓 酒浸軟溫水洗 桃仁 百枚	杏仁 四十枚並去皮	右除有油藥並為末煉蜜圓入牛脂桃杏仁葶藶杵	數千下圓如梧桐子大米飲下三圓日三服腹稍空	時服未知稍增以知為度	安康郡太苦風祕予為處只可二仁圓	杏仁 去皮尖 麻仁 別研 枳殼 去穰 訶子 慢火炒	右二物各一兩為細末同二仁杵煉蜜和杵圓如梧



桐子大溫水下二三十圓未知稍增潞公在北門日盛夏間苦大腹 不調公隨行醫官李琬本衢州市戶公不獨終始涵 容之又教以醫事公病泄利琬以言動搖之又求遠 效即以赤石脂龍骨乾薑等藥饋公公服之不大便 者累日其勢甚苦予方自共城來見公未坐定語及 此事公又不喜服大黃藥予告曰此燥糞在直腸藥 所不及請以蜜兌導之公為然時七月中暑熱予搗 汗為公作蜜兌是夕三用藥下結糞四五十枚大如 胡桃色黑如橡栗公二三日間飲食已如故世有一 種虛人不可服 利藥今載其法	蜜兌法	好蜜四五兩銀石器中微火熬不住手以匙攪候可	欽定四庫全書 婦人大全良方	圓見風硬即以蛤粉塗手捏作人指狀長三寸許坐	廁上內之以手掩定候大便通即放手未快再作已上	四方出初虞世	婦人泄瀉方論第八 凡八方	三因論曰夫婦人泄瀉者經中所謂洞泄飧泄澹泄濡	泄胃泄脾泄大腸泄大瘕泄小腸泄水穀注下其實一 也原疾之由皆因腸胃虛冷而邪氣乘之經云寒甚則 泄春傷於風夏必飧泄蓋風傷肝肝正旺而移氣剋於脾也



又云寒則澹熱則垢此得於外也喜怒憂思恐致使臟氣隔絕精神奪散必致澹泄此屬內也如飲食生冷食傷脾胃而泄者屬不內外也寒者溫之熱者涼之滑者澀之濕者燥之治利之法無以過也 香朴圓 治腸胃虛冷泄瀉注下無度脾虛氣閉不進飲食	大厚朴 五兩 北茴香 白朮 陳皮 各三兩 訶子	赤石脂 各一兩半	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末麵糊圓如梧桐子大空心米飲下五十圓如常服暖脾胃	桂香圓 治臟腑虛為風濕寒所搏冷滑注下不禁老人虛人危篤累效	附子 肉豆蔻 並炮 白茯苓 各一兩 桂心 木香 炮	白薑 炮各半兩 丁香 一分	右為細末米糊圓如梧桐子大空心米飲下五十圓	豆蔻分氣飲 治臟腑虛寒泄瀉無度瘦極及婦人產



後洞泄危篤甚	藿香葉 草豆蔻 仁 青橘皮 各四兩 甘草 丁香 各半兩	烏梅 五十箇 肉豆蔻 十箇	右呖咀每服四錢水二錢糯米一撮煎七分去滓溫服	五香散 治食魚傷泄瀉不止氣刺奔衝及婦人產前	產後腹痛血氣等疾用溫酒下產後敗血衝心用敗蒲	煎湯下安胎以糯米飲調下孕婦脾泄瀉痢煎陳米飲	調下食前	欽定四庫全書	婦人大全良方	烏藥 白芷 炒 枳殼 白朮 炒 良薑 炒 甘草	莢朮 有孕減半	右等分為細末每服二錢溫酒調下	豆蔻圓 治臟寒泄瀉不止服諸藥無效 亦可治男子	肉豆蔻 麪裹煨香 不以多少碾細入陳米白飯搗令得所	圓如綠豆大空心煮粟米飲吞下百圓本家累以此	藥救人有效	胃苓散 亦療男子 治夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止



五苓散 平胃散 並見局方	右合和薑棗煎空心服妙陳日華方	人參豆蔻散 治久瀉不止服諸藥無效僕累試之有效	人參 肉豆蔻 乾薑 厚朴 甘草 陳橘皮 各一兩	川芎 桂心 訶子 北茴香 各半兩	右為細末每服三錢水一小盞薑三片棗一枚煎至	六分服方出石道人	木香散 治臟腑冷極及久冷傷憊口瘡下泄米穀不	欽定四庫全書 婦人大全良方	化飲食無味肌肉瘦悴心多嗔恚婦人產後虛冷下泄	及一切水瀉冷痢	木香 破故紙 炒各一兩 良薑 縮砂仁 厚朴 製各三分	赤芍藥 橘紅 桂心 白朮 各半兩 胡椒 吳茱	萸 湯泡七次 肉豆蔻 四箇 檳榔 一箇	右為散每服三錢用不經水猪肝四兩許去筋膜批	為薄片重重摻藥置一鼎中入漿水一碗醋一茶脚	許蓋覆煑肝熟入鹽一錢葱白三莖細切生薑彈子



許拍破同煮水欲盡空心為一服冷食之初服微瀉	不妨亦是逐下冷氣少時自止經年冷痢滑瀉只是	一服渴即飲粥湯忌生冷油膩如不能食冷物即添	少漿暖服 嘉興謝醫得此方惡其繁只用漿水煮	猪肝圓如梧桐子大粥飲下五十圓其效亦若暴瀉	痢只是一服唯熱痢熱瀉不治	趙府博上與下轉婆州人也宜人病泄瀉	不止如附子木香訶子肉豆蔻龍骨等藥及諸丹服之皆無效召僕診之肝腎脉虛弱此肝腎虛也府博	云其說見在何經僕曰諸方論泄瀉止是言脾胃病不過謂風冷濕毒之所侵入及飲食傷滯遇腸虛則	欽定四庫全書 婦人大全良方	泄痢而不知肝腎氣虛亦能為洩痢古書所載甚明不可不辨經曰洩痢前後不止腎虛也又曰諸厥固	泄皆屬於下下謂下焦肝腎之氣也門戶束要肝之氣也守司於下腎之氣也肝氣厥而上行故下焦不	能禁固而泄痢腎為胃關門戶不要故倉廩不藏也若病泄痢其源或出于此而專以脾胃藥治之則謬	固千里矣遂服木香散數服而愈	協熱下利方論第九 凡三方	論曰若下利清水其色赤黃或米穀不化但欲飲冷時	時嘔逆小便不利得熱則極心胃煩躁脉虛大而數此	由乘虛熱入於胃湊滲下焦津液不分併於大腸謂之



協熱下利先用五苓散利小便次以玉粉丹四味阿膠圓	玉粉丹	蛤粉 硫黃 分等	右同研細白麵糊和圓如梧桐子大飲下五十圓	四味阿膠圓	黃蓮 赤茯苓 二兩 芍藥 三兩 阿膠 炒爆 一兩	右先將三味為末却以好醋熬阿膠成稀膏圓如梧	桐子大飲下三十員	欽定四庫全書 婦人大全良方	滯下方論第十 凡十三方	夫赤白痢疾者古人名之滯下是也究疾之原皆因外感五邪之氣內傷生硬冷熱之食其證不一有赤有白有赤白相雜有冷有熱有虛有實大抵四時皆以胃氣為本未有不因外感寒暑燥濕風之氣而傷於脾胃胃既虧而又內傷飲食飲食不能剋化致令積滯而成滯下古人云無積不成痢者此也經云春傷於風夏生飧泄蓋風喜傷肝然春時肝木正旺而不受邪反移氣



尅於脾土然脾既受尅又不能忌慎口腹恣食生冷粘
硬之物致令脾胃不能尅化因此積滯又夏秋之間或
再感暑濕風冷之氣發動而成痢也其證必先臍腹疔
痛洞泄水瀉裏急後重或有或無或赤或白或赤白相
雜日夜無度如有此證不問冷熱虛實但當先服神朮
散可以發散風冷寒濕之氣次服五苓散分利水穀兼
用加巴感應圓溫脾胃去積滯或六神圓未有不妥者
也或曰雖古人有言無積不成痢亦不專以去積為先

欽定四庫全書

婦人大全良方

豈有一歲之內獨於夏秋之間人皆有積而春冬無之
蓋風邪入胃木來勝土不為暴下則為痢疾其神朮散
要藥也又有一方一郡之內上下傳染疾狀相似或只
有一家長幼皆然或上下隣里間相傳染或有病同而
證異亦有證異而治同或用溫劑而安或用涼藥而愈
有如此等是毒疫痢也治疫毒痢者雖當察五運六氣
之相勝亦不可狎泥此說且如運氣相勝豈獨偏於一
方一郡而獨於一家二家者乎如有此證當先察其虛



實冷熱首以敗毒散多加人參甘草陳米薑棗煎服及
三黃熟艾湯黃連阿膠圓五苓散駐車圓可選而用之
如下痢赤多或純下鮮血裏急後重大便不通身體壯
熱手足心熱大煩躁渴腹脇脹痛小便赤澁六脉洪大
或緊而數或沉而實此熱痢也宜白頭翁湯及三黃熟
艾湯五苓散可選而用之若風痢下血太過宜用胃風
湯加木香黑豆煎服若夏秋之間下痢或赤或白或赤
白相雜臍腹痛裏急後重增寒發熱心胃煩悶燥渴
欽定四庫全書
婦人大全良方
引飲嘔逆惡心小便不利及五心煩熱六脉虛弱此等
脉證正因伏暑而得此疾宜服香薷散加黃連甘草當
歸酒水濃煎沉令冰冷頓服仍兼服酒蒸黃連圓或小
紫胡湯加人參煎服必愈
沈內翰云治痢之藥極多然無如此藥之妙蓋小柴胡湯
能治暑毒如雜證一退而痢尚未止則以四物湯加膠艾煎
服以調陰陽未有不安者也如水穀不分小便不利宜
用五苓散淡竹葉煎湯調服如煩渴甚者亦宜服之若
不明伏暑之證但以脉虛而妄投硫附薑桂丹石之藥



而殺之深可嘆息若下痢純白狀如魚腦臍腹冷痛日夜無度手足逆冷或有嘔逆全不入食飲食欲溫而惡冷六脉微細此由臟腑虛冷之極宜木香散加服四味理中湯及鍾乳建脾圓甚者四肢逆冷六脉沉絕當一味峻補兼灸氣海丹田二穴更以助胃之藥此守而不攻之意也宜四順附子湯三建丹白丹加味參附湯薑附湯皆可選用如年尊虛弱之人或素來稟受怯弱亦宜以此法詳酌調理然大宜開胃進食為先食可得入

欽定四庫全書

婦人大全良方

則脾胃運化糟粕便聚糟粕既聚垢膩鮮血瘀滯不患其不除矣如久痢不差腸滑不禁澹洩不止諸藥無效方可施之澁腸止痢之劑亦宜先以龍骨肉豆蔻訶子鍾乳胡粉之藥近人多用鶯粟殼地榆之屬然此物性太緊澁能損胃氣如少壯之人壯健者服之間奏奇功若是疫毒受暑受濕之證及年尊之人或稟受怯弱服此莫不受其大害若以固秘澁腸為先則風寒暑濕之邪非惟澁而不去而胃管閉而不通禁口不食日見羸



瘦糟粕不入腸中所患無由可除矣若有此證宜以參	苓白朮散四君子湯及以石蓮山藥之劑治之必愈治	利欲投補藥必須有溫通之意在焉如四君子湯理中	湯十全湯加木香白豆蔻茯苓官桂厚朴之屬可以散	風邪可以分水道可以開胃管可以治纏擾可以通秘	澁此攻守之意兩全也大抵治痢之法虛者補之實者	瀉之滑者澁之閉者通之有積者推之風則散之暑則	滌之濕則燥之熱則涼之冷則溫之冷熱者調之以平	欽定四庫全書 婦人大全良方	為期不可以過此為大法藥隱老人序	白頭翁方 治熱痢下血連月不差	白頭翁 _{二兩} 黃連 _{二兩} 黃蘗皮 _{各三兩} 秦皮 _{各三兩}	右咬咀每服四錢水一瓊半煎至七分去滓無時溫	服	神朮散 治春傷於風夏生飧泄大治傷風頭痛項背	拘急鼻流清涕	蒼朮 _{一斤} 藁本 _{一斤} 川芎 _{各六兩} 羌活 _{四兩} 粉草 _{二兩} 細辛 _{一兩}



右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎七分要出汗 加葱去滓稍熱服無時候	六神圓 治赤白痢 神麴 別為末 留作糊 麥芽 茯苓 枳殼 木香 煨 痢倍之 白	黃連 六味等分 赤痢倍之	右為末用神麴末作糊為圓如梧桐子大每服五十 圓赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢乾薑甘草	湯下 此藥得之山東饒殿講云是京城醫官見傳愚 詳此方有黃連可以解暑毒清臟腑厚腸胃有	欽定四庫全書 婦人大全良方	木香能溫脾胃逐邪氣止下痢有枳殼能寬腸胃有 茯苓能水道有神麴麥芽可以消滯真痢中之要藥也	三黃熟艾湯 治傷寒四五日大下熱痢時作白通湯 諸藥多不止宜服此湯除熱止痢亦有人作圓子熟水	吞下四十圓治時行毒痢良驗	黃芩 黃連 黃蘗 各二分 熟艾 半箇雞子大	右咬咀每服三錢重水一椀煎至七分去滓溫服無時	四順附子湯	生附子 去皮 白薑 炮 甘草 人參 各一兩



14



婦人大全良方

效有人夏月患痢一日六七十行用五苓散兩服止	酒蒸黃連圓 局方治狀不言治痢疾僕嘗用之良驗 薑附湯	小柴胡湯 參苓白朮散 香薷散	敗毒散 理中圓 四君子湯	黃連阿膠圓 鍾乳建脾圓 駐車圓	感應圓 亦有用蘇合香元和圓服名蘇感圓亦有外加黃蠟圓如梧桐子大十粒兼服	胃風湯 四物湯 玉華白丹	十全大補湯 斗門散 五苓散	欽定四庫全書 婦人大全良方	真人養臟湯 水煮木香圓 大已寒圓	已上諸方並出官局不復重錄	如斗門散 養臟湯 水煮木香圓 參香散 豆蔻餅	其中皆使嬰粟殼然此藥大能壞脾胃古方不用	如脾胃壯健之人服者多有良驗姑存於後	參香散 治男子婦人小兒陰陽不和冷熱相搏積而	成痢或赤或白或赤白相雜日夜無度裏急後重臍腹	疴痛甚不可忍又治水瀉不止腸鳴腹痛或熱毒中傷



或寒氣久積並宜治之	製 嬰粟殼 去 陳皮 白粉草 厚朴 青皮 白薑 各一	右為末每服二錢赤痢甘草湯調白痢陳米飲調赤	白相雜紫蘇湯調如冷瀉陳米飲調熱瀉新井水調	空心服此藥正脾去積和氣理中忌生冷肥膩油麵	醃藏	豆蔻餅 治赤白痢臍腹刺痛久而不愈大治冷痢	製一 嬰粟殼 兩 白芍藥 黃耆 三錢 陳皮 青皮 木香	欽定四庫全書 婦人大全良方	訶子 肉豆蔻 人參 各錢 羌活 當歸 各一	右為末蜜煉圓如彈子大每服二圓水一小錢煎至	七分溫服 二方余明仲先生方 曾有一婦人病痢疾月四十日服諸藥不愈召僕診之六脉	沉弱大凡下痢之脉宜沉宜弱但服十全大補湯薑	麥煎成加白蜜半匙再煎數沸服之愈 甲子夏秋	間僕處趙經畧廳有姪孫年九歲病痢甚重召小方	脉未至遂令僕診之六脉平細以證觀之云是血痢	其實非也只是血水而已僕云記得調中湯治狀云	治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱結於四肢則壯熱	頭痛寒傷於胃則下痢或血或水或赤壯熱	冥悶脉數宜服此遂合之去大黃服之而愈	調中湯方



葛根 黃芩 芍藥 桔梗 藁本 赤茯苓	白朮 甘草 炙等分	右咬咀每服三錢水一錢煎至七分去滓溫服移時	再服 又有一婦人泄瀉不止似痢非痢似血非血其色如濁酒召予診之則六脉沉絕衆醫用熱藥	及丹藥服之則發煩悶僕先用敗毒散數服加陳米煎次又用胃風湯加粟米煎愈調中湯去大黃亦療	此證	痢後嘔噦方論第十一 凡七方	凡滯下病之稍久或欲愈之時多有咳逆及嘔逆之證	欽定四庫全書 婦人大全良方	然欬逆者古人所謂噦是也噦者胃寒所生此證最危	其它病亦惡欬逆如見此證宜用橘皮乾薑湯半夏生	薑湯丁香柿蒂湯若陽證欬逆者小柴胡湯橘皮竹茹	湯 僕嘗治一痢疾欬逆不止六脉沉弱諸醫用藥灼	艾皆無效僕投退陰散兩服愈 又嘗治許主簿痢疾	愈後咳逆不止服諸藥無效遂灸期門穴不三壯而愈	其穴在第六卷十五論中如有咳逆之證雖經云無陰則嘔然多有	胃熱而嘔亦有胃寒而生亦有暑毒而生如胃熱而嘔



宜服小柴胡湯孫兆竹茹湯蘆根湯官局桔梗湯竹葉石	膏湯加生薑主之嘔而發渴者猪苓湯 僕嘗治一痢	後嘔不止六脉虛弱此胃寒而嘔又似暑毒凝於胃脘	投局方香薷圓愈	橘皮乾薑湯 治噦	橘皮 通草 乾薑 桂心 甘草 各四錢 人參 二錢	右咬咀每服四錢水一錢煎至七分去滓溫服	半夏生薑湯 治噦欲死	欽定四庫全書 婦人大全良方	半夏 一兩一分洗 生薑 二兩切	右以水二錢煎至八分去滓分為二服	丁香柿蒂湯 治欬逆	丁香 十粒 柿蒂 十五箇	右咬咀用水一錢半煎至八分去滓溫服	橘皮竹茹湯 治噦逆	橘皮 二兩 竹茹 二升 甘草 二兩 人參 兩半 半夏 一兩湯洗	右咬咀每服四錢水二錢生薑六片棗一枚煎至七



分去滓溫服	生薑橘皮湯 治乾嘔噦若手足厥冷者	橘皮 兩四 生薑 升半	右呖咀每服半兩水一錢煎至七分去滓溫服	退陰散 治陰毒傷寒手足逆冷脉沉細頭痛腰重連	進三服小小傷寒每服一字入正元散內同煎入鹽一	捻陰毒傷寒咳逆煎一服細細熱呖便止	乾薑 烏梅	欽定四庫全書 婦人大全良方	右等分為粗末炒令黃色候冷搗為末每服一錢水	一錢鹽一捻煎至半錢服	猪苓湯 治咳而嘔渴心煩不得眠	猪苓 赤茯苓 澤瀉 阿膠 炒 滑石 各半兩	右呖咀每服三錢水一錢煎候膠消盡服	孫兆竹茹湯 方見第 六卷 蘆根湯 方見第 六卷 小柴胡湯	官局桔梗湯 竹葉石膏湯 香薷圓 已上並出局 方不復重錄	婦人大便下血方論第十二 凡八方



夫婦人臟腑損傷風邪易入凡熱氣在內令人下血風	氣在內亦大便血色或如豆汁腹中疼痛若糞後下血	者其來遠糞前有血者其來近遠近者言病在上下也	婦人面無血色時寒時熱脉浮弱按之絕者為下血也	防風如神散 治婦人風虛大便後時時下血宜服	防風 枳殼 等分	右咬咀每服三錢水一錢煎至七分去滓空心服	治腸風下血	欽定四庫全書 婦人大全良方	赤芍藥 一兩瓦上燒存性	右為末溫酒調下二錢	又方	枳殼 十五合每合入巴豆三粒去殼皮安在內以綿裹之用好米醋於砂盆內煮候醋乾更加無灰酒煮令糜爛去巴豆研成膏以黃耆為末入膏內為圓如梧桐子	大每服二十圓空心米飲吞下酒亦可	治痢久不安下血成片	頭髮一團洗燒灰研每服一二錢新汲水調下瘡癰



之毒以溫酒服佳空心	木香烏荊圓 治腸風酒痢 已上四方出 專治婦人方	木香 分一 荊芥穗 川烏 炮各 一兩	右為末酒糊圓如梧桐子大每服二十圓食前臨卧	濃煎栗根白皮酒吞下忌羊血此同舍處傳之曾服	有效	又方	荊芥穗 黃耆 熟地黄 當歸 桑耳 地榆	欽定四庫全書 婦人大全良方	檉白皮 皂角利 乾薑 槐豆牛蒡子 甘草	右等分為細末每服二錢粥飲調下空心服	治腸風下血	蒼朮 不以多少以皂角濃按汁浸 一夕次日煮令水乾焙燥	右一味為細末麵糊圓如梧子大米飲空心下五十	圓日三	經云結陰者便血一升再結者二升三結三升宜用地	榆湯 駱龍吉方



地榆四兩 甘草一兩半 縮砂仁四七枚	右為粗末每服三錢水一錢煎至七分去滓空心溫服	腸風黑散 治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之內或食生冷或啖炙煖或飲酒過度積熱腸間致使脾虛弱糟粕不聚大便鮮血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒痢大便頻併並皆治之	敗棕燒 木饅頭燒 烏梅去核 粉草炙各等分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末每服二錢水一錢煎至七分空心溫服 僕嘗治一婦人便血不止用煮附圓加五靈脂效見方	第一卷	婦人痔瘻方論第十三 凡五方	夫婦人痔瘻者皆由酒色氣風食及勞傷經絡其血滲而成之亦有長年久坐而成者其痔有五種肛邊瘡如乳出於外時出膿血者為牡痔也肛邊腫生瘡而出血者為牝痔也肛邊生瘡痒而復痛者為脉痔也肛邊腫



核痛發寒熱而出血者為腸痔也因便轉而清血隨出者為血痔也治之各有方	鼈甲散 治婦人五種痔疾	鼈甲 露蜂房 蛇蛻 蝟皮 猪後懸蹄甲 燒存性 麝香 一分	右各研為末和藥令停每服一錢空心用生乾地黄煎湯調下若肛門有竅腫痛傳之即愈忌莧菜	局方釣腸圓 黑玉丹服之皆驗	欽定四庫全書 婦人大全良方	僕嘗治一婦人久病心焦多怒遂成痔疾狀如蓮子熱腫而痛遂用熊膽入梅花腦子並研更用猪膽汁調開塗痔立愈 方出張氏	又方療痔熱腫痛 鄒子華解元方	蛭蚰大者一條 江西名蛭蚰湖廣名石夾子廣州名鼻涕虫 研令爛入研	了龍腦一字坯子半錢研令停傳之愈先以石薜荔	煮水熏洗尤妙 五羊大帥趙尚書上汝下璧云母夫人病此只用蛭蚰與京墨研塗亦愈	婦人脫肛候方論第十四 凡五方



夫肛門者大腸候也大腸虛冷其氣下衝肛門反出亦	有因產用力努軀氣衝其肛亦令反出也	治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得 出聖惠方	蝸牛 一兩去殼生研 猪脂和傅之立縮 藥性論云蝸牛有毒能治大腸脫	肛 范旺方云此螺全似蝸牛色黃而小兩後好緣桑葉者佳孫真人同	姚和衆治男子女人小兒大腸虛冷肛門脫出	以鐵精粉傅之良 聖惠方亦治陰脫陰腫	集驗方療脫肛歷年不愈	欽定四庫全書 婦人大全良方	以生鐵三斤水一斗煮取五升去鐵以汁洗日再	姚和衆治大人小兒因痢脫肛	鼈頭骨燒灰研取粉撲之 日華子云鼈頭燒灰療脫肛圖經同藥性論鼈頭血塗脫肛	孫真人療脫肛	腸頭若挺出一片蝦蟇皮瓶中燒烟熏功效覺玄微	婦人陰腫方論第十五 凡六方	夫婦人陰腫者是虛損受風邪所為胞絡虛而有風邪	客之風氣乘於陰與血氣相搏令氣否澁腠理壅閉不



得泄越故令腫也	葛蒲散 治婦人月水澀滯陰間腫痛	葛蒲 當歸 各一兩 炒秦艽 三分 吳茱萸 半兩 製	右為粗末每服三錢水一棧葱白五寸煎至六分去	滓空心溫服	經心錄 治婦人陰中腫痛不可忍	艾葉 五兩 防風 三兩 大戟 二兩	右剉細以水一斗煮取五升熱洗日三切宜避風冷	欽定四庫全書	婦人大全良方	麻黃湯洗方古今錄驗治婦人陰腫或瘡爛者	麻黃 黃連 蛇床子 各二兩 北艾葉 一兩 烏梅 十箇	右剉細以水一斗煮取五升去滓熱洗避風冷	白礬散古今錄驗治婦人陰腫堅痛	白礬 半兩 甘草 半兩 生 大黃 一分 生	右為細末每用棗大綿裹內陰中日兩換	肘後方療陰中腫痛方	枳殼 半斤 炒令熱以故帛裹熨冷即換之



子母祕錄療陰腫

鐵精粉傳上

婦人陰痒方論第十六

與第二十三卷第十論通用凡十方

夫婦人陰痒者是蟲蝕所為三蟲在於腸胃之間因臟虛三蟲動作蝕於陰內其蟲作熱微則為痒重者乃痛也

大黃散 治婦人陰痒

大黃微炒 黃芩

黃耆

炙各一兩

赤芍藥

玄參

丹參

欽定四庫全書

婦人大全良方

山茱萸

蛇床子

各半兩

右為細末食前溫酒調二錢服

廣濟方療婦人陰痒不止

蚬蛇膽

雄黃

硫黃

朱砂

硝石

蕪荑

各半兩

藜蘆

二錢半

右為細末研停以臘月猪脂和如膏用故布作纏子如指長一寸半以藥塗上內陰中日一易之易時宜用猪椒根三五兩水煮稍熱洗乾拭內之效



又方 小蘇不拘多少水煮作湯熱洗日三用之	崔氏療陰痒不可忍方	杏仁燒作灰承熱綿裹內陰中日二易之	又方 蒜煮湯洗之 一方用枸杞根	又方	狼牙 二兩 細蛇床子 三兩	右以水三升煮十沸熱洗	又方 取雞肝承熱內陰中如有蟲蟲當盡下	欽定四庫全書 婦人大全良方	古今錄驗療婦人陰痒如有蟲狀	右取牛肝切取三寸內陰中其蟲盡入肝內出之效	猪肝亦可	礬石散千金翼治婦人陰痒脫	礬石為末空心酒服方寸匕日三服	婦人陰冷方論第十七 凡六方	婦人胞絡勞傷子臟虛損風冷客之冷乘於陰故令冷也	療婦人癖瘦陰冷五加皮浸酒方



五加皮 乾薑 丹參 蛇床子 熟地黃 杜仲 製各三兩	鍾乳粉 四兩 天門冬 一兩 地骨皮 二兩	右細剉以生絹袋盛用酒十五升漬二宿每服溫一	中殘空心晚食前各一服	治婦人陰冷痒方	遠志 二分 乾薑 生 蓮花 各三分 蛇床子 五味子 各四分	右為細末先以兔尿塗陰門中然後綿裹一錢內陰	中熱即為效	欽定四庫全書 婦人大全良方	傳心方治玉門寬冷方	硫黃末煎湯洗	近效坐導藥主陰冷子門痒閉方	吳茱萸 葶藶子 炒各二分 蛇床子 三分 沒石子 一枚	右為末以綿裹如棗子內子宮中	又方 五味子 四兩 為細末每用以口中玉泉和如兔屎	大內陰中熱即效	通真論療婦人子門冷坐藥法



蛇床子分四 吳茱萸分六 麝香許少	右為細末煉蜜圓如酸棗大以綿裹內陰中下惡物為度	婦人陰挺出下脫方論第十八 凡八方	夫婦人胞絡傷損子臟虛冷氣下衝則令陰挺出謂之	下脫亦有因產而用力軀氣而陰下脫者診其少陰脉	浮動浮為虛動為悸故令下脫也	當歸散千金翼療婦人陰挺下脫	欽定四庫全書 婦人大全良方	當歸炒 黃芩各二兩 牡蠣二兩半 蝟皮一兩 赤芍藥一兩半	右為細末每服二錢食前煖酒調下米飲亦可	又方	當歸三兩 敗醬二兩 獨活 白芷 地榆 白礬各半兩	右細剉水一斗煮取二升去滓稍熱洗	廣濟方治狀同前	皂角去皮弦子 半夏炒令 大黃 北細辛各一兩	蛇床子一兩半



右為細末薄絹袋盛如指長內陰中日二易之	又方	蛇床子 五兩 烏梅 十四枚	右剉以水五升煮取三升去滓熱洗日五次	又方	川烏 白及 等分	右為細末綿裹一錢內陰中令入三寸腹內熱即止	來辰再用一方有生椒一兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	千金翼療婦人陰脫兼療脫肛	羊脂煎訖適冷暖塗上以鐵精粉傅脂上多少令調	以火炙布令溫以熨上漸漸推內之更細末磁石酒	調服方寸匕日三服	婦人陰中生瘡方第十九 又見二十三卷 第十論凡五方	集驗療婦人陰中痛生瘡	羊脂 一斤 當歸 杏仁 白芷 芎藭 各一兩	右五味細切羊脂和置甑中蒸之藥成取如大豆一枚



綿裹藥內陰中日一度	肘後療女人陰中生瘡方	杏仁 燒末 雄黃 礬石 各二分 麝香 半分	右四味研細和傅陰中	又方 硫黃細研傅之	黃芩湯洗方古今錄驗療婦人陰中生瘡	雄黃 當歸 黃芩 芎藭 大黃 礬石 各二分	黃連 一分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右七味切以水五升煮取四升洗瘡日三度	又方雄黃散	雄黃 芎藭 辰砂 梨蘆 北細辛 當歸	川椒 等分	右為末綿裹內陰中又傅外瘡上忌如常法	女人傷丈夫頭痛方第二十 凡二方	集驗療女人傷丈夫四體沉重噓吸頭痛方	生地黃 八兩 芍藥 五兩 香豉 一升 葱白 一升 生薑 四兩 甘草 二兩



右六味切以水七升煮取二升半分三服不得重作 忌房事千金同	桑白皮湯千金翼療諸婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔悶 桑白皮兩半 乾薑二 桂心五 大棗二十	右四味切以酒一斗煮三四沸去滓分溫服衣適厚 薄毋令汗出千金同	女人交接輒血出痛方第二十一 凡二方	千金療女人交接輒血出方	欽定四庫全書 婦人大全良方	桂心 伏龍肝各二分	右為末酒服方寸匕差止	又方	黃連六分 牛膝 甘草各四分	右三味細切以水四升煮取二升洗之日三四度差 止	女人交接它物傷方第二十二 凡三方	集驗療女人交接陽道違理及它物所傷犯血出流漓



不止方 取釜底墨斷葫蘆塗藥內之	又療女童交接陽道違理血出不止方	燒髮并青布末為粉塗之	又方 割雞冠血塗之	小戶嫁痛方第二十三 凡四方	千金療小戶嫁痛連日方	甘草 _{分三} 白芍藥 _{分二} 生薑 _{分三} 桂心 _{分一}	右四味細切以酒二升煮取三沸去滓溫服神良	欽定四庫全書 婦人大全良方	又療小戶嫁痛單行方	牛膝 _{兩五}	右一味切以酒三升煮取二升分三服	又療婦人嫁痛單行太和湯方	大黃 _{兩三}	右一味切以酒一升煮一沸頓服	又療婦人小戶嫁痛海螵蛸散方	烏賊魚骨 _{枚二}



婦人大全良方卷八										欽定四庫全書		右一味燒研為細末酒服方寸匕日三服									
										婦人大全良方											



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷
十一

詳校官太醫院醫官 臣 姜晟

編修臣 倉聖脈覆勘

總校官原任中允 臣 王燕緒

校對官中書 臣 葉 蘭

謄錄監生 臣 周 鈐



欽定四庫全書

婦人大全良方卷九

宋 陳自明 撰

求嗣門

疾病既無須知
求嗣故以次之

陳無擇求子論第一

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不
孝有三無後為大者言嗣續之至重也凡欲求子當先
察夫婦有無勞傷痼害之屬依方調治使內外和平則
欽定四庫全書

婦人大全良方

婦人樂有子矣

褚尚書澄求男論第二

建平孝王妃姬寺皆麗無子擇良家未笄女入御又無
子問曰求男有道乎澄對曰合男女必當其年男雖十
六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必二十而
嫁皆欲陰陽完實然後交合則交而孕孕而育育而為
子堅壯強壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣早
洩未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育育而



子脆不壽此王之所以無子也然婦人有所產皆女者
有所產皆男者大王誠能訪求多男婦人媒至官府有
男之道也王曰善未再替生六男夫老陽遇少陰老陰
遇少陽亦有子之道也

婦人無子論第三

夫婦人無子者其事有三也一者墳墓不嗣二者夫婦
年命相尅三者夫病婦瘵皆令無子若是墳墓不嗣年
命相尅此二者非藥能益若夫病婦瘵須將藥餌故得

欽定四庫全書

婦人大全良方

有效也然婦人挾疾無子皆由勞傷血氣生病或月經
閉澁或崩漏帶下致陰陽之氣不和經血之行乖候故
無子也診其右手關後尺脉浮浮則為陽陽脉絕無子
也尺脉微澁中年得此為絕產也少陰脉如浮緊則絕
產惡寒脉尺寸俱虛弱者則絕產也 又有因將攝失
宜飲食不節乘風取冷或勞傷過度致令風冷之氣乘
其經血結於子臟子臟得冷故令無子也

千金翼求子方論第四

凡十四方



千金論曰夫婦人之別有方者以其血氣不調胎妊生
產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療
經言婦人者衆陰所集常與濕居十四歲以上陰氣浮
溢百想經心內傷五臟外損姿顏月水去留前後交互
瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論生熟二臟虛
實交錯惡肉內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或
胎瘡未愈而合陰陽或行步風來便利於懸厠之上風
從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時

欽定四庫全書

婦人大全良方

節氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也惟懷胎妊
孕而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸
卷中可得而知也然而女人嗜慾多於丈夫感病倍於
男子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚染着堅牢情不自抑所
以為病根深療之難差故養生之家特須教子女學此
三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何憂畏也夫四
德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務若不
通明於此則何以免其橫夭者哉故傳母之徒亦不可



不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不意也 又曰人之情性皆願賢已而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日昏爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉 又論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中生者則求子必得若其本命五行相尅及與刑煞衝破并在子休廢死墓中生者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣

禁忌法

凡欲要兒子生吉良日交會之日常避丙丁及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月

欽定四庫全書

婦人大全良方



無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父 母生子或瘖啞聾聵頑愚癲狂攣跛盲眇多病短壽不 孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中井竈 園厠之側塚墓屍柩之旁皆悉不可夫交會如法則有 福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和 合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人 來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃 咎屢至雖生成長家道滅亡夫禍福之驗如有影響此乃									
欽定四庫全書									
婦人大全良方									
必然之理何不再思之									
男子受胎時日法									
凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日為男仍遇 月宿在貴宿日又以夜半後生氣時寫精者有子皆男 必壽而賢明高爵也若以經絕後二日四日六日寫精 者皆女過六日皆不成子又遇旺相日尤吉									
推旺相日法									
春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸									



推貴宿日法



七子散 主丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方	牡荊子 五味子 兔絲子 車前子 薺藎子	山藥 石斛 熟地黄 杜仲 鹿茸 遠志 各八分	附子 蛇床子 川芎 各六分 山茱萸 天雄 各五分	桂心 十分 白茯苓 川牛膝 人參黃耆 各五分 巴戟 十二分	茯苓 七分 鍾乳粉 八分	右為細末酒服方寸匕日二服不知加至二匕以知	為度忌生冷醋滑猪雞魚蒜油膩不能飲者蜜元服	欽定四庫全書 婦人大全良方	亦佳一方加覆盆子二兩行房法一依素女經女人	月信斷一日為男二日為女三日為男四日為女以	外無子每日午時夜半後行事生子吉餘時生子凶	慶雲散 主丈夫陽氣不足不能施化施化無成	覆盆子 五味子 各二升 兔絲子 一升 白朮 炒 石斛 各三兩	麥門冬 天雄 各九兩 紫石英 二兩 桑寄生 四兩	右為細末食後酒服方寸匕日三服素不能飲者米	飲調下冷者去桑寄生加細辛四兩陽事少而無子



者去石斛加檳榔十五箇良		三十一年者		朴硝 牡丹皮 當歸 大黃 蒸一飯久 桃仁 各三兩		細辛 厚朴 苦梗 赤芍藥 人參 茯苓		桂心 甘草 川牛膝 陳皮 各二兩 附子 炮一兩半		蜜虫 炒焦去翅足 水蛭 炒各六枚		右咬咀每服四大錢酒水合瓊半煎至六分去滓溫		欽定四庫全書 婦人大全良方		服空心日三服夜一服少汗 關 積血及冷赤膿如小		豆汁斟酌不盡若力弱大段不堪者只一二服止然		惡物不盡不得藥力能服盡儘好不爾著坐導藥		坐導藥 治婦人全不產及斷緒服前盪胞湯惡物不		盪用此方		皂角 去皮子一兩 吳茱萸 當歸 大黃 蒸 晉礬 枯		戎鹽 川椒 各二兩 五味子 細辛 乾薑 各三兩		一方無茱萸有葶藶 各三分	



欽定四庫全書		婦人大全良方		紫石英元		紫石英		桂心		禹餘糧		薯蓣		續斷		右為細末煉蜜元如梧桐子大每服三十元溫酒吞		下漸加至五十元慎如藥法經心錄同	
又名紫石		門冬元		方見		天門冬		川芎		酒醋		桑寄生		食茱萸		細辛			
各三		紫葳		各二		烏頭		卷栢		石斛		人參		細辛		各五			
各二		牡蒙		一兩		熟地黃		烏賊骨		烏賊骨		牡丹皮		栢子仁		一兩			
乾		粉草		辛夷仁		川牛膝		乾薑		厚朴									
各三		紫葳		各二		烏頭		卷栢		石斛		人參		細辛		各五			
各二		牡蒙		一兩		熟地黃		烏賊骨		烏賊骨		牡丹皮		栢子仁		一兩			
乾		粉草		辛夷仁		川牛膝		乾薑		厚朴									
各三		紫葳		各二		烏頭		卷栢		石斛		人參		細辛		各五			
各二		牡蒙		一兩		熟地黃		烏賊骨		烏賊骨		牡丹皮		栢子仁		一兩			
乾		粉草		辛夷仁		川牛膝		乾薑		厚朴									
各三		紫葳		各二		烏頭		卷栢		石斛		人參		細辛		各五			
各二		牡蒙		一兩		熟地黃		烏賊骨		烏賊骨		牡丹皮		栢子仁		一兩			
乾		粉草		辛夷仁		川牛膝		乾薑		厚朴									
各三		紫葳		各二		烏頭		卷栢		石斛		人參		細辛		各五			
各二		牡蒙		一兩		熟地黃		烏賊骨		烏賊骨		牡丹皮		栢子仁		一兩			
乾		粉草		辛夷仁		川牛膝		乾薑		厚朴									
各三		紫葳		各二		烏頭		卷栢		石斛		人參		細辛		各五			
各二		牡蒙		一兩		熟地黃		烏賊骨		烏賊骨		牡丹皮		栢子仁		一兩			
乾		粉草		辛夷仁		川牛膝		乾薑		厚朴									
各三		紫葳		各二		烏頭		卷栢		石斛		人參		細辛		各五			
各二		牡蒙		一兩		熟地黃		烏賊骨		烏賊骨		牡丹皮		栢子仁		一兩			
乾		粉草		辛夷仁		川牛膝		乾薑		厚朴									
各三		紫葳		各二		烏頭		卷栢		石斛		人參		細辛		各五			
各二		牡蒙		一兩		熟地黃		烏賊骨		烏賊骨		牡丹皮		栢子仁		一兩			
乾		粉草		辛夷仁		川牛膝		乾薑		厚朴									



延年方療婦人子臟偏僻冷結無子坐導藥	蛇床子 芫花 等分	右二味為末取棗大紗囊盛如小指長內陰中工作須去任意卧着避風冷	內灸元廣濟療無子令子宮暖	麝香 二分 皂莢 去皮子炙十分 川椒 六分炒出汗	右為末煉蜜為元如酸棗大綿裹內產宮中留少綿線出覺生寒不淨下多即抽綿線出却凡藥一日一度換之無問晝夜皆內無所忌	欽定四庫全書	婦人大全良方	秦桂元 治婦人無子知金州范羅言乞以此方試令婦人服之至四十九日如無子請斬臣一家以令天下何德揚方雖其言似誇然實有異驗	秦艽 桂心 杜仲 防風 厚朴 各三分 附子 生	白茯苓 各一兩半 白薇 乾薑沙參牛膝 半夏 各半兩	人參 一兩 細辛 二分	右十四味並生碾為細末煉蜜為元如赤豆大每服



白薇元 濟出廣 療久無子		白薇 牡蒙 藁本 各五 薑黃 當歸 熟地黄 各七		外臺 秘要		五十元日三服喫後用粥飯壓之屢試甚驗 已上五方並出		右為細末酒煮麪糊元如梧桐子大食前溫酒吞下		堅白茯苓 人參 牡蠣 酸棗仁 各一兩 鍾乳粉 四兩		白芍藥 川芎 桑寄生 卷栢 艾葉 川薑		熟地黄 紫石英 桑螵蛸 各二兩 五味子 真琥珀		欽定四庫全書 婦人大全良方		鹿茸 當歸 肉蓯蓉 禹餘糧 兔絲子 覆盆子		養真元 治婦人血虛氣憊陰陽不升降久不成妊娠者		也		四十無子服此遂有孕其效如神不可具述此仙方		六年服此藥便有孕又殘藥與太子中守文季妻年		日便有孕殘藥與石門縣令妻年三十四斷產已十		覺有孕便不可服臣妻年二十七無子服此藥十二		三十元空心食前醋湯米飲任下未效更加元數已	



川芎 人參 栝子仁 石斛 桂心 附子 炮	五味子 防風 甘草 川牛膝 吳茱萸	桑寄生 各六分 秦椒 二分 禹餘糧 八分	右為末煉蜜元如梧桐子大空心酒下三十元日二	服忌生菜葱熱麪蕎麥蒜猪肉炙燂葵菜蕪荑菰菜	海藻粘食臭物等	地黃湯 療久無子斷緒小腹冷痛氣不調	熟地黃 乾 川牛膝 當歸 各八分 卷栝 川芎 防風 各六分	欽定四庫全書 婦人大全良方	牽牛子 末 桂心 各三分	右呶咀以水六升煮取二升三合去滓分三服服別	和一分牽牛子末服如人行四五里更進一服以快	利止忌同前	千金療月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日	有子金城太守白薇元	白薇 細辛 各五分 人參 杜衡 厚朴 牡蒙	半夏 殭蚕 秦艽 當歸 紫苑 各三分 川牛膝



沙參 乾薑 分各二 川椒 附子 防風 分各六	右為末煉蜜元如梧桐子大先食服三圓不知稍加	至四五圓此藥不長將服覺有身則止用大驗忌錫	猪羊肉冷水生葱菜 古今錄驗不用杜衡用牡蠣三分熟延年方同前崔氏有桔梗	桂丹參 各三分	千金翼白薇圓主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療	白薇 車前子 分各三 當歸 川芎 蛇床子 分各四	太一餘糧 分六 紫石英 菴閭子 石膏 藁本	欽定四庫全書 婦人大全良方	卷栢 分各五 澤蘭葉 覆盆子 桃仁 熬 麥門冬	白芷 人參 分各六 桂心 蒲黃 分各十 乾薑 椒 炒出汗	細辛 乾地黄 分各十 白茯苓 赤石脂 遠志	白龍骨 分各八 橘皮 分二	右為末煉蜜圓如梧桐子大酒服十五圓日再增至	四五十圓以知為度忌驢馬猪雞魚蒜及前所忌覺	有身即止藥宜秘之勿妄傳也	經心錄茱萸圓療婦人陰寒十年無子者



吳茱萸 川椒 各一升	右為末煉蜜圓如彈子大綿裹內陰中日再易無所 下但開子臟令陰溫即有子也	紫石英元	紫石英 阿膠 當歸 川芎 赤芍藥 川續斷 各一分	鹿茸 白朮 桂心 各半兩 栝子仁 二兩 熟地黃 三兩	右為末煉蜜為圓如梧桐子大空心溫酒下二十圓	兼治虛中有熱頭目旋暈足如履空嘔吐不食月水	欽定四庫全書 婦人大全良方	不調或多或少皆虛候也久服能生髮令人有子更	治虛悸常若憂思皆心血不足血室虛所致也	溫隱居求嗣保生篇方論第五 凡一方	昔東京有一焦公因三世無嫡嗣遂為商旅遊翫名山	尋訪至人問其因果遂至京都見一老僧聲清而遠目	視精光請教談論語言甚異故就齋而坐僧曰有何所	諭焦曰貧家三世無嫡嗣奈何僧曰無嗣者有三一祖	宗無德自身無行二夫妻年命恐犯禁忌三精神不守



妻妾血寒焦公曰自身無行夫妻年命皆可受持若妻妾
血寒有何法術再拜告曰願聞一言僧曰不難先修德後
修身三年之內可到五臺山當授異方說畢忽不見焦公
自遇老僧之後時時行方便種種作陰功遇人臨難者効
觀音之救苦見物垂死者助上帝之好生行恩布德如此
三年竟往五臺山尋訪老僧數日不見方回歸忽見行童
手持一書言曰老師傳語大夫功成行滿回宅合藥志誠
服之富貴子孫隨念降生焦公曰但得嫡子足矣何望貴
欽定四庫全書
婦人大全良方
子乎於是遂生焦員外後員外養子不肖嘆曰有何損德
如是忽遇一道人云汝有憂色何不往五臺山見老僧焦
氏頓省遂往五臺山決其因果至五臺山不見老僧只見
行童曰老師昨日言員外今日到山令行童相接再三傳
語何必來問但依父行愚者自賢爾後必生賢德子孫
焦氏曰豈愚子反賢乎行童曰昔竇氏五子皆不全形
後行恩布德悉皆如故積德報應皆登科第焦氏拜謝
而歸奉行雕板印施方書不及二十年富貴子孫數人



長子橫金出入金門後人收得行狀及方受持行用求	藥者獲其子孫皆有德行余躬受此方不敢緘默併錄	篇論以告諸賢庶不致堙沒耳方具于后	續嗣降生丹 治婦人稟受氣弱胎臟虛損子宮冷憊	血寒痼冷難成子息功效如神	當歸 桂心 龍齒 烏藥 眞天台 益智 杜仲	石菖蒲 吳茱萸 各一兩半 茯神 川牛膝 秦艽	細辛 苦桔梗 半夏 防風 白芍藥 各三分	欽定四庫全書 婦人大全良方	乾薑 一兩半 附子 一隻重八錢者臍心作一竅如皂	川椒 二兩湯浸 牡蠣 一大片要取漳泉二州者却用	日一換取出用硫黃末一兩米醋塗遍却用皮紙裹	又用米醋浸令紙濕鹽泥厚固濟乾用炭五斤煅每	遇合藥入二兩餘	者留後次合藥用	右為細末取附子內朱砂別研為細末糯米糊為元	如梧桐子大每服三十元至百元空心淡醋溫酒鹽	湯皆可下一日二服	此藥及療男子精寒不固陽事衰弱白濁夢泄及治



婦人大全良方卷九										欽定四庫全書		婦人大全良方		藥無不感應		婦人血虛帶下肌瘦寒熱但是男女諸虛百損客熱盜汗氣短乏力面無顏色飲食少味並皆治之更有奇效難以具述受持君子宜預行善及方便却服此



欽定四庫全書

婦人大全良方卷十

宋 陳自明 撰

胎教門

求嗣已明須知
胎教故以次之

妊娠總論第一

凡婦人妊娠十月其說見於古書有不同者多矣按巢
氏病源論婦人妊娠一月名始胚足厥陰脉養之二月
名始膏足少陽脉養之三月名始胎當此之時血不流

欽定四庫全書

婦人大全良方

行形象始化未有定儀見物而變欲子端正莊嚴當令
母見貴不可見狀貌醜惡人也欲生男宜操弓矢乘牡
馬欲生女宜著珥璫施環珮欲子美好玩白璧觀孔雀欲
子賢能宜讀詩書務和雅手心脉養之四月始受水精
以成血脉手少陽脉養之五月始受火精以成其氣足
太陰脉養之六月始受金精以成其筋足陽明脉養之
七月始受木精以成其骨手太陰脉養之八月始受土
精以成膚革手陽明脉養之九月始受石精以成毛髮



足少陰脉養之十月五臟六腑關節人神皆備此其大略也又五臟論有稱耆婆者論一月如珠露二月如桃花三月男女分四月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月受氣足更有稱張仲景者亦然又顱顱經云一月為胎胞精血凝也二月為胎形成胚也三月陽神為三魂四月陰靈為七魄五月五行分五臟也六月六律定六腑也七月精關竅通光明也八月元神具降真靈也九月宮室羅布以定生人也十月受氣足萬象成也今推究數說之理如五臟論者類皆淺鄙不經往往妄託其名至於三藏佛書且語涉怪誕漫不可考今按顱顱經三卷云中古巫方所撰隋人巢氏方亦嘗序之今巢氏論婦人妊娠乃不見言之聖濟經原化篇亦獨取顱顱經更不言巢氏論者何哉嬰童寶鑑集云小兒方論起自巫方黃帝云吾不能察幼小賴國有巫方能知小兒之壽夭耳及觀巢氏論小兒候亦云中古

欽定四庫全書

婦人大全良方



有巫方立小兒顱顱經以占壽夭世所相傳者有少小
方焉是巢氏論小兒則取於顱顱經則是未盡其理故
不言之若聖濟經者但取其文句不若巢氏之論其間
有胎教之法為可取所以巢氏論妊娠至三月始胎之
時欲令見貴人莊嚴若操弓矢施環珮觀孔雀讀詩書
之類豈非胎教之理乎嘗試推巢氏所論妊娠脉養之
理若足厥陰肝脉也足少陽膽脉也為一臟腑之經餘
皆如此且四時之令必始於春木故十二經之養始於

欽定四庫全書

婦人大全良方

肝也所以一月二月手心主心胞絡脉也手少陽三焦
脉也屬火而夏旺所以胎養在三月四月也屬手少陰
心手太陽小腸者以君主之官無為而尊也足太陰脾
脉也足陽明胃脉也屬土而旺長夏所以養胎而五月
六月手太陰肺脉也手陽明大腸脉也屬金而旺秋所
以養胎在七月八月足少陰腎脉也屬水而旺冬所以
養胎在九月又况母之腎臟繫於胎是母之真氣子之
所賴也至十月兒於母腹之中受足諸臟氣脉所養然



後待時而生此論奧微而有至理餘書所論皆不能及也觀此則知巢氏所論世更有明之者亦未有過於巢氏之論矣余因述其說

娠子論第二

夫至精纔化一氣方凝始受胞胎漸成形質子在腹中隨母聽聞自妊娠之後則須行坐端嚴性情和悅常處靜室多聽美言令人講讀詩書陳禮說樂耳不聞非言目不觀惡事如此則生男女福壽敦厚忠孝賢明不然

欽定四庫全書

婦人大全良方

則男女既生則多鄙賤不壽而愚此所謂因外象而內感也昔太任娠文王目不視惡色耳不聽惡聲口不談惡言世傳胎教之道是謂此也前論亦畧叙之矣然則婦人有終身無子者何也按巢氏病源云婦人無子者蓋有三焉一者墳墓不嗣二者夫婦年命相尅三者夫疹婦病皆令無子若夫疹婦病可以服藥而後能有子餘皆不可致也今觀是說亦未盡善有人以婦人無子問西京常器之者乃曰女人自少多病服燥藥無節使



天癸耗動且早故終身無子又有問襄陽宋大亨者亦然然則婦人妊娠有兩胎者何也按古今方書並無論及此者惟巢氏論云陽施陰化精氣有餘故生二胎且謂成一胎之理其精有幾耶今觀婦人有兩胎者其精神氣宇畧無小異至於數有兩胎或間成兩胎者有俱男俱女者有一男一女者道藏經云有求子法云婦人月信初止後一日三日五日值男女旺相日陽日陽時交合有子多男若男女稟受皆壯則多子一有怯弱則

欽定四庫全書

婦人大全良方

少子以此推之理可槩見焉又婦人妊娠男女之別何也按顱顱經云陽盛發陰當孕成男六脉諸經皆舉其陽陰盛發陽當孕成女六脉諸經皆舉其陰巢氏病源云三陽所會則生男三陰所會則生女葛洪肘后方云男從父氣女從母氣聖濟經云天之德地之氣陰陽之至和相為流薄於一體因氣而左動則屬陽陽資之則成男因氣而右動則屬陰陰資而成女易稱乾道成男坤道成女此男女之別也凡妊娠有疾投以湯藥有傷



胎破血者之忌何也內經云婦人重身毒之柰何岐伯
答曰有故無殞衰其大半而已也蓋妊婦有疾不可不
投藥也必在醫者審度疾勢輕重量度藥性高下處以
中庸不必多品視其疾勢已衰藥宜便止則病去母安
子亦無損復何懼於攻治哉

受形篇第三

男女之合二精交暢陰血先至陽精後衝血開裹精精
入為骨而男形成矣陽精先入陰血後參精開裹血血

欽定四庫全書

婦人大全良方

入居本而女形成矣陽氣聚面故男子面重溺死者必
伏陰氣聚背故女子背重溺死者必仰走獸溺死仰伏
皆然陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之
兆父少母老產女必羸母壯父衰生男必弱古之良工
首察乎此氣受偏瘁與之補之補羸女則養血壯脾補
弱男則壯脾節色羸女宜及時而嫁弱男宜待壯而婚
此疾外所務之本不可不察也

論胎教第四

馬益卿先生



論曰胎教產圖之書不可謂之迂而不加信然亦不可									
狎泥之方今俚俗之家與不正之屬將息避忌略不如儀									
或藥毒不脩或產於風露既無產厄子母均安固有之如不									
利嗣續或驕倨太甚却動必成咎雖隣家有所興修亦且									
犯其胎氣令兒破形殞命如刀犯者形必傷泥犯者竅必									
闕									
欽定四庫全書									
婦人大全良方									



欽定四庫全書											
婦人大全良方											
氣薄而生者也。唯能順時數，謹人事，勿動而傷，則生育之道得矣。自一月積之，至於十月，所謂時數也。保衛輔翼有其道，防閑忌慎適其宜，所謂人事也。觀四序之運，生長收藏，貸出萬物，有儀則咸備，而天地之氣未											



始或虧者蓋陰陽相養以相濟也

陰陽離合論曰天覆地

陰為之主故生因春長因夏收因秋藏因冬失常則天地四塞莊子天地篇曰留動而生物物生成理謂之形

形體保神各有儀則謂之性

昧者曾不知此乃欲拂自然之理謬為

求息之術方且推生死於五行薪補養於藥石以偽勝

真以人助天雖或有子孕而不育育而不壽者衆矣昔

人論年老有子者男不過盡八八女不過盡七七則知

氣血在人固自有量夫豈能逃陰陽之至數哉

大真論帝曰有

其年已老而有子者何也岐伯曰此其天壽過度氣脉常通而腎氣有餘也此雖有子男不過盡八八女不過

欽定四庫全書

婦人大全良方

盡七七而天地之精氣皆竭矣註雖老而生子子壽亦不能過天癸之數

凝形殊稟章第六

天地者形之大也陰陽者氣之大也惟形與氣相資而

立未始偏廢

莊子則陽篇太公調曰天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者為之公氣以

形載形以氣充推氣與形兩者相待故曰相資而立未始偏廢

男女構精萬物化生天

地陰陽之形氣寓焉

係辭曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生

語七八

之數七少陽也八少陰也相感而流通故女子二七天

癸至男子二八天癸至則以陰陽交合而兆始故也

岐伯



曰女子二七而天癸至任脉通衝脉盛月事以時下故
有子丈夫二八腎氣盛天癸至精氣溢瀉陰陽和故能
有子傳曰女子十四有為人母之道四十九絕生育
之理男子十六有為人父之道六十四絕陽化之理語

九十之數九老陽也十老陰也相包而賦形故陰窮於

十男能圍之陽窮於九女能方之則以陰陽相生而成

終故也

字說陰窮於十圍之者男陽窮於九方之者女
九有變也女方之不足十無變也男足以圍之

解曰男有家所以圍陰於外女有室所以方陽於內易
曰婦人正吉從一而終也夫子制義從婦凶也圍圓也
君道也夫道也圓則可以制義而行仁方也臣道也婦
道也方則從一而已男從圍與規從夫同意女從仁與

臣從仁

同意元氣孕毓皆始於子自子推之男左旋積歲三

欽定四庫全書

婦人大全良方

十而至己女右旋積歲二十而至己巳為正陽陰實從

之自己懷妊男左旋十月而生於寅女右旋十月而生

於申申為三陰寅為三陽而生育之時著矣其稟賦也

體有剛柔脉有強弱氣有多寡血有盛衰皆一定而不易

也

十九難曰男生於寅寅為木陽也女子生於申申為
金陰也楊氏注云元氣起於子人之所生也男從子

左行三十女從子右行二十俱至於巳為夫婦懷妊也
古者男子三十女年二十然後行嫁娶法於此也十月
而生男從巳左行至寅為十月故男行年起於丙
寅女從巳右行至申為十月故女行年起於壬申以至

分野異域則所產有多寡之宜吉事有祥則所夢各應



其類是故荆揚薄壤多女雍冀厚壤多男熊羆為男子之祥蛇虺為女子之祥是皆理之可推也

周官職方氏揚州其民二

男五女荆州其民一男二女雍州其民三男二女冀州其民五男三女詩斯千篇名吉夢維何維熊維羆維虺

維蛇大人占之維熊維羆男胎化之法有所謂轉女為

男者亦皆理之自然如食牡雞取陽精之全於天產者

帶雄黃取陽精之全於地產者

千金方轉女為男丹參丸用東門上雄雞頭又

方取雄黃一兩縫囊盛帶之本草丹雄雞補虛溫中通神殺毒其肝補腎其冠血益陽雄黃人佩之鬼神不能

近毒物操弓矢藉斧斤取剛物之見於人事者氣類潛

欽定四庫全書

婦人大全良方

通造化密移必於三月兆形之先蓋方儀則未具陽可

以勝陰變女為男理固然也

巢氏論云妊娠三月始胎形像始化未有定儀見物

而變欲得男者操弓矢射雄雞

氣質生成章第七

具天地之性集萬物之靈陰陽平均氣質員備咸其自

爾然而奇耦異數有衍有耗剛柔異用或強或羸血榮

氣衝不能逃於消息盈虛之理則稟貸之初詎可一槩

論是以附贅垂疣駢拇枝指侏儒跛蹙形氣所賦有如



此者瘡瘍癰腫聾盲瘖啞瘦瘠疲瘵氣形之病有如此	者然則胚胎造化之始精移氣變之後保衛輔翼固有	道矣 孝經云天地之性人為貴 天有五氣各有所湊地	有五味各有所入所湊有節適所入有度量凡所畏忌	悉知戒慎資物為養者理固然也寢興以時出處以節	六節藏象論曰天食人以五氣地食人以五味王冰云	天以五氣食人者臊氣湊肝焦氣湊心香氣湊脾腥氣	湊肺腐氣湊腎地以五味食人者酸味入肝可以高明	苦味入心甘味入脾辛味入肺鹹味入腎也	可以周密使霧露風邪不得投間而入因時為養者理	欽定四庫全書	婦人大全良方	宜然也以至調喜怒寡嗜慾 禮記月令仲夏之月可以	精微論云冬日在骨蟄虫周密君子屋室夏則順陽	在上故可以高明冬則順陽氣之伏藏故可以周密作	勞不妄而氣血從之皆所以保攝妊娠使諸邪不得干	馬 天真論岐伯曰上古之人其知道者不妄作勞故能	形與神俱而盡終其天年通天論曰聖人陳陰陽筋	脉 和同骨髓堅 固氣血皆從苟為不然方授受之時一失調養則內	不足以為中之守外不足以為身之強氣形弗充而疾	痰因之 脉要曰五臟者中之守也得守者生失守者死	又曰夫五臟者身之強也得強則生失強則死	若食兔脣缺食犬無聲食雜魚而瘡癬之屬皆以食物



不戒之過也	孫思邈養胎法云妊娠食兔肉令子缺唇
又異法方宜論云者使	人熱中注云魚發瘡
疾者何岐伯曰名為胎病此得之在腹中時其母有	所大驚氣上不下精氣并居故令子發為癲疾也
腎	氣不足而解顱
巢氏云解顱者其狀小兒年大顱應合	而不合頭縫開解是也腎氣不成故也
腎主骨髓而腦為髓海腎氣不成則	脾胃不和而羸瘦
腦髓不足不能結成故頭顱開解	巢氏云夫羸瘦不生肌膚皆為脾胃不和不能飲食故
血氣衰弱不能榮於肌膚凡小兒在胎而遇寒冷或生	而挾伏熱皆令兒
不能食故羸瘦也	心氣虛乏而神不足之屬皆以氣血
不調之故也誠能食飲知所戒推而達之五味無所傷	
欽定四庫全書	婦人大全良方
誠能於氣血知所	闕
婦人大全良方卷十	



欽定四庫全書

婦人大全良方卷十一

宋 陳自明 撰

脉例第一

王子亨云若妊娠其脉三部俱滑大而疾

在左則男
在右則女

經云陰搏陽別謂之有子搏者近也陰脉逼近於下陽

脉別出於上陰中見陽乃知陽施陰化法當有子又少

陰脉動甚者姙子也手少陰屬心足少陰屬腎心主血

欽定四庫全書

婦人大全良方

腎主精精血交會投識于其間則有娠又三部脉浮沉

正等無病者有姙也餘病如脉經說 左手尺部浮洪

者為男胎也右手尺部浮洪者為女胎也兩手尺部俱

洪者為兩男俱沉實者為兩女又云中指一跳一止者

一月胎二跳二止者二月胎也

診婦人有姙歌第二

肝為血兮肺為氣血為榮兮氣為衛陰陽配偶不參差

兩臟通和皆類例血衰氣旺定無孕血王氣衰應有體





男	左寸口為太陽其脉	右手太陰沉細女	右手寸口
脉	沉細是	諸陽為男	諸陰為女
諸陰脉	即沉細之類是也	三部沉正等無	三部沉正等無
絕尺內不止真胎婦	寸關尺三部脉沉浮正直齊等	胎婦也	真的懷
胎婦也	夫乘妻今縱氣霧	火金行乘木即鬼賊脉也	氣霧霧者露也又上下也謂夫之陽氣乘妻之
陰氣二氣上下相逐如霧如露潤澤結子也	妻乘夫	今橫氣助	謂兩傍橫氣相佐助也
子乘母也謂子氣犯母氣相	母乘子今順氣護	是母氣	乘於子
乘今逆行之氣相參合也	欽定四庫全書	婦人大全良方	氣為順氣相護衛也凡胎聚縱橫
逆順四氣以榮養方能成形也	小兒日足胎成聚身	熱脉亂無所苦	婦人懷小兒五箇月是以數足胎成就
亂非病苦之證謂五月胎已成受火	汗出不食吐逆時	精神結備其中住	謂胎受五行精氣以成形稟二經
氣未備故胎氣未安上衝心胃則汗出不食吐逆	滑疾	名曰惡阻俗呼選飯唯思酸辛之味以謂胎氣也	為血氣盛則
始結為胎也	但疾不散五月母	其脉但疾數而不散者	弦緊牢強滑者安沉細而微歸泉路
孕婦之脉宜弦緊	牢強滑利為安	孕婦之脉宜弦緊	孕婦之脉宜弦緊



之脉若沉細而微謂脉與形不相應故云死也前文雖云太陰沉細又云諸陰為女其說似有相違謂三部脉皆不沉細及微故不同也	驗胎法第三 凡一方	婦人經脉不行已經三月者欲驗有胎	川芎生不見火為細末空心濃煎艾湯調下方寸匕覺腹	內微動則有胎也	胎殺避忌產前將護法第四	一受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形必	欽定四庫全書 婦人大全良方	傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣甚至母殞驗若返掌斷不可忽	月遊胎殺第五	立春在房床 驚蟄在戶單扇 清明在門雙扇 立夏在竈	芒種在母身 小暑在竈 立秋在確按京本云在正北方子位	白露在厨廁 寒露在門 立冬在戶及厨 大雪在	爐及竈 小寒在房及母身	十干日遊胎殺第六



甲己日占門	乙庚日占碓磨	丙辛日占井竈	丁
壬日占厨廨	戊癸日占米倉		
十二支日遊胎殺第七			
子丑日占中堂	寅卯辰酉日占竈	巳午日占門	
未申日占籬下	戌亥日占房		
六甲旬遊胎殺第八			
甲子旬遊窻碓	甲戌旬遊正廳	甲申旬遊中庭	
甲午旬遊房內	甲辰旬遊房中	甲寅旬遊	闕
欽定四庫全書	婦人大全良方		
太史局日遊胎殺第九			
每遇癸巳甲午乙未丙申丁酉五日在房內北	庚子		
辛丑壬寅三日在房內南	癸卯一日在房內西	甲	
辰乙巳丙午丁未四日在房內東	六戊六巳日在房		
內中	餘日在外無占		
凡遊在房內不宜於方位上安牀帳及掃舍皆凶			
又有小兒殺及本年三殺及產婦身黃定命皆不可犯			
凡妊娠之後將此貼於當眼常照應之切不可穿鑿修			



掘移釘繫籬壁重物展壓之類犯之重則胎死腹中母亦不利輕則子受其殃成人之後必定破形拳攣跛縮瘡癰犯之極驗

食忌論第十

一受孕之後不可食之物切宜忌食非惟有感動胎氣之戒然於物理亦有壓忌者設或不能戒忌非特延月難產亦能令兒破形母殞可不戒哉

食雞肉糯米

合食令子

生寸白蟲

食羊肝令子生多厄

欽定四庫全書

婦人大全良方

食鯉魚鱠及雞子令兒成疳多瘡 食犬肉令子無聲音

食兔肉令子缺唇

蓋兔乃不雄而孕生子則口中吐出是以忌焉

鴨子與桑椹同食令子倒生心寒 食鱉令子項短

及損胎雀肉合豆醬食之令子面生黥□黑子

食豆醬合藿食之墮胎 食冰漿絕產

食雀肉令子不耻多淫 食山羊肉令子多病

食子薑令子多指生瘡 食螃蟹令子橫生

食蝦蟇鰱魚令兒瘡癰 食驢騾馬肉延月難產



如此之類無不驗者則知聖人胎教之法豈非	慮有自其然乎	孕婦藥忌諱第十一	蚘□水蛭地膽蟲 烏頭附子配天雄	躑躅野葛虻蛄類 烏喙側子及蜜虫	牛黃水銀并巴豆 大戟蛇蛻及蜈蚣	牛膝梨蘆并薏苡 金石錫粉及雌雄	牙硝芒硝牡丹桂 蜥蜴飛生及□虫	欽定四庫全書 婦人大全良方	代赭蚱蟬胡粉麝 芫花薇蘅草三稜	槐子牽牛并皂角 桃仁蟾蜍和茅根	蘋根礪砂與乾漆 亭長波流茵草中	瞿麥蘭茹蟹爪甲 蝟皮赤箭赤頭紅	馬刀石蠶衣魚等 半夏南星通草同	乾薑蒜雞及雞子 驢馬兔肉不須供	切忌婦人產前忌 此歌宜記在心曾	婦人大全良方卷十一



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷十二

總校官太醫院員外郎 袁天錫

編修臣 倉聖脈覆勘

總校官原任中允 臣 王燕緒

校對官中書 臣 葉 蘭

謄錄監生 臣 周 鈐



欽定四庫全書

婦人大全良方卷十二

宋 陳自明 撰

妊娠疾病門

胎教已明須知妊娠疾病故以次之

凡妊娠諸病但忌毒藥餘當對證依法治之

妊娠隨月數服藥及將息法第一

凡二十方

千金妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥

毋食腥辛是謂纔正

欽定四庫全書

婦人大全良方

又妊娠一月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰內屬

於肝肝主筋及血一月之內血行否澁不為力事寢心

安靜毋令恐懼

又妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重

腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雄雞湯方

烏雄雞

一隻治如食法

吳茱萸

升

茯苓

阿膠

各二兩

生薑

甘草

各一兩

人參

芍藥

白朮

各三兩

麥門冬

伍合去心

右十味細切以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥



又若曾傷一月胎者當預服補胎方	北細辛一兩防風二兩烏梅一升吳茱萸五合乾地黄	白朮各一兩大麥五合生薑四兩	右呔咀以水七升煮取二升半去滓分溫三服若寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去細辛茱萸加栝樓根二兩若有所思去大麥加栝子仁三合一方有人參一兩忌生菜蕪荑桃李雀肉等物	欽定四庫全書 婦人大全良方	妊娠二月名始膏母食辛臊居必靜處男子勿勞百節以痛是謂胎始結	又妊娠二月足少陽脉養不可鍼灸其經足少陽內屬於膽膽主精二月之時兒精成於胞裏當謹護驚動	又妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎卒中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾湯主之方	丹參三兩當歸三兩人參三兩麻黃去節艾葉二兩阿膠炙各二兩



甘草

炙 一兩

大棗

十二枚 擘

生薑

六兩

右九味切以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠煎取三升分溫三服忌海藻菘菜

又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方

黃連

人參

各一兩

吳茱萸

五合

生地黄

五兩

生薑

三兩

右五味切以醋漿七升煮取三升分四服日三夜一每十日一作若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳忌猪肉冷水蕪荑一方當歸半兩

欽定四庫全書

婦人大全良方

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而外感者也

又妊娠三月手心主脉養不可鍼灸其經手心主內屬於心無悲哀無思慮驚動

又妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁瞋恚喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛腰背痛卒有所下雄雞湯方



雄雞 一隻治 甘草 炙 茯苓 人參 阿膠 各二兩 黃芩	白朮 各一兩 芍藥 四兩 麥門冬 去心五合 大棗 十四枚 生薑 一兩切	右呖咀以水一斗五升煮雞減半內藥煮取一半入清酒三升并膠再煎取三升分三服一日盡之當溫	卧忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等 一方有當歸川芎二兩無黃芩生薑	又若曾傷三月胎者當預服茯苓神湯方	茯苓 丹參 龍骨 各一兩 阿膠 當歸 甘草 炙	人參 各二兩 赤小豆 二十粒 大棗 十二枚	欽定四庫全書 婦人大全良方	右呖咀酢漿一斗煮取三升分四服七日後服一劑腰痛者加桑寄生 二兩 深師方有薤白 二兩 麻子 一升 忌同前	妊娠四月始受水精以成血脉其食稻粳其羹魚鴈是謂成血氣以通耳目而行經絡	又妊娠四月手少陽脉養不可鍼灸其經手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食又妊娠四月為離經有寒心下溫溫欲嘔胃膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒中風寒頸項



強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胃
 煩不得安卒有所下菊花湯方

菊花 如雞子
大一枝 麥門冬 去心
一升 麻黃 去
節 阿膠 炙各
三兩 生薑 五
兩

甘草 炙 當歸 洗各
二兩 人參 一兩
半 大棗 十四
枚擘

右細剉以水八升煮減一半內清酒三升并阿膠煎

取三升分三服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日

忌羊肉海藻菰菜錫等

又若曾傷四月胎者當預服調中湯方

欽定四庫全書

婦人大全良方

芍藥 四兩 甘草 炙 芎藭 續斷
各一兩 柴胡 白朮
各三兩

烏梅 一升 生李根白皮 三兩 當歸 一兩
半 生薑 四兩 厚朴 炙

枳實 炙各
二兩

右細切以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日

再服一劑一方有半夏二兩忌海藻菰菜桃李雀肉

妊娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必

厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和

菜萁調以五味是謂養氣以定五藏



又妊娠五月足太陰脉養不可鍼灸其經足太陰內輸	於脾五月之時兒四肢成無大饑無甚飽無食乾燥無	自炙熱無大勞倦	又妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦	腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處	腹痛悶頓欲仆卒有所下阿膠湯方 又名旋覆花湯	阿膠 四兩 人參 一兩 麥門冬 去心一升 生薑 六兩 吳茱萸 七合	旋覆花 當歸 芍藥 甘草 炙 黃芩 各二兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右細切以水九升煮取一半內清酒三升并膠微火	煎取三升半分為四服日三夜一先食再服便愈不	差更服忌海藻菰菜	又若曾傷五月胎者當預服安中湯方	甘草 炙 芍藥 各三兩 當歸 人參 乾地黄 芎藭 各二兩	五味子 五合 生薑 六兩 麥門冬 去心一升 大麻仁 五合 大棗 三十五枚	黃芩 一兩	右細切水七升清酒五升煮取三升半分四服日三



夜一七日再服一劑忌如前

小品療妊娠五月舉動驚愕胎動不安下在小腹痛引
腰脇小便疼下血安胎當歸湯

當歸 阿膠 芎藭 人參 各一兩 棗 十二箇 艾 一口 虎

右細切以酒水各三升合煮至三升去滓內膠令烊
分三服腹中當安小便緩也古今錄驗救急同一方
有甘草無參棗

妊娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊

欽定四庫全書

婦人大全良方

於野數觀走犬馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紐
筋以養其力以堅背膂

又妊娠六月足陽明脉養不可鍼灸其經足陽明內屬
於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美
無大飽

又妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體
腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼麥門冬湯方

麥門冬 去心 甘草 炙 人參 各一兩 乾地黄 三兩 黃芩 二兩



阿膠四兩 生薑六兩 大棗十五枚	右八味切以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服每如人行三四里中間進糜粥忌海藻	菰菜蕪荑	又若曾傷六月胎者當預服柴胡湯方	柴胡四兩 芍藥一方作紫葢 白朮炙各二兩 麥門冬三兩去心	茯苓一兩 芎藭二兩 乾地黄五兩 生薑六兩 大棗三十枚	右十味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一中	欽定四庫全書 婦人大全良方	間進糜粥勿食生冷及堅強之物七日更服一劑忌	海藻菰菜蕪荑桃李雀肉等一方有黃芩二兩	集驗療妊娠六七月胎不安常處旋覆花湯亦名阻病	旋覆花一兩 厚朴 白朮 枳殼 黃芩 茯苓各三兩	半夏炒方無 芍藥 生薑各二兩	右細切以水一斗煮取二升半先食分五服日三夜	二忌羊肉錫醋桃李雀肉千金同	妊娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止動作



屈伸以運血氣自此後居處必燥飲食避寒常食粳稻	以密腠理是謂養骨而堅齒	又妊娠七月手太陰脉養不可鍼灸其經手太陰內屬	於肺肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭	無薄衣無洗浴無寒飲	又妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉	若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背強葱白湯方	葱白 長三四寸 十四枚 半夏 洗切 麥門冬 去心各 一升 生薑 八兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	甘草 炙 當歸 各三兩 黃耆 各三兩 阿膠 四兩 人參 一兩半 黃芩 一兩	旋覆花 一把	右十一味切以水八升煮減半內清酒三升并膠煎	取四升温服一升日三夜一溫卧當汗出若不出者加	麻黃二兩煮服如前法若秋後勿強責汗忌羊肉錫	海藻菰菜等	杏仁湯若曾傷七月胎者當預服	杏仁 去雙仁 皮尖碎 甘草 炙 鐘乳 研 乾薑 各二兩 麥門冬 去心



吳茱萸各一升 五味子 粳米各五合 紫苑一兩	右九味切以水八升煮取三升半分四服日三夜一 中間進食七日服一劑忌海藻菘菜	妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是 謂密腠理光澤顏色	又妊娠八月手陽明脉養不可鍼灸其經手陽明內屬 於大腸大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物	無輒失食無忍大起	欽定四庫全書 婦人大全良方	芍藥湯又妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒 乍熱胎動不安常恐頭眩痛繞臍下寒時時小便白如	米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷痛而目視茫茫	芍藥四分 人參 當歸 甘草炙各三兩 白朮一兩 厚朴二兩炙	薤白切一升 生薑切四兩	右八味切以水五升酒四升煮取三升分三服日再	夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等	葵子湯若曾傷八月胎者當預服



甘草炙 柴胡 白朮各三兩 厚朴 芍藥各二兩 葵子二升	生薑六兩 大棗二十枚	右八味切以水九升煮取三升分三服日三服	一劑忌海藻菘菜桃李雀肉等	妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自時而待之是謂養毛髮多才力	又妊娠九月足少陰脉養不可鍼灸其經足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處溫冷無	欽定四庫全書 婦人大全良方	着灸衣	半夏湯又妊娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝腰背痛不可轉側短氣	半夏洗 麥門冬去心各五合 乾薑一兩 當歸 吳茱萸	阿膠炙各三兩 大棗十二枚	右七味切以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上溫分四服痢即止忌生物錫	猪腎湯若曾傷九月胎者當預服



猪腎 具一 茯苓 桑寄生 乾薑 乾地黄 芎藭 各三
白朮 四 麥門冬 一升 附子 中者一 大豆 三
右十味切以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三
升半分四服日三夜一十日更一劑忌猪肉冷水蕪
荑桃李雀肉酢物等
妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使
關節人神皆備但俟時而生集驗延年同
妊娠惡阻方論第二 凡十二方
欽定四庫全書 婦人大全良方
夫妊娠阻病者按咎殷產寶方謂之子病巢氏病源謂
之惡阻若婦人稟受怯弱或有風氣或有痰飲既妊娠
便有是病其狀顏色如故脉息和順但覺肢體沉重頭
目昏眩擇食惡聞食氣好食酸鹹甚者或作寒熱心中
憤悶嘔吐痰水胃腑煩滿恍惚不能支持不拘初娠但
疾苦有輕重耳輕者不服藥亦不妨重者須以藥療之
千金方有半夏茯苓湯茯苓圓二方專治阻病然此二
藥比來少有服者以半夏有動胎之性蓋胎初結慮其



易散此不可不謹也張仲景傷寒論云婦人傷風續得寒熱發作有時此為熱入血室有用黃龍湯者小柴胡去半夏也此蓋為妊婦而設焉王子亨則有白朮散局方則有人參丁香散用之良驗然三方皆大同而小異楊振則有人參橘皮湯齊士明則有醒脾飲子試之亦效皆不用半夏動胎等藥服者知之	白朮散 治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者	白朮 一人半 人參 兩半 丁香 二錢半 甘草 一錢	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末每服二錢水一錢薑五片煎至七分溫服	人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水	人參 去蘆 陳橘紅 白朮 麥門冬 去心各一兩 甘草 三錢	厚朴 製 白茯苓 去皮各半兩	右為粗末每服四錢水一錢半淡竹茹一塊如彈子	大生薑三片煎至七分去滓澄清溫服空心食前	無茯苓麥門冬甘草	人參丁香散 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心



腹刺痛	人參 ^{半兩} 丁香 藿香葉 ^{各一分}	右為散每服三錢水一瓊煎至七分去滓溫服無時	又方	人參 丁香 柿蒂 ^{各一兩} 甘草 良薑 ^{各半兩}	右為細末每服二錢熱湯點下無時	醒脾飲子 ^{此出王氏博濟方} 治妊婦阻病嘔逆不食甚者中滿	口中無味或作寒熱	欽定四庫全書	婦人大全良方	草豆蔻 ^{以濕紙裹灰火中煨令紙乾取出去皮用} 厚朴 ^{製各半兩} 乾薑 ^{三分} 甘草 ^{一分}	右為細末每服二大錢水一大瓊棗二箇生薑三片	煎至八分去滓呷服病輕者只一二服便能食舊有	橘紅二兩治寒熱瘧痢不食後人去橘皮以乾生薑	代乾薑治老人氣虛大便秘少津液引飲有奇效產	科醫官齊士明依舊用乾薑去橘皮亦名醒脾飲子	治阻病極為神驗宣和初在京師校勘	保生湯 治婦人經候不行身無病而似病脉滑大而



六部俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食臭或但	嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病治	之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎服	人參 一分 甘草 一分 白朮 一分 香附子 一分 烏藥 一分 橘紅 一分	右咬咀每服三大錢水一錢半薑五片煎至七分去	滓溫服無時或作末子調	古今錄驗療惡食	人參 四兩 厚朴 四兩 生薑 四兩 枳殼 四兩 甘草 各二兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右切以水六升煮取三升分三服	治妊娠阻病心中憤悶見食嘔吐惡聞食氣肢節煩疼	身體沉重多思嗜卧面黃肌瘦	人參 各八分 陳皮 各八分 白茯苓 各八分 麥門冬 各八分 甘草 各八分 生	薑 各十分 大棗 各二十箇	右咬咀以水五升煎取二升溫分三服忌菰菜醋等	凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈 一方無棗	子有半夏竹茹如陳皮分兩



二香散療妊娠胎氣不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水起坐覺重宜服之	香附子兩一 藿香葉 甘草錢各二	右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點下	近效方療妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐	青竹茹 麥門冬各三兩 前胡二兩 橘皮一兩 蘆根一握	右細切以水一大升煮取半升去滓分兩服食前一	服一方無麥門冬用小麥三合 體熱四肢煩熱者	欽定四庫全書 婦人大全良方	加地骨皮醫人夏侯伍錄方	李茂翁先生云若左脉弱而嘔服諸藥不止者當服理	血歸原藥則愈經云無陰則嘔是也	治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無效者	服此藥理血歸原則愈	人參 甘草 川芎 當歸 京芍藥丁香各半兩	白茯苓 白朮 陳皮各一兩半 苦梗炒 枳殼去穢炒各一分	半夏泡洗七次切炒黃一兩



右呔咀每服三錢重生薑五片棗一枚煎
安胎飲 治懷胎三月四月至九箇月日惡阻病者心
中憤悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食氣
欲啖鹹酸多睡少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動
腰腹疼痛或時下血及妊娠一切疾病並皆治之
甘草 茯苓 當歸 熟地黄 川芎 白朮
黃耆 白芍藥 半夏 泡洗七次切炒 阿膠 切粉炒 地榆 各等分
右呔咀每服三錢水盞半生薑四片煎至八分去滓
欽定四庫全書 婦人大全良方
溫服無時候一方無半夏地榆有人參寄生 一方
無白朮黃耆半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓
妊娠痰逆不思食方論第三 凡八方
夫水飲停積結聚為痰人皆有之少者不能為害多則
成病妨害飲食乃至嘔逆妊娠之病若嘔逆甚者傷胎
也原疾之由皆胃氣不調或風冷乘之冷搏於胃故成
斯病也亦惡阻之一端
半夏茯苓湯 治妊娠惡阻心中憤悶虛煩吐逆頭目



昏眩四肢怠惰百節煩疼痰逆嘔吐嫌聞食氣好咽鹹	酸惡寒汗出羸極黃瘦多卧多起不進飲食妊婦有痰	必生阻病千金以半夏茯苓湯以對之此思邈處方之	妙也若孕婦羸弱胎孕不牢則動必成咎全在醫者相	人強弱以投之又何慮焉	半夏 一兩泡十次 生薑 五兩 茯苓 五兩 熟地黃 各三兩 橘紅 各三兩	北細辛 人參 芍藥 紫蘇 川芎 各一兩 苦梗	甘草 各半兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右呶咀每服四大錢水二錢薑七片煎至七分去滓	空心溫服兼服茯苓圓	局方與崔氏無紫蘇細辛有旋覆花一兩有客熱煩	渴口瘡去橘皮細辛加前胡知母各三兩腹冷下痢	者去地黃加炒桂心二兩胃中虛熱大便秘小便赤	澁加大黃三兩去地黃加黃芩一兩然半夏雖能動	胎若炒過則無妨	張氏方半夏茯苓湯



半夏炮洗七次炒黃 陳皮各二兩半 白茯苓二兩 縮砂仁一兩 甘草四兩	右咬咀每服四錢水二錢薑十片棗一箇烏梅半箇煎至七分食前溫服	茯苓圓 治妊娠阻病心中煩悶頭目暈重憎聞食氣吐逆吐痰煩悶顛倒四肢重弱不自勝持服之即效要	先服半夏茯苓湯兩劑後服此藥	赤茯苓 人參 桂心 乾薑 半夏泡洗七次炒黃	橘紅各一兩 白朮 葛根 甘草 枳殼各二兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末煉蜜為圓如梧桐子大米飲吞下五十圓	日三服 一方有麥門冬忌海藻菰菜羊肉錫糖桃	李雀肉酢等 肘後只五味云妊娠忌桂千金方	療妊娠心腹支滿痰逆不思飲食	赤茯苓 前胡 白朮 紫蘇葉各一兩 半夏	麥門冬 人參 大腹皮各半兩	右為粗末每服四錢水一錢薑五片煎至七分去滓	溫服一方無大腹皮人參有大腹子檳榔



療妊娠嘔吐不食兼吐痰水	生蘆根 十 分橘紅 四 分生薑 六 分檳榔 二 分	右切以水二瓊煮取七分空心熱服	療妊娠心膈氣滯嘔吐不下飲食心神虛煩四肢少力	枇杷葉 半夏 麥門冬 人參 甘草 半 訶子肉	藿香 各一 兩 赤茯苓 枳殼 陳皮 各三 分	右咬咀每服三錢水一瓊薑三片棗一箇煎至七分	去滓溫服 一方無大 棗訶子	欽定四庫全書 婦人大全良方	集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食	青竹茹 橘皮 各三 兩 生薑 茯苓 各四 兩 半夏 五 兩	右細切以水六升煮取二升半去滓分三服不差頻	服忌羊肉錫酢等物	古今錄驗療妊娠不欲食或吐春月所宜服柴胡湯	甘草 柴胡 各二 兩 麻黃 一 兩 食茱萸 半 兩 大棗 十二 枚	右細切以水六升煮取三升適寒溫服一升日三療	食噫醋除熱下氣所宜多與上同但秋夏去茱萸加



枸杞一升六月加小麥一升石膏三兩秋去石膏加
甘草一兩九月去麻黃加乾薑一兩十月加川芎三
分忌海藻菘菜

胎動不安方論第四

凡二十方

凡婦人妊娠胎動不以日月多少而常墮胎者有雖有
胎而月信雖不多常來而胎不損者產寶方云婦人妊
娠常胎動不安者由衝任經虛胞門子戶受胎不實故
也并有飲酒房室過度有所損動不安者巢氏云婦人
衝任二經挾風寒而有胎故不以日月多寡因悞有擊
觸而胎動者有喜怒不常氣宇不舒傷於心肝觸動血
脉衝任經虛乃致胞門不固或因登高上廁風攻陰戶
入於子宮如此皆令胎動不安也曾有以妊娠月信不
絕而胎不損問產科能宗古者答曰婦人血盛氣衰其
人必肥既娠之後月信常來而胎不動若據晚進觀之
便以為漏胎若作漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治
則其胎未必墮今推宗古之言誠有旨也巢氏云婦人

欽定四庫全書

婦人大全良方



經閉不利別無所苦者是謂有子以其經血畜之以養
胎擁之為乳汁也有子之後畜以養胎矣豈可復能散動
耶所以然者有娠而月信每至是亦未必因血盛也若
謂婦人榮經有風則經血喜動以其風勝則可也既榮
經為風所勝則所來者非養胎之血以此辨之若作漏
胎治之必服保養補胎之藥且胎不損強以藥滋之乃
所謂實實虛虛其胎終墮宜矣若醫者知榮經有風之
理專以一藥治風經信可止或不服藥胎亦無恙然而

欽定四庫全書

婦人大全良方

有胎本不固而因房室不節先漏而後墮者須作漏胎

治之此又不可不審也亦有婦人年方壯歲聽醫官言

某藥可服致補煖而子使胞門子戶為藥所操搏巢氏病源

并產寶方並謂之胞門子戶張仲景謂之血室使新血不滋舊血不下設或有

子不以遲晚則必墮中年之後氣宇漸衰必有崩中帶

下之疾或月信愆期漸覺黃瘦腰背不伸五心煩熱五

勞七傷之疾從此而生不獨胞門子戶風寒而生也故

千金翼方有朴硝盪胞湯正為此疾今之醫者未見有



用亦未見有知之者又論妊娠胎動其由有二一因母病而胎動但療母疾其胎自安若胎不堅固自動其母疾唯當安胎其母自愈一因勞役氣力或觸冒冷熱或飲食不適或居處失宜輕者轉動不安重者便致傷墮當以母形色察之母面赤舌青者兒死母活唇口青兩邊沫出者子母俱死面青舌赤兩邊沫出者母死子活也

集驗方療妊娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已

欽定四庫全書

婦人大全良方

有所見方

艾葉 阿膠 當歸 川芎 各三兩 甘草 一兩

右細切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分三服

日三千金文仲備急同

刪繁療婦人懷妊胎動不安葱豉安胎方

香豉 一升 葱白 一升 阿膠 二兩

先以水三升煮葱豉取一升去滓入膠再煎令烊服

一日一夜可服三四劑經心錄同



鈎藤湯 治妊娠八九月胎動不安心腹疼痛面目青	冷汗出氣欲絕此由勞動用力傷胎宮宜急治之	鈎藤 當歸 茯神 人參 各一兩 苦梗 半 桑寄生 兩半	右為粗末每服五大錢水二椀煎至一椀去滓溫服	無時候忌猪肉菰菜若煩熱加石膏二兩半臨產月	加桂心一兩	治妊娠胎動不安護胎法	鯉魚 二斤 粳米 一升 葱 一握 薑	欽定四庫全書 婦人大全良方	右作臠食之每月一度	治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶 產寶同	當歸 桑寄生 各四分 川芎 三分 艾 八分 阿膠 三分 葱 十四莖	右以水二升煮取八合下膠空腹溫分二服一方無	豉用銀器煎集驗無寄生豉有續斷三分銀多少先	煎後入藥	黃耆湯 治胎動不安腹痛下黃汁	糯米 一合 黃耆 川芎 各一兩



右細剉水一大錢煎至一錢三分溫服	產寶方治胎動	熟艾 阿膠 各二兩 葱白 一升	右以水四升煮取一升半分為三服	安胎鐵罩散	白藥子 一兩 白芷 半兩	右為細末每服二錢煎紫蘇湯調下或胎熱心煩悶	入沙糖少許煎	欽定四庫全書 婦人大全良方	銀苧酒 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方	苧根 二兩 銀 五兩 清酒 一盞	右以水二大錢煎至一大錢去滓分溫二服	治胎動方 養生必用方救急療胎動去血腰腹痛	阿膠 川芎 當歸 青竹茹 各二錢	右以水十錢內銀一斤煮至五錢去銀入上件藥三	味煎至二錢半去滓入膠再煎膠烱分溫三服空心	自早至暮盡未效再作



治妊娠冷熱腹內不調致胎不安 產寶方	艾葉 二兩 當歸 二兩 乾薑 各三兩 川芎 四兩	右以水四升煮取二升分溫四服不過兩劑	寄生湯 治胎氣常不安治五箇月以後胎不安	桑寄生 洗剉 秦艽 各半兩 阿膠 各半兩 糯米 半兩 作粉	右以新汲水三升先下寄生秦艽二味煮至二升去	滓次入阿膠糯米再煎約有一升止分作三服空心	食前日午服之忌酒醋三五日娠婦胎氣至五月已	欽定四庫全書 婦人大全良方	後常不安者服之必效頃見娠婦好飲酒食鹹酸五	辛胎必動可不知之	治胎動不安	好銀 煮取 水 右着葱白作羹食之佳	又方	川芎 二兩 葱白 一升	右以水七升煮取二升半分溫三服	順氣飲子產前服之安胎



紫蘇葉 木香炮 人參 草豆蔻 茯苓各一兩	甘草半兩 大腹子一兩如氣弱者不用	右咬咀每服三錢水一椀苧根三寸糯米少許煎至	七分去滓溫服	療妊娠後不轉動方	阿膠炙一兩 桑寄生半兩	右為末以酒一升煮五沸下生雞卵一枚投酒中分溫	二服空心食前一服小品方無寄生有艾葉只用水煎	欽定四庫全書 婦人大全良方	文仲安胎寄生湯療血流下方	桑寄生 白朮各五分 茯苓四分 甘草十分	右切以水五升煮取二升半分三服若人壯者可加	芍藥八分足水二升若胎不安腹痛端然有所見加	乾薑四分即安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等崔氏	小品經心同	秦艽湯出王氏指迷方 治胎動不安 秦艽 阿膠炒 艾葉



右等分為粗末每服五錢水二錢糯米百粒煎至一 錢去滓溫服
小品療妊娠重下痛引腰背安胎止痛湯方 當歸 阿膠 炙 乾地黄 黃連 芍藥 各一兩 雞子 一枚
秫米 一升
右七味以水七升攪雞子令相得煮 □ 米令如蟹目 沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑經心錄同
又膠艾湯療損動母去血腹痛方
欽定四庫全書 婦人大全良方
膠 一斤 艾葉 一
右二味以水五升煮取二升半分三服經心錄同
妊娠漏胎下血方論第五
夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任 脉虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝任之脉為 經絡之海起於胞內手太陽小腸脉也手少陰心脉也 是二經為表裏上為乳汁下為月水有娠之人經水所 以斷者壅之養胎畜之以為乳汁也衝任氣虛則胞內



泄不能制其經血故月水時下亦名胞漏血盡則人斃 矣又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂 致胎動若母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎 不安故令下血也	妊娠卒然下血方論第六 凡十二方	夫妊娠卒然有損動或冷熱不調和致傷於胎故卒痛 而下血若不止之則墮胎也	療妊娠三四箇月腹痛時時下血	欽定四庫全書 婦人大全良方	續斷分八艾葉 當歸 乾地黄兩六 竹茹 阿膠	雞蘇錢各四	右以水一升煎取六合去滓空心再服隔日更服 療妊娠六七箇月忽胎動下血腹痛不可忍	川芎分八 桑寄生分四 當歸分十二	右以水一升煎取八合下清酒半升再煎取八合分 三服如人行五六里再服	廣濟主安胎胎病漏血腹痛



當歸 川芎 阿膠炙 人參各一兩 大棗二十箇	右切以水三升酒四升煮取二升半分三服五日一	劑頻服三四劑無所忌	又療妊娠胎動腹痛及下血安胎	當歸 川芎 苧根各三兩 鹿角膠 艾葉各二兩 葱白一升	右細切以水一斗煮取五升空心熱服正方用銀煮	水煎藥又見腰痛門	療妊娠忽下血胎上衝心手足逆冷用生艾汁二瓊入	欽定四庫全書 婦人大全良方	阿膠生蜜各二錢煎至一瓊半稍熱服如無生艾濃煎	熟艾汁	治妊娠忽然下血腰痛不可忍 男六德續添	鹿角剉各半兩 當歸剉各半兩	只作一服以水三瓊煎至一半空心食前頓服不過	二服即安	又方	阿膠炒一兩 艾葉灰半兩



右為細末空心糯米飲調下二錢	漏胎下血不止胞乾即死宜急治之	生地黄汁 一升五合	右同煎三五沸分溫三服以止為度	崔氏療妊娠下血不止血盡子死	生乾地黄為末酒服方寸匕日三夜一即愈不過三服良	又療妊娠漏胞方 一方云及又見指迷方	欽定四庫全書 婦人大全良方	生乾地黄 五兩二兩半 乾薑 二兩半	右為末酒服方寸匕日再集驗文仲經心同	療妊娠無故卒然下血不絕方	阿膠 三兩 用清酒一升半煎取一升頓服	又方治妊娠卒然下血兼治胎衣不下方	右以鐵錘燒令通赤內酒中如此者三次候溫飲一瓊	妊娠驚胎及僵仆方論第七 凡七方	夫妊娠驚胎者是懷妊月將滿其胎神識已具或將產



之時從高墜下傷損胞絡致血下胎動遂上搶心胃氣
絕不醒其母面赤舌青口無沫出者兒死母活唇口俱
青沫出者子母俱死面青舌青沫出母死子活若下血
不止胞燥胎枯令子死矣

催生神妙佛手散

一名芎藭湯

治婦人妊娠五七月因事築

磕着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此
藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下本

出文仲徐王效神驗胎動方云治血上衝心腹滿悶者

欽定四庫全書

婦人大全良方

如湯沃雪救急經心同

出外臺

又治產前產後體熱敗血

腹痛

當歸

六兩 川芎 四兩

張氏方等分

右為粗末每服三錢水一大盞煎令泣泣欲乾投酒

一大盞止煎一沸去滓溫服口噤灌之如人行五里

再服不過三二服便生一方云此藥治傷胎去血多

崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多昏暈欲倒者

以水煎服或先以漏血腹內疼痛加芍藥官桂減半



隨手效 詳見通 用方	治妊娠因墜倒損胎不轉動腹內疼痛腰重及子死腹 中不出須臾三服立下	川芎一兩為細末以熱酒調服方寸匕日三四服	治妊娠因失所動困絕千金方亦治子煩	右取竹瀝飲一升立愈	治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶	生地黄 益母草各一兩 當歸 黃耆各半兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右呶咀每服四錢水一盞薑四片煎至六分去滓無 時候	集驗療妊娠二三月上至七八月頓仆失踞胎動不安 傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣下血 不止方	乾地黄 當歸 艾葉各二兩 阿膠 川芎各三兩	右以水七升煮取二升半分作三服腹痛甚加杜仲	五加皮各三兩 一方無地黄有甘草一方無地黄却用



生薑自然汁一匙地黃汁半合馬通半合煎成藥去	滓入此再煎三沸溫服一方有人參白茯苓水煎	竹茹酒 治妊娠誤有失墜損築胎損疼痛	青竹茹 二合 好酒 一升 煮三五沸分作三服即安	秦艽湯 療妊娠或因僵仆胎動不安臍腹疔痛	出產科 方見前	療妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍兼治血崩甚	效兼治子冒 又名子癰	欽定四庫全書 婦人大全良方	縮砂 不以多少 和皮炒令黑色一方用仁熨斗內畧炒為	細末熱酒調下二錢不飲酒者以米飲調下皆可覺	腹中熱則胎已安矣此方極效溫隱居云神效不可	盡述僕用有效	妊娠胎上逼心方論第八 凡七方	夫妊娠將養得所則血氣調和故兒在胎則安當產亦 易若節適失宜則血氣乖理兒在胎則亟動至產育亦 難而子上逼於心者由產難用氣力胎動氣逆胎上衝



通於心者凡胎上逼於心則悶絕胎下乃甦甚者至死也	紫蘇飲 治妊娠胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之	子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下名七寶散	當歸 分三 甘草 分一 大腹皮 人參 川芎 陳橘皮	白芍藥 兩 各半 紫蘇 兩 一	右呶咀每服半兩水一椀半薑四片葱白七寸煎至	七分去滓空心溫服 曾有一婦人累日產不下服催	太早心懷一點懼氣結而不行然非氣不順也素問	云恐則氣下蓋恐則精却却則上焦閉閉則氣還還	欽定四庫全書 婦人大全良方	則下焦脹氣乃不行矣得此藥一服便產及婦人六	七月子懸者予用此數數有驗不十服胎便近下方	出本事丁未六月間羅新恩孺人黃氏有孕七箇月	遠出而歸忽然胎上衝心而痛坐卧不安兩醫治之	無效遂說胎已死矣己用草麻子去皮研爛加麝香	調貼臍中以下之命在垂垂召僕診視兩尺脉沉絕	他脉平和僕問二醫者曰契兄作何證治之答曰死	胎也何以知之答曰兩尺脉絕以此知之僕問之曰	此說出在何經二醫無答遂問僕曰門下作何證治之	僕答曰此子懸也若是胎死却有辨處夫面赤舌青	者母子俱死是其驗也今面色不赤舌色不青其子	未死其證不安衝心而痛是胎上逼心謂	之子懸宜紫蘇飲子治藥十服而胎近下矣	當歸湯 治妊娠胎動盪心悶絕煩燥口乾橫生倒產



上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保安散一方無甘草有川芎厚朴產寶方有川芎	當歸 人參 各一兩 阿膠 炒一兩 甘草 二兩 連根葱白 一握	右細剉水二升煎四味至升半去滓下葱再煎三合	溫服一劑分為三服	治胎上逼心熱痛下血	麴半斤搗碎和熟水絞取汁三中殘無時分溫五服	一方治胎動腹痛連腰用麥麴新汲水調下一方用	欽定四庫全書 婦人大全良方	神麴大同小異	治胎上逼心煩悶方又治妊娠六七月已後胎動困篤	葱白二七莖濃煮汁飲之即安若胎已死服之即出	未死即安未效再服	治胎不順胎上逼心方 以烏犬血少少飲之當下	治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食	白朮 五兩 黃芩 二兩 芍藥 四兩	右水六升煮取二升半分為三服緣胎有水致痛兼



易產

文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方 取弩弦急帶之

立愈

妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛方

第九 凡一方

療妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

粳米^五升黃耆^六兩

右以水七升煎取二升分為四服

欽定四庫全書

婦人大全良方

妊娠誤服毒藥傷動胎氣方第十 凡三方

奪命圓 專治婦人小產下血至多子死腹中其人增寒

手指唇口爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則悶絕欲

死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草藥傷動胎

氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下此方

的係異人傳授至妙

牡丹皮 白茯苓 桂心 桃仁^製 赤芍藥

右等分為細末以蜜圓如彈子大每服一圓細嚼淡



醋湯送下速進兩圓至胎腐爛腹中危甚者立可取出	治婦人服草藥墮孕腹痛方 男六德補遺	白扁豆生去皮為細末米飲調服方寸匕若修製不	及濃煎亦可亦解男子女人誤中砒毒亦治婦人赤	白帶下要炒黃為末米飲調下	阿膠散 治妊娠不問月數深淺或因頓仆或因毒藥	胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣力方	欽定四庫全書 婦人大全良方	熟地黃 兩二 白芍藥 艾葉 當歸 甘草 阿膠	黃耆 兩各一 一方有川芎	右呶咀每服半兩水一大錢薑三片棗一箇煎至七	分去滓溫服無時	妊娠心痛方論第十一 凡七方	夫妊娠心痛者多是風邪痰飲乘於心之經絡邪氣搏	於正氣交結而痛也若傷心正經而痛者為真心痛心	為帝王之官統領諸藏不可受邪邪若傷之朝發夕死



夕發朝死若傷心支別絡而痛者則乍安乍甚休作有時也妊娠之人或有病而痛不已者氣乘胞絡傷損子藏也則令胎動凡胎轉移則多不安不安而動於血者則血下也	治妊娠卒心痛氣欲絕 方出產寶	川芎 當歸 茯苓 厚朴 製各等分	右水六升煎取二升分為二服忌如前	雷公炮炙論云心痛欲死急覓延胡	欽定四庫全書 婦人大全良方	白朮湯 治妊娠卒心痛欲死不可忍者 出古今錄驗	白朮 三兩 赤芍藥 二兩 黃芩 一兩半	右切以水六升煮取二升半分三服半日令盡微下	水令易生忌桃李雀肉	千金療妊娠心痛	青竹茹 一升 羊脂 八兩 白蜜 三兩	右三味合煎每服棗核大三枚食前頓服日三服	又方



青竹茹一升酒二升煮取一升半去滓分溫頓服

又方

破雞子一枚調酒服之

又方

大麻子三升研水八升煮取五升分為五服

又方

橘皮三兩豆豉二兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大溫水下二七圓無時

欽定四庫全書

婦人大全良方

候四方出外
臺秘要

妊娠心腹痛方論第十二

凡十一方

夫妊娠心腹痛者或由宿有冷疹或新觸風寒皆由藏
虛而致發動也邪正相擊而并於氣隨氣上下衝於心
則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也妊娠而痛者邪
正二氣交攻於內若不時差者其痛衝擊胞絡必致動
胎甚則傷墮也又云妊娠心腹疼痛多是風寒濕冷痰
飲與藏氣相擊故令腹痛攻傷不已則致胎動也



當歸芍藥散 治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產後	血暈內虛氣乏崩中久痢常服通暢血脉不生癰癰消	痰養胃明目益津	白芍藥 半斤 當歸 茯苓 白朮 各二兩 澤瀉 川芎	各四兩一方 川芎只兩半	右為細末每服二錢食前溫酒調服 元和紀用經	云本六氣經緯元能祛風補勞養真陽退邪熱緩中	安和神志潤澤容色散邪寒瘟瘴時氣安期先生賜	欽定四庫全書 婦人大全良方	李少君久餌之藥後仲景增減為婦人懷妊腹痛方	本方用芍藥四兩澤瀉茯苓川芎各一兩當歸白朮	各二兩亦可以蜜元服 出三方	治妊娠心腹痛不可忍方	鹽一斤燒令赤右以兩指取一撮酒調服	療妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀刺	川芎 人參 茯苓 吳茱萸 苦梗 當歸 各三兩	厚朴 製 芍藥 各二兩



右咬咀以水九升煎取三升分三服氣下即安	療妊娠患腹痛并胎動不安	葱白 升 切一 人參 厚朴 阿膠川芎 各二 當歸 三	右咬咀以水七升煎取三升分作三服一方有甘草	無厚朴川芎	香朮散 治妊娠五箇月已後常胃腹間氣刺滿痛或	腸鳴以至嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食失節之	所致	欽定四庫全書 婦人大全良方	蔡元度寵人有子夫人怒欲逐之遂病醫官王師復處	此方三服而愈後用果驗	廣中莪茂 一兩 丁香 半 粉草 一	右為細末空心鹽湯點服一大錢覺胃中如物按下	之狀	草豆蔻散 治妊娠心腹常痛喫食減少四肢不和全	不入食	草葉仁 想是草 陳橘皮 乾地黄 白朮 各一 川芎 三



當歸炒 桂心 乾薑 木香各半兩	右為細末每服四錢水一錢棗二枚煎至六分熱服	阿膠散 治妊娠胎動腹中疴痛不思飲食	白茯苓 白朮 川芎阿膠各三分炒 當歸炒 陳皮各一兩	甘草一分	右呔咀每服三錢水一錢薑三片棗一箇煎至七分	去滓溫服	治妊娠四五月忽心腹絞痛	欽定四庫全書 婦人大全良方	大紅棗十四枚 燒存性為末以童子小便調下	治妊娠胎動欲落腹痛不可忍	上等銀一斤 茅根二升去黑皮	右以水九升煮銀取二升入清酒一升同煎茅根取	二升分為三服立安	古今錄驗療妊娠腹內冷痛忽胎動	薤白一升 當歸切四兩	右以水五升煮取二升作三服亦將小便服將去一



炊頃出	千金療妊娠腹中痛方	生地黃三斤擣取汁酒一升合煎減半頓服愈	妊娠中惡方論第十三 凡三方	夫妊娠人忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡言邪惡之氣中胎傷於人也所以然者血氣自養而為精神之主若氣血不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠之病亦致損胎也	欽定四庫全書 婦人大全良方	當歸散 治妊娠中惡心腹疔痛	當歸 丁香 川芎 各三兩 青橘皮 二兩 吳茱萸 半兩 湯泡三 次炒黑	右為細末無時溫酒調一錢	又方	生乾地黃 一兩 枳殼 木香 各三分	右為細末每服一錢酒調下	又方



苦梗

一兩細剉畧炒薑兩半煎服

妊娠腰腹及背痛方論第十四

凡十方

論曰腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之則腰痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞妊娠而腰痛甚者則胎墮也

療妊娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

當歸

三兩

阿膠

甘草

各二兩

葱白

一升

欽定四庫全書

婦人大全良方

右細剉以水七升煮取三升去滓分溫五服

紫酒治妊娠腰痛如折

大黑豆二合炒令香熟以酒一大瓊煮取七分去豆

空心頓服

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少瓦上炒令香熟為末嚼核桃肉半

箇空心溫酒調下二錢

療妊娠腰背痛反覆不得



鹿角 長六寸燒令赤酒中淬再燒 再淬以角碎為度取酒飲之 鹿角為末服亦	可	療妊娠腰疼痛不可忍或連胯痛 先服此散	杜仲 四兩 五加皮 阿膠 炙 防風 金毛狗脊 川芎	北細辛 白芍藥 草薢 各三兩 杏仁 八十枚去皮尖炒	右㕮咀以水九升煮取二升去滓下膠作三服	療妊娠三二月腰痛不可忍者 次服此圓	續斷 杜仲 各十分 芎藭 獨活 各三兩 狗脊 五加皮	欽定四庫全書 婦人大全良方	草薢 芍藥 薯蕷 訶子肉 各八兩	右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下四十圓日三	服	療觸動胎以致腰痛背痛	杜仲 五加皮 當歸 芍藥 人參 川芎	草薢 各三兩	右細剉以水七升煮取二升半分溫三服	療妊娠三二月及七八月胎動不安或腰肚痛及血下



川芎 當歸各四兩 艾葉 阿膠各二兩 甘草一兩	右細剉以水五升煮取二升去滓分溫三服	大地黃圓 治產前後腰腹疼一切血疼信效方治血	氣虛四肢不舉骨髓熱疼	熟地黃二兩 烏梅肉 當歸各一兩	右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓白湯嚼下空	心	廣濟療妊娠胎動腰痛及下血安胎方見前妊娠卒然下血方論中	欽定四庫全書 婦人大全良方	小品苧根湯 療損動胎腹痛去血胎動向下方	生乾地黃 苧根各二兩 當歸 芍藥 阿膠 甘草	各一兩	右細切以水六升煮取二升去滓內膠煎烱分溫三	服忌海藻蕪荑	救急療胎動去血腰腹痛方見前第四論中	妊娠小腹痛方論第十五凡一方	論曰妊娠小腹痛者由胞絡宿有風冷而妊娠血不通



婦人大全良方卷十二										欽定四庫全書		婦人大全良方		冷血相搏故痛甚亦令胎動也		療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下		當歸 川芎 各八分 阿膠 炙 人參 各六分 艾葉 四分 大棗		二十 茯苓 十分	



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷十三
四

詳校官太醫院恩禮_臣袁天錫

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允_臣王燕緒

校對官中書_臣葉蘭

謄錄監生_臣龔際美



欽定四庫全書	婦人大全良方卷十三	宋 陳自明 撰	妊娠數墮胎方論第一 凡五方	夫陽施陰化故得有胎榮衛調和則經養周足故胎得安則能成長若血氣虛損者子臟為風寒所苦則血氣不足故不能養胎所以數墮胎也其妊娠腰疼者喜墮胎也	欽定四庫全書 婦人大全良方	千金療妊娠二箇月數墮胎法灸膝下一寸七壯	又方	赤小豆為末酒調方寸匕日二服亦治妊娠數月	月水尚來	刪繁方療妊娠懷胎數落而不結實或冷或熱百病之	源	甘草 黃耆 人參 川芎 白朮 地黃 吳	茱萸 各等分○一方有當歸乾薑



右為末空心溫酒調二錢忌菰菜桃李雀肉醋物 心經	廣濟療婦人懷妊數傷胎方	鯉魚 二斤 粳米 一升	右二味如法作臠少着鹽勿着葱豉醋食之甚良一	月中須三遍作效安穩無忌集驗文仲備急崔氏延	年方同	經心錄紫石英圓主風冷在子宮有子常落或始為婦	欽定四庫全書 婦人大全良方	便患心痛乃成心疾月水都未曾來服之肥悅令人有	子方	紫石英 天門冬 去心 五味子 各三兩 烏頭 炮 卷栢	烏賊魚骨 雲母 燒研 禹餘糧 當歸 川椒 製如常	桑寄生 石楠葉 各一兩 澤瀉 杜仲 遠志 去心 蓰	蓉 桂心 甘草 石斛 人參 辛夷 栢子	仁 各二兩	右為末煉蜜為圓如梧桐子大溫酒下二十圓至三



四十圓 千金方同	療妊娠數墮胎皆因氣血虛損子臟風冷致胎不堅固頻有所傷宜服卷栢圓	卷栢 鍾乳粉 鹿角膠 炒 紫石英 飛 陽起石 飛	桑螵蛸 炒 禹餘糧 研 熟地黃 兩各一 桂心 川牛	膝 桑寄生 北五味 蛇床子 牡丹皮 杜	仲 川芎 當歸 各十分	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三四十圓空心溫	欽定四庫全書 婦人大全良方	酒吞下	妊娠胎不長養方論第二 凡五方	夫妊娠之人有宿病挾疾而後有娠或有娠時節適乖	理致生疾病並令臟腑衰損氣力虛羸令胎不長故須	服藥去其疾病益其氣血以扶養胎也	集驗治婦人懷胎不長方	鯉魚長一尺者去腸肚鱗以水漬沒內鹽及棗煑令	熟取汁稍稍飲之當胎所腹上當汗出如牛鼻狀雖



有所見胎雖不安者十餘日輒一作此令胎長大甚 平安									
古今錄驗療妊娠養胎白朮散									
白朮 川芎 各四分 川椒 炒出汗 牡蠣 煅二分									
右四味為細末酒調一錢七日三夜一但苦痛加芍 藥心下毒痛倍加川芎吐唾不能飲食加細辛一兩 半夏大者二十枚服之復更以漿水服之若嘔亦以 醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後其人若渴									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
者大麥粥服之病雖愈盡服之勿置裴伏 仲景方忌雀肉桃李									
療妊娠胎不長宜服安胎和氣思食利四肢黃耆散									
黃耆 白朮 陳皮 麥門冬 白茯苓 前胡									
人參 各三分 川芎 甘草 各半兩									
右呶咀每服三錢水一錢薑三片棗一枚煎至七分 去滓溫服									
療妊娠胎不長宜服養胎人參圓									
人參 白茯苓 當歸 柴胡 刺薊 厚朴									



桑寄生 各一兩 枳殼 三分 甘草 半兩	右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓食前溫水吞下	白朮圓調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷胎痿不長或失於將理傷動胎氣多致損墮娠孕常服益血保護胎臟	白朮 川芎 阿膠 炒 地黃 炒令六分焦 當歸 去尾炒各一兩	牡蠣 煨為粉二分 川椒 三分如常製	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為末煉蜜為圓如梧桐子大空心米飲吞三四十圓酒醋湯亦可	妊娠胎動安不得却須下方論第三 凡七方 妊娠得病	欲去子方附	夫妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損氣血枯竭既不能養胎致胎動而不堅固終不能安者則可下之免害妊婦也	療胎動安不得尚在腹母欲死須以牛膝湯下之



牛膝 去苗剉 半兩 水銀 二兩 朱砂 二兩 半研	右以水五大瓊煮牛膝可得一半去滓即以蜜和朱砂及水銀研如膏每服以牛膝汁一小瓊調下半匙頓服	桂心散 治妊娠母因疾病胎不能安可下之	桂心 瓜樓 牛膝 瞿麥 各二兩 當歸 一兩	右咬咀每服四錢水一瓊煎至七分空心去滓服	又方	欽定四庫全書 婦人大全良方	瞿麥 桂心 各一兩 牛膝 二兩 蟹爪 二合	右為細末空心溫酒調一錢服	又方	牛膝 一握 右細擣以無灰酒一大瓊煎取七分溫二服	又方	取七月七日法麴四兩水二大瓊煎取一瓊三分綿濾去滓分溫三服立下



小品療妊娠得病須去胎方

麥蘖一升為末和煑二升服之即下神効

文仲療妊娠得病欲去胎方

取雞子一枚以三指撮鹽置雞子中服之立出與阮

河南療產難同千金經心錄同

妊娠墮胎後血下不止方論第四
凡九方

夫墮胎後復損於經脉經脉既虛故下血不止也下血
多者便致煩悶乃至死矣

欽定四庫全書

婦人大全良方

治妊娠損動下血不止腹痛宜服此方

阿膠
炒一兩 艾葉
兩半

右以水一錢煎至六分去滓溫服空心

治妊娠損動下血不止

甘草
炙一兩 阿膠
炒二兩 雞子
一枚

右細剉以水二大錢煑甘草一錢三分去滓下雞子

及阿膠候膠消攪令停無時分溫三服

龍骨散 廣濟療因損娠下惡血不止



龍骨 當歸 地黄 各八分 艾葉 四分 地榆 阿膠	芍藥 乾薑 各六分 蒲黃 五分 牛角鰓 炙焦十分	右為細末食前粥飲調下二錢	治妊娠墮胎下血不盡苦煩滿欲極時發寒熱狂悶方	鹿角屑 一兩 熬	右以水一大瓊煎豉一合取汁六分分為三服調鹿	角屑二錢服日三服須臾血下古今錄驗同	千金療落胎下血不止方	欽定四庫全書 婦人大全良方	右以生地黄汁一小瓊調代赭末一錢日三服	治妊娠下血疼痛不止 亦治小 便不禁	右以家雞翎燒灰細研以溫酒調下二錢如人行五	里再服以効為度	千金療妊娠胎墮下血不止方	丹參一味 十二兩	右細切以酒五升煮取三升分三服	救急療損娠方



右取朱砂末一錢匕生雞子三顆取白和朱砂頓服 胎若死即出如未死即安	妊娠日月未足欲產方第五 凡四	集驗知母圓 治日月未足而痛如欲產者兼治產難	及子煩	知母一味為細末煉蜜圓如雞頭大溫酒嚼下日三服	千金崔氏小品同一方圓如梧桐子大粥飲下二十圓	槐子圓 治妊娠月數未足而似欲產腹痛者	欽定四庫全書 婦人大全良方	槐子 蒲黃 分等	右為末蜜圓如梧桐子大溫酒下二十圓以痛止為	度	又方 取蒲黃如棗核大篩過以井花水調服	又方	梁上塵 竈突煤	右二味為細末空心酒服方寸匕	斷產方論第六 凡七



論曰欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰生然亦有 臨產艱難或生育不已或不正之屬為尼為娼不欲受 孕而欲斷之者故錄驗方以備所用然其方頗衆然多 有用水銀蜜虫水蛭之類孕不復懷難免受病此方平 和而有異驗列具于後	小品方療婦人斷產驗方 千金翼外 聖祕要同	故蚕紙方圓一尺燒為末酒飲調服終身不復懷孕 也	欽定四庫全書 婦人大全良方	療妊娠欲去之并斷產方	栝樓 桂心 各二 兩 豉 一 升	右三味切以水四升煮取一升半分服之	又方 附子二枚為末以淳苦酒和塗右足去之大良	千金斷產方	油煎水銀一日方息空心服如棗大一圓永斷不損 人	廣濟落胎方



栝樓根四兩肉桂五兩牛膝三兩瞿麥一兩	右切以水七升煎二升三合去滓溫分三服服後如人行五里又進一服無忌	小品療羸人欲去胎	粉草 乾薑 人參 川芎 生薑 肉桂 蟹	爪 黃芩	右八味等分細切以水七升煮取二升分三服忌海	藻菰菜生葱	欽定四庫全書 婦人大全良方	千金欲去胎	大麴五升清酒一斗煮二沸去滓分五服隔宿勿食	旦再服其子如糜令母肥盛無疾苦千金不傳	妊娠咳嗽方論第七凡八方	夫肺感於寒寒傷於肺則成咳嗽也所以然者肺主氣而外合皮毛毛竅不密則寒邪乘虛而入故肺受之也五臟六腑俱受氣於肺以其時感於寒而為嗽也秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其諸藏



嗽不已則傳於腑妊娠病久不已者則傷胎也	欵冬花散 療妊娠心膈痰毒壅滯肺氣不順咳嗽頭	疼	欵冬花 麻黃 貝母 煨 前胡 桑白皮 紫苑	各半 旋覆花 白朮 甘草 各一 石膏 一兩	右呔咀每服四錢水一錢薑三片煎至七分去滓溫	服食後	桔梗散 治妊娠肺壅咳嗽喘急不食	欽定四庫全書 婦人大全良方	天門冬 去心 桑白皮 苦梗 紫蘇 各半 赤茯苓	一兩 麻黃 去節 貝母 人參 甘草 各半	右呔咀每服四錢水一錢薑三片煎至七分去滓不	拘時候服	馬兜鈴散 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急	馬兜鈴 苦梗 人參 甘草 貝母 各半 陳皮	去 大腹皮 紫蘇 桑白皮 各一 五味子 七文	右呔咀每服四錢水一錢薑三片煎至七分去滓無



時溫服	麻黃散 治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食	麻黃 陳皮 前胡 各一兩 半夏 人參 白朮	枳殼 貝母 甘草 各半兩	右呖咀每服四錢葱白五寸薑半分棗三箇水一盞煎至六分去滓溫服	百合散 治妊娠咳嗽心胃不利煩悶不食	川百合 紫苑 麥門冬 苦梗 桑白皮 各一兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	甘草 半兩	右呖咀每服四錢水一盞竹茹一分煎至六分去滓入蜜半匙更煎三兩沸不拘時溫服	紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎不安 八方出產科	甘草 杏仁 各一分 紫苑 一兩 桑白皮 一分 苦梗 三分 天門冬 一兩	冬 一兩	右呖咀每服三錢水一盞竹茹一塊煎至七分去滓入蜜半匙再煎二沸溫服



療妊娠咳嗽方

以車軋燒赤投酒中候冷飲之良

療妊娠傷寒涎多咳嗽

知母 杏仁 天門冬 桑白皮 等分

右咬咀每服三錢水一錢煎至七分去滓服

妊娠喘嗽不止宜服局方華蓋散穩重而有効

妊娠吐血衄方論第八
凡二方

論曰夫妊娠吐血者皆由臟腑所傷為憂思驚怒皆傷

欽定四庫全書

婦人大全良方

臟腑氣逆吐血吐血而心悶胃滿未欲止心悶甚者死

妊娠病此多墮胎也○局方必勝散有効

治吐血不止

馬勃用生布擦為末濃米飲調下
昌黎先生云牛溲馬勃敗鼓之皮俱

收並蓄待用無遺者醫師之良也

治鼻衄以白茅花濃煎汁服

亦可就第七卷吐血方中選用

妊娠子煩方論第九

凡十方

論曰妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六



欽定四庫全書									
婦人大全良方									
竹葉湯 治子煩									
月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子煩也產寶云夫妊娠而子煩者是肺臟虛而熱乘於心則令心煩也停痰積飲在心胃之間或衝於心亦令煩也若熱而煩者但熱而已若有痰飲而煩者嘔吐涎沫惡聞食氣煩躁不安也大抵妊娠之人既停痰積飲又虛熱相搏氣鬱不舒或煩躁或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂之子煩也									
防風 黃芩 麥門冬 白茯苓									
右咬咀每服四錢水一棧竹葉數片煎至七分去滓									
溫服忌酢物 外臺祕要有竹瀝三合無竹葉名竹瀝湯 指迷同一方無黃芩有知母									
又方 時時飲竹瀝隨多少									
竹茹湯 療妊娠煩燥或胎不安									
淡青竹刮茹 一兩									
右以水一大升煮取四合徐徐服盡為度									



麥門冬散 治妊娠心煩憤悶虛躁吐逆惡聞食氣頭眩四肢沉重百節疼痛多卧少起	麥門冬 子芩 赤茯苓 各一兩 柴胡 赤芍藥	陳皮 人參 苦梗 桑寄生 甘草 旋覆花	各半兩 生地黃 二兩	右為粗末每服四錢水一錢薑半分煎至六分去滓無時溫服	又方	欽定四庫全書 婦人大全良方	麥門冬 苧根 各二兩 黃芩 茯神 各一兩 甘草 炙一分	犀角屑 半兩	右呶咀每服四錢水一錢生地黃一分淡竹葉二柒片煎至六分去滓溫服	柴胡散 治妊娠心煩頭目昏重心胃煩悶不思飲食或嘔吐	柴胡 一兩 五錢 赤茯苓 麥門冬 各一兩 枇杷葉 去毛 人參	橘紅 甘草 各半兩



服 右呖咀每服四錢水一錢薑三片煎至七分去滓溫	人參散 治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁壅熱 口舌乾渴	人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家乾葛	黃芩 犀角屑 各三分 甘草 兩半 右呖咀每三錢水一錢煎至六分去滓溫服	治妊娠子煩口乾不得卧	欽定四庫全書 婦人大全良方	黃連 去鬚 右為細末每服一錢粥飲調下酒蒸黃連圓亦妙	治妊娠心煩熱不止	葱白 一握 二合 右以水二大錢煎取一錢半去滓溫分三服 一母圓 治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得 卧者巢氏謂之子煩也	知母 一兩 洗焙



右為細末以棗肉為圓如彈子大每服一圓細嚼煎 人參湯送下○次見醫者不識此證作虛煩治之損 動胎氣宜矣有識者亦見有藥也產科鄭宗文得於 陳藏器本草拾遺中也用之良驗									
方出產乳									
娠煩躁口乾方論第十									
凡四									
夫足太陰脾之經也其氣通於口手少陰心之經也其 氣通於舌若妊娠之人臟腑氣虛榮衛不理陰陽隔絕 熱氣乘於心脾津液枯少故令心煩而口乾也 愚考									
欽定四庫全書									
婦人大全良方									
此證與子煩大同小異其方亦可就子煩中通用一母 圓亦妙									
升麻散 治妊娠壅熱心神煩躁口乾渴逆									
川升麻 黃芩 人參 麥門冬 梔子仁 柴									
胡 茯神 瓜蒌根 犀角屑									
各一兩									
知母 甘草									
各半兩									
右咬咀每服四錢水一錢煎至六分去滓溫服									
知母散 治妊娠煩躁悶亂口乾及胎臟熱									



知母 麥門冬 甘草各半 黃耆 子芩 赤茯苓各三	右呖咀每服四錢水一琰煎至七分去滓入竹瀝一合更煎二沸溫服	葛根散 治婦人妊娠數月曾鬲煩躁唇口乾渴四肢壯熱少食	葛根不用 黃芩 人參 萎蕤 黃耆 麥門冬 野葛	甘草等分 呖咀	欽定四庫全書 婦人大全良方	右每服四錢水一琰竹茹一塊如錢大煎至七分去滓溫服無時	人參黃耆散 治妊娠身熱煩躁口乾食少	人參 黃耆 家葛根 秦艽 麥門冬各一 知母三 甘草半 赤茯苓一	右呖咀每服四錢水一琰薑三片淡竹葉二七片煎至六分去滓溫服	婦人大全良方卷十三



欽定四庫全書									
婦人大全良方卷十四									
宋 陳自明 撰									
妊娠中風方論第一									
論曰夫四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若 從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名為虛邪賊 害萬物人體虛則中之若風邪客於皮膚入於經絡即 頑痺不仁若入於筋脉挾寒則攣急喎僻挾溫則弛縱									
欽定四庫全書									
婦人大全良方									
若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛風邪 皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而為諸病也妊娠中風 若不早治則令墮胎也									
防風散 治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四 肢強急									
防風 桑寄生 葛根 各一兩 菊花 防己 北細									
辛 秦艽 當歸 桂心 茯神 甘草 羚羊									
角 各半兩									



右為粗末每服四錢水一盞薑三片煎至六分去滓	入竹瀝半合溫服	白朮酒 治妊娠中風口噤語言不得	白朮 一兩 獨活 一兩 黑豆 一合	右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分肆服口噤	者拗口灌之得汗即愈	治妊娠中風口眼不正手足頑痺	防風 羌活 防己 各一兩 麻黃 去節半兩 黃松木節 一兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	桂心 荊芥穗 羚羊角 屑 桑寄生 甘草 薏	苡仁 各半兩	右咬咀每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓	溫服	治妊娠因感外風如中風狀不省人	熟艾 三兩	右以米醋炒令極熱乘熱以絹帛裹熨臍下良久即	省陳總領 碑 云余女夫趙汝磐居天台親見王清叔



舍人療其嫂氏

妊娠風瘧方論第二

方 九 三

論曰夫妊娠體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒
 相搏發則口噤背強名之曰瘧 又云 其候胃悶不識人

須臾自醒良久復作謂之風瘧亦名子癰亦名子冒甚
 則反張

治妊娠中風角弓反張口噤語澀

麻黃

去節

防風

獨活

各一兩

羚羊角屑

桂心

升

欽定四庫全書

婦人大全良方

麻 酸棗仁

炒

甘草

秦艽

各半兩

川芎

當歸

杏仁

製各三分

右咬咀每服四錢水一錢薑四片煎至六分去滓入

竹瀝半合溫服

治妊娠中風腰背強直時復反張

防風 葛根

川芎

生乾地黄

各二兩

杏仁

製

麻

黃

去節各兩半

桂心

獨活

甘草

防己

各一兩

右咬咀每服四錢水一錢煎至七分去滓溫服



小品療妊娠忽悶眼不識人須臾醒醒復發亦有不醒	者名為瘧病亦名子癰亦名子胃葛根湯若有竹近可	速辦者當先作瀝汁次辦湯也其竹遠不可即辦者當	先辦湯此二療會得其一種其竹瀝偏療諸瘧絕起死	也非但偏療妊娠產婦絕死者有効小兒或癰瘡金瘡	發瘧療之亦驗○作竹瀝法 見第三卷第一論	葛根湯 療妊娠臨月因發風瘧忽悶憤不識人吐逆	眩倒小醒復發名為子癰	欽定四庫全書 婦人大全良方	葛根 貝母 去心 牡丹皮 去心 木防己 防風 當歸	川芎 白茯苓 桂心 熬 澤瀉 甘草 各二兩 獨	活 石膏 碎 人參 各三兩	右細切以水九升煮取三升分二服貝母令人易產	若未臨月者升麻代之忌海藻菰菜酢物 其詳見第三卷第二	論亦可選方詳而用之	妊娠腹內有鬼胎方論第三 凡三方	夫人臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之若榮



衛虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也	雄黃元 療姙娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛	雄黃研細鬼白去毛莽草 丹砂研細巴豆去皮獺肝炙	黃各半兩蜥蜴炙一枚蜈蚣一條炙	右為細末蜜元如梧桐子大空心溫酒下二元日兩	服後當利如不利加至三元初下清水次下虫如馬	尾狀無數病極者下蛇蟲或如段卵雞子或如白膏	欽定四庫全書 婦人大全良方	或如豆汁其病即除	療婦人鬼胎及血氣不可忍方	斑猫去頭翼足製延胡索炒各三枚	右為細末再研如麪以溫酒調下半錢以胎下為度	治婦人虛羸有鬼胎癥塊經候不通	芫花根三兩	右剉炒令黃色為細末每服一錢桃仁煎湯調下當	下惡物



妊娠傷寒方論第四 九二
十方

論曰夫冬時嚴寒人體虛為寒所傷即成病為傷寒輕者淅淅惡寒翕翕發熱微咳鼻塞數日乃止重者頭疼體痛先寒後熱久而不愈則傷胎凡妊娠傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可與尋常婦人一槩治之也
妊婦產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下宜加減四物湯

欽定四庫全書

婦人大全良方

當歸

川芎

白芍藥

熟乾地黄

一方用生
者各一兩

右㕮咀每服四錢水一錢半煎至八分取六分清汁熱服日四服以知為度○妊孕下血即入艾六七葉阿膠末一錢同煎病勢甚大散藥不及以四味各半兩細剉以水四錢煎至二錢半去滓分四服食前熱服一日之中令盡以知為度平常產乳服至三臈止如虛弱血臟不調至一月止○因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲飲水者加栝樓根一兩麥門冬三分○



腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥各一分○血崩加	地黃蒲黃各一兩○因熱生風加川芎一分柴胡半	兩○身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩○大	便秘結加大黃半兩桃仁一分炒○如大便滑洩加	桂心熟附子各一分發寒熱加乾薑牡丹皮芍藥各	一分○嘔者加白朮人參各半兩○腹脹加厚朴枳	實各一分○虛煩不得眠加竹葉人參各一分○煩	躁大渴加知母石膏各半兩○水停心下微吐逆加	欽定四庫全書 婦人大全良方	猪苓茯苓防己各一分○虛寒狀類傷寒加人參柴胡	防風各三分	妊婦傷寒瘟疫時氣先服此以安胎宜阿膠湯却以治	病藥相間服	阿膠 白朮 桑寄生 人參 白茯苓	右等分為細末煮糯米飲調服方寸匕日三服	妊婦傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯	葱白 生薑



右細切以水二錢煮取一錢連服取汗愈	妊婦傷寒頭痛壯熱肢節煩疼宜前胡湯 出廣濟方	石膏 一錢二分 前胡 六分 甜竹茹 三分外 黃芩 大青 五分	知母 梔子仁 各四分	右呔咀每服五錢水一錢半葱白三寸煎至八分去	滓溫服集驗文仲備急救急同	妊婦傷寒或中時行洒淅作寒振慄而悸或加噦者宜蘇	木湯	欽定四庫全書 婦人大全良方	赤芍藥 橘紅 黃芩 黃連 甘草 蘇木 等分	右呔咀每服五錢水一錢煎至六分去滓溫服汗出	瘥若胎不安兼服阿膠湯 前方見	妊婦寒熱頭疼嘿嘿不欲食脇下痛嘔逆痰氣及產後	傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復	餘熱不解宜黃龍湯	柴胡 去節一兩 黃芩 人參 甘草 各一分半	右呔咀每服五錢水一錢半煎至一中錢去滓溫服



妊婦傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢疼痛項背拘急口 乾燥宜柴胡石膏湯	柴胡 四兩 甘草 二兩 石膏 八兩	右呖咀每服二錢水一錢薑五片煎至六分去滓溫 服若氣虛體冷加人參四兩	妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹上氣渴不止飲 食不多腰疼體重宜枳實散	枳實 一兩 炒 陳皮 三兩 麥門冬 半兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末每服三錢水一中錢生薑半分葱白七寸 煎至六分去滓溫服	妊婦傷寒頭目旋疼壯熱心躁宜旋覆花湯	旋覆花 赤芍藥 甘草 各半兩 前胡 石膏 各一兩	白朮 人參 麻黃 去根節 黃芩 各三分	右呖咀每服四錢水一錢半薑半分煎至六分去滓 溫服	麥門冬湯 治妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎



氣不安															
人參		石膏		各一兩		前胡		黃芩		各三分		家葛根		麥	
門冬		各半兩													
右呖咀每服五錢水一瓊半生薑四片棗二箇淡竹															
茹一分煎至八分去滓溫服															
妊婦發癰變為黑色尿血宜梔子大青湯															
升麻		梔子仁		各二兩		大青		杏仁		黃芩		各一兩半			
右呖咀每服五錢水一瓊半葱白三寸煎至一瓊去															
欽定四庫全書															
婦人大全良方															
滓溫服															
芍藥湯 治妊娠傷寒五箇月已前嘗用此方															
出傷寒括要															
黃芩		當歸		芍藥		各四錢		川芎		一兩六錢		白朮		八錢	
右為細末溫酒調服方寸匕日二服產後百病悉皆															
主之常服則易產無病苦															
王子亨為產後常服之藥															
當歸茯苓散 治婦人傷寒腹中隱痛															
當歸		茯苓		白朮		各二兩		白芍藥		半斤		澤瀉		川芎	
各四兩															



右為細末酒服方寸匕日三	白朮散 治妊婦傷寒煩熱頭痛胎氣不安或時吐逆	不下食	白朮 橘紅 麥門冬 人參 前胡 赤茯苓	川芎 各一兩 甘草 半夏 各半兩	右咬咀每服四錢水一中錢薑四片淡竹茹一分煎	至六分去滓無時溫服	柴胡散 治妊婦熱病骨節煩痛頭疼壯熱若不治熱	欽定四庫全書 婦人大全良方	不止則損胎	柴胡 家葛根 知母 梔子仁 甘草 各半兩 石	膏 一兩 大青 黃芩 升麻 各三分	右咬咀每服四錢水一錢葱白三寸煎至六分去滓	無時熱服	麻黃散 治妊娠五六箇月傷寒頭疼壯熱四肢煩疼	麻黃 桂心 柴胡 赤芍藥 各一兩 甘草 半兩	右咬咀每服三錢水一錢薑三片煎至六分去滓無



時溫服	升麻散 治妊娠傷寒頭痛身體壯熱	川升麻 蒼朮 ^炒 麥門冬 麻黃 ^{各一兩} 黃芩 大	青 ^{各半兩} 石膏 ^{二兩}	右咬咀每服四錢水一錢薑半分淡竹葉二七片煎至六分去滓無時溫服	治孕婦傷寒	柴胡 前胡 川芎 當歸 人參 芍藥 粉	欽定四庫全書 婦人大全良方	草 生地黄 ^{等分}	右為細末每服二錢薑三片棗四箇煎至七分去滓溫服要出汗加葱	良方白朮散 治妊婦傷寒	白朮 黃芩 ^{各等分新瓦上炒令香}	右為散每服三錢水一中錢薑三片棗一枚煎至七分溫服但覺頭痛發熱便可喫二三服即瘥唯四肢厥冷陰證者未可服此方本常州一士人賣此藥醫



皆論斤售去行醫用之如神無人得此方予自得此	治疾無有不効者仍安胎益母子	治妊婦傷寒頭疼腹痛	升麻 黃芩 各六分 家乾葛 大青 石膏 甘草	各三 苦竹葉 一握並 分 細判	右用水一升半先煮苦竹葉乾葛減一半入諸藥再	煮至六合去滓溫服	妊娠時氣方論第五 凡三方	欽定四庫全書 婦人大全良方	論曰夫四時之間忽有非節之氣如春應暖而反寒夏	應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反暖非其節而	有其氣而一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似者	多挾於表毒也言其時普行此氣故云此時氣也妊娠	遇之重者致傷胎也	秦艽散 治妊婦時氣五六日不得汗口乾多喫冷水	狂語嘔逆	秦艽 柴胡 各一兩 石膏 二兩 赤茯苓 前胡 甘草



犀角屑 家葛根 川升麻 黃芩 各半兩	右咬咀每服四錢水一錢薑半分淡竹茹一分煎至	六分去滓無時溫服	葛根飲子 治妊婦時氣煩熱口乾頭痛	家乾葛 麻黃 去節根各半兩 石膏 一兩 豉 一合 白米 半合 梔子	仁 二七枚 葱白 二莖連根	右細切以水二大瓊煎至一瓊三分去滓無時分溫	三服汗出為効	欽定四庫全書 婦人大全良方	消熱飲子 治妊婦時氣六七日熱甚大小便不利最	宜服之	川芒硝 一兩細研 葵子 三兩搗	右如前煎服以利為効	敗毒散	升麻葛根湯皆可用 凡用葛根宜用家葛曬乾用野葛能動胎氣養生必用方	言之甚詳	妊婦熱病方論第六 凡五方



論曰夫冬時嚴寒觸胃傷之藏於肌骨夏至乃發壯熱	又為暑病即熱病也此寒氣蘊積發即為病若妊娠遇	之多致墮胎也	經云熱病與中暑相似但熱病者脉盛中暑者脉虛	治妊娠熱病壯熱頭痛嘔吐不止不食心胃煩悶	人參 一方 竹茹 家葛根 各一 蘆根 二 麥門冬 去心	一兩 知母 三	右呖咀每服四錢水一瓊連根葱白三寸煎至七分	欽定四庫全書 婦人大全良方	去滓溫服	梔子仁飲子 治妊娠熱病癰出黑色小便如血氣急	欲絕胎欲落	梔子仁 升麻 石膏 乾地黄 各二 黃芩 大	青 各一	右呖咀每服半兩葱白七寸豉四十九粒水一盞煎	至五分去滓無時溫服救急有杏仁無地黃石膏	大黃飲子 治妊娠熱病六七日熱入腹中大小便秘澀煩熱



川大黃微炒 石膏各一兩 知母 前胡 赤茯苓各三分	梔子仁 甘草 黃芩各半兩	右咬咀每服半兩水一大瓊生地黃一分煎至六分	去滓無時溫服	又方	以伏龍肝細研無時水調下一錢亦可調為泥塗臍下	又方	以家葛根煮汁無時服一小瓊	欽定四庫全書 婦人大全良方	妊娠傷寒熱病防損胎方論第七凡七方	論曰非節之氣傷於妊婦熱毒之氣侵損胞胎遂有墮	胎漏血俱害子母之命也	治妊娠傷寒骨節疼痛壯熱不急治則胎落	葱白切一升 前胡 家葛根 石膏各一錢 青黛六分	麻八分 梔子仁一錢二分	右咬咀以水七升煮取二升半去滓分溫三服	治妊娠時氣頭痛腰背強壯熱



升麻 青黛 前胡 梔子仁 黃芩 石膏 八分 家葛根 兩三	右呖咀以水五升煎取二升半去滓分為三服	治妊婦六七箇月傷寒熱入腹大小便秘結不通蒸熱	前胡 錢一 大黃 石膏 錢各二 梔子仁 十枚 知母 黃芩	茯苓 生薑 各八分	右水八升煎取二升半後下大黃更煎三五沸分作	三服	欽定四庫全書 婦人大全良方	治妊婦傷寒苦熱不止身上班出忽赤忽黑小便如血	氣欲絕胎欲落	梔子仁 升麻 各四兩 青黛 兩二 石膏 兩八 葱白 升切一 黃	芩 兩三 生地黃 錢二	右呖咀以水九升煎取三升去滓作三服忌熱物	治妊婦時氣身大熱令子不落護胎方	伏龍肝 研令極細	右水調塗臍下二寸乾則易差即止泔清亦可



又方	井中泥塗心下乾則易 二方出本事再錄有效	又方	浮萍 川朴硝 蛤粉 藍根 等分 大黃 微炒	右為末水調傅臍上安胎解煩熱極妙	妊娠熱病胎死腹中方論第八 郭稽中九四方	論曰熱病胎死腹中者何荅曰因母患熱病至六七日以後臟腑極熱熏煑其胎是以致死緣兒死身冷不能	欽定四庫全書 婦人大全良方	自出但服黑神散暖其胎須臾胎即自出何以知其胎之已死但看產母舌青者是其候也	黑神散 又名烏金散 靈苑方名肉桂散	桂心 當歸 芍藥 甘草 炙 乾薑 炮 生乾地黃 各一兩 黑豆二兩 炒去皮 附子 炮去皮 臍半兩	右為細末每服二錢空心溫酒調下 一方無附子有地黃	陳無擇評曰夫妊娠謂之重身二命係焉將理失宜皆能損胎不特病熏煑所致或因頓仆驚恐出入觸胃及



素 有 癥 瘕 積 聚 壞 胎 最 多 其 候 舌 青 即 知 子 死 養 胎 論		曰 面 青 舌 赤 母 死 子 生 唇 青 吐 沫 子 母 俱 斃 又 有 雙 懷		二 胎 或 一 死 一 活 其 候 尤 難 知 自 非 臨 岐 觀 變 未 易 預		述 不 可 不 備 學 也 然 以 黑 神 散 溫 胎 未 若 補 助 產 母 使		其 氣 正 免 致 虛 乏 困 頓 胎 自 下 矣 催 生 湯 殊 勝 黑 神 散		催 生 湯 治 胎 死 腹 中 或 產 母 氣 乏 委 頓 產 道 乾 澀		蒼 米 炒 二 兩 苦 梗 兩 陳 皮 錢 六 白 芷 桂 心 甘 草		各 三 錢 川 芎 一 錢 五 分 川 烏 當 歸 乾 薑 炮 厚 朴 製 芍		欽 定 四 庫 全 書 婦 人 大 全 良 方		藥 茯 苓 半 夏 湯 附 子 炮 去 南 星 炮 各 二 錢 枳 殼 錢 四		製 木 香 錢 一 杏 仁 去 皮 炒 阿 膠 炒 各 一 分		右 為 細 末 每 服 一 大 錢 溫 酒 調 下 覺 熱 悶 加 白 蜜 新		汲 水 調 服 只 是 五 積 散 無 麻 黃 有 川 烏 附 子 南 星 阿		膠 木 香 杏 仁 六 味		鹿 角 散 治 妊 娠 熱 病 胎 死 腹 中 下 之		鹿 角 屑 兩 一		右 以 水 一 錢 葱 白 五 莖 豉 半 合 煎 至 六 分 去 滓 溫 服	



良効

又方取死胎

烏雞一隻
去毛

右細剉以水三升煮取二升去雞通手用衣帛蘸摩

臍下胎自出

妊娠瘧疾方論第九九四
方

論曰夫妊娠病瘧者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞
動血氣腠理虛而風邪乘之動前暑熱陰陽交爭陽盛

欽定四庫全書

婦人大全良方

則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱歇若邪動氣至交爭
則發故瘧休作有時其發寒時節漸晏者此由風邪客
於風府循脊而下衛氣至一日一夜常大會於風府故
發日晏其發日早者衛氣之行風府日下一節二十一
日下至尾骶二十二日入脊內上注於伏衛之脉其行
九日出缺盆之內其氣既止故發更早其間日發者由
風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能
日作故間日搐積乃發也妊娠而發則寒熱之氣相迫



傷於胎故多損動也	治妊娠瘧疾不差 出集驗方千金救急古今錄驗同	常山 石膏 各一兩 甘草 炙 黃芩 各半兩 烏梅 十四箇炒	右細切以酒水各一大琖相和浸一宿平旦煎至一	琖去滓分二服	千金療妊娠患瘧方	恒山 竹葉 各三兩 石膏 八兩碎 糯米 百粒	右切以水六升煮取二升半去滓分三服第一服未	欽定四庫全書 婦人大全良方	發前一食久服之第二服取臨欲發時服餘一服用	塗頭額及胷前五心藥滓置頭邊當發一日勿進水	及飲食發過後乃進粥飲忌生葱菜 集驗文仲備急同	治妊婦患瘧寒熱頭疼心煩	黃芩 麥門冬 去心各一兩 石膏 二兩 甘草 半兩 烏梅 十四箇	右呖咀每服四錢水一琖煎至陸分去滓溫服	七寶散 治男子婦人一切瘧疾或先寒後熱或先熱	後寒或寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩



三發或連日或間日發或三四日一發不問鬼瘧食瘧
不伏水土山嵐瘴氣似瘧者並皆治之

常山 厚朴薑製 青皮 陳皮並不白 甘草 檳榔

草薢去皮

右等分咬咀每服半兩於未發隔夜用水一碗酒一
錢煎至一大錢濾出露一宿却將滓再用酒水更依
前煎一次去滓別以碗盛貯亦露一宿來日當發之
早盪溫面東先服頭藥少歇再服藥滓大有神効

楊出

欽定四庫全書

婦人大全良方

氏家藏

○僕嘗治一姪婦六七箇月而沾瘧疾先寒後
熱六脉浮緊衆醫用柴胡桂枝無効僕言此疾非常
山不愈衆醫不肯因循數日病甚無計黽勉聽僕治
之遂用七寶散一服愈黃帝問曰婦人重身毒之奈
何岐伯曰有故無殞帝曰願聞其故何謂也岐伯曰
大積大聚其可犯也衰其大半而止豈不以審藥之
性味明治療之方處以中庸與疾適好於半而止之
勿過而餘則何疑於攻治哉



妊娠霍亂方論第十方九四

此方論專治妊婦霍亂然亦可就第七卷第二論選方通用也故不繁引

論曰夫陰陽清濁相干謂之氣亂於腸胃則為霍亂也但飲食過度觸胃風冷使陰陽不和致清濁相干腸胃虛者受之故霍亂也熱亂者先吐或心腹痛則吐痢並發有頭痛體疼發熱而吐痢者亦為霍亂所以然者挾風而有實故也風折於氣皮膚緻密故血氣不得宣通故令壯熱風邪乘其經脉氣上衝頭則頭痛風氣入於腸胃則洩痢胃逆則嘔逆故為吐痢也吐痢甚者則多煩臟腑虛故也又手逆冷陽氣暴竭謂之四逆也妊娠之病吐痢甚者則傷胎也

人參散 治妊婦霍亂吐瀉心煩腹痛

人參去蘆 厚朴薑製 橘紅各一兩 當歸炒 乾薑炮 甘草炙各

半兩

右為散每服四錢水一椀棗三箇煎至六分無時溫

服

欽定四庫全書

婦人大全良方



白朮散 治妊娠霍亂腹痛吐逆不止	白朮 炒 益智仁 枳殼 製 橘紅 各三 草豆寇 煨去	良薑 炒各半兩	木瓜煎 治妊娠霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕	吳茱萸 湯泡七次 生薑 切各一分 木瓜 切一兩半	一方有茴香一分甘草一錢茱萸半兩加紫蘇煎	右細剉水二瓊煎一瓊二分去滓分三服無時熱服	一方止渴飲 治妊婦霍亂吐瀉心煩悶亂作渴	欽定四庫全書 婦人大全良方	右用糯米一合泡令淨細研以水一大瓊研濾取汁	入蜜一合生薑汁半合相和渴即頓服立止○縮脾	飲亦妙	五苓散 局方 訶子散 理中元 局方 胡椒湯 香薷散 夏月預宜	合此以防霍亂若有是證以此藥療之其效神速但要極冷服一方有黃連無扁豆 已上五方並	見第七卷第二論	縮脾飲方解伏熱除煩渴消暑毒止吐痢霍亂之後服	熱藥太多致煩躁者宜沈令冰冷頓服



婦人大全良方卷十四										欽定四庫全書		婦人大全良方		草薺仁 四兩 烏梅肉 三兩 甘草 二兩半		右咬咀每服半兩水一椀生薑十片煎至八分侵以熟水溫冷任意	



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷十五
六五

撰校官太醫院恩種_臣袁天錫

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允_臣王燕緒

校對官中書_臣葉蘭

謄錄監生_臣龔際美

謄錄監生_臣鄧培善



欽定四庫全書

婦人大全良方卷十五

宋 陳自明 撰

妊娠泄瀉方論第一

方 凡三

論曰凡妊娠泄瀉冷熱不同水瀉青白或黃白或水穀
不化腹痛腸鳴其脉弱而緊此內傷冷也謂之洞泄寒
中若泄注如水深黃色及有完穀小便赤腹脇脹滿煩
躁喜飲時時嘔逆或下利清水或小便不利得熱則極

欽定四庫全書

婦人大全良方

脉虛大而數由乘虛熱入於胃湊滲下焦津液不分併
於大腸謂之協熱利先以五苓散利小便次以黃連阿
膠元或三黃熟艾湯凡泄瀉色黃而有沫腸鳴腹脹滿
微痛其脉沉緊而小數謂之冷熱不調宜戊己元和之
凡暴下或青或白水穀或化或不化腹脇或脹或不脹
或痛或不痛但觸生熱氣全不思食其脉內虛外實右
關脉沉緊者謂之飧泄先去沉積宜感應元後調和之
凡治瀉先須理中焦如理中湯元是也次即分利水穀



如五苓散是也治中不效然後斷下即用禹餘糧赤石脂是也 亦可就第八卷第八論選方通用	厚朴元 治妊娠洞泄寒中	乾薑 厚朴 去粗皮 細剉	右等分先杵令爛水拌同炒令乾再為末水煮麪糊為圓如梧桐子大每服五十圓食前米飲下	草薺散 治妊娠藏氣本虛宿挾風冷脾胃久弱藏府	虛滑臍腹疔痛日夜無度	欽定四庫全書 婦人大全良方	厚朴 去粗皮薑汁浸炒黃二兩 肉豆蔻 一箇 草豆蔻 一箇	右咬咀每服三錢水一椀薑三片煎至七分去滓熱服	服	三黃熟艾湯 方見第八卷第十論	理中元 理中湯 五苓散 黃連阿膠元 戊巳元	感應元 已上並見和劑局方	妊娠下痢赤白及黃水方論第二 凡十五方	論曰夫妊娠之人胞血既閉臟氣不理脾胃易傷或恣



右用水七升煎取二升溫分三服忌如前	乾薑四兩赤石脂六兩粳米一升 炒黃	療妊娠白膿痢腹中冷	右用水七升煎取二升溫分三服忌生冷肥膩	是黃藥皮各 三兩並細切	阿膠炙二兩地榆 酸石榴皮三兩薤白切一升黃連一方	療妊娠患痢膿血狀如魚腦髓小腹絞痛難忍	腸虛相化故成血痢也	欽定四庫全書 婦人大全良方	臟腑常無滯積若觸胃勞動生熱熱乘血散滲入大腸 熱乘血入於大腸為血痢也血之隨氣外行經絡內通 如白膿涕而有赤脉如魚腦此名魚腦痢又有血痢者 止名為滯痢也其狀白膿如涕而有血雜亦有血少者 則赤冷氣乘之則白冷熱相交則赤白相雜而運滯水 由皆因冷熱不調大腸虛冷熱氣客於腸間熱氣乘之 攪刺疼痛膿血赤白雜下古書所謂滯下是也原疾之 食腥肥生冷脾胃停滯不能剋化冷熱相搏致令心腹



療妊娠腹痛下痢赤白不可忍	黃連 一方是 石榴皮 當歸 各三 阿膠 炙二 熟艾
半一兩	右用水六升煮取二升溫分三服忌如前
療妊娠腹痛下痢膿血不止	黃連 八分 厚朴 製 阿膠 炙 當歸 各六 艾葉 黃蘗 各四
分乾薑 五分	右為細末空心米飲調下方寸匕日三服
欽定四庫全書	婦人大全良方
療妊娠臍下刺痛大便白晝夜三五十行	根黃 厚者蜜 大蒜 煨令熟
右以根黃為末研蒜作膏為元如梧桐子大空心粥	飲下三十元日三服妙
一方不用根黃用當歸以芍藥煎湯吞下	療妊娠痢黃水不絕
厚朴 薑汁炙 黃連 二 肉豆蔻 五箇	右用水二升煮取一升頓服忌如前 已上六方並出產寶



文仲療妊娠下痢不止方	黃蘗 乾薑 赤石脂 各二兩 酸石榴皮 一枚	右細切以水八升煮取二升分三服	古今錄驗療妊娠下痢方	酸榴皮 黃芩 人參 檳皮 各四兩 粳米 三合	右細切以水七升煮取二升分三服	療妊娠挾熱下痢冷熱不調千金翼同	黃連 一升 黃蘗 一升 梔子仁 二十枚	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為末每服五錢水二錢浸三時久煮十沸頓服嘔者加橘皮一兩生薑二兩亦治丈夫常痢	一方治中暑挾熱下痢無梔子仁用薑錢羊脂煎服	肘後方療妊娠下痢赤白如魚腦腹中絞痛	阿膠 炒 黃蘗 地榆 當歸 各一兩 川芎 酸榴皮	各三分	右為細末葱白粥飲調二錢	療妊娠下痢腹痛不食



薤白合切一 當歸炒 地榆各一兩 甘草半兩 糯米合一	右為散以水七升煮取二升去滓溫分三服	療妊娠下痢腹痛小便澀	糯米合一 當歸炒 黃耆各一兩	右細切和停以水二瓊煮取一瓊二分去滓溫分四服	服	治妊娠臨產下痢	右梔子不以多少燒存性為細末每服一大錢空心	欽定四庫全書 婦人大全良方	熟水調服甚者連進四五服即止	治妊娠藏府氣素弱頻併下利時時腹痛漸覺羸瘦面	色痿黃不美飲食	厚朴半一兩 白朮 川芎 白芍藥 當歸炒 熟地	黃各一兩 乾薑 人參各五錢 訶子三分 甘草一分	右呔咀每服四錢水一瓊棗三枚煎至六分溫服	療妊娠下痢赤白絞刺疼痛出三方	烏雞子一枚就頭上開一穴 黃丹一錢 內打令均以厚



紙裏黃泥固濟 煨取乾為細末		右每服二錢米飲調下一服愈者是男兩服愈者是女	妊娠大小便不通方論第三 方 凡十		論曰夫妊娠大小便不通者由藏府氣實而生於熱熱者隨停之處則成病也若熱結於大腸則大便不通結於小腸則小便不通若大小腸俱為熱所結故煩滿而大小便皆不通也	欽定四庫全書 婦人大全良方		小品療妊娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差宜服甘遂散下之	太山赤皮甘遂 二兩	右一味為末以白蜜二合和服如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服下之後還將猪苓散不得下日兩服漸加至五分以微利為度經心錄同	猪苓散 療妊娠小便澀痛兼療胎水	猪苓 五兩 去皮



欽定四庫全書		婦人大全良方	
右研每服三錢水一瓊煎至六分去滓溫服		葵子 一合 川朴 硝 二兩	
治妊娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩		又方	
熱		葵子 二升 滑石 四兩 碎	
右為末白湯調方寸匕加至二匕日三夜二不差宜		不利安胎除熱葵子湯	
轉下之服前藥		古今錄驗療妊娠得病六七日以上身熱入藏大小便	
右為粗末每服三錢水一瓊煎至六分溫服		治妊娠大小便不通熱閉心膈腹脇妨悶妨害飲食	
北五味 各一兩 桑寄生 甘草 苦梗 各半兩		大黃 木通 檳榔 各一兩 枳殼 三分 大腹子 三枚 訶梨	
檳榔 赤茯苓 大腹皮 木通 郁李仁 去皮尖			



勒四箇去核 半生半煨	右為末以童便一錢葱白二寸同煎至六分調下二錢	當歸散 治胎前諸疾或因怒中氣充子藏或充腠脉腹急肚脹腰腹時疼不思飲食四肢浮腫氣急時喘大便忽難小便忽澀產門忽腫	當歸一兩 赤茯苓 枳殼 白芍藥 川芎各二兩 川	白薑炮 木香炮 粉草各五錢	欽定四庫全書 婦人大全良方	右呔咀每服三大錢水一錢半薑三片煎至八分去滓無時溫服如稟受氣弱及南人枳殼減半如氣實及北人於內加分兩服之或連日大便秘澀加蜜同煎	初虞世治妊娠大便秘澀方	枳殼三兩 防風二兩 甘草炙一兩	右為細末沸湯點服一二錢空心日三	又治虛羸大便秘方



枳殼製 阿膠炒等	右為細末煉蜜和劑杵二三千下元如梧子大別研滑石末為衣溫水下二十元半日來未通再服三十元止於五十元	又方	車前子一大黃 兩 炒 五錢	右為細末每服三錢空心蜜湯調下	妊娠小便不通方論第四 凡八方	欽定四庫全書 婦人大全良方	論曰夫妊娠小便不通者由小腸有熱熱入於脬內熱結甚者故令小便不通也若小便不通則心脇小腹氣澁而喘急也陳無擇云凡妊娠胎滿逼脬多致小便不利者或心腎氣不足不能使脬冷清濁相干為諸淋病或胞系了戾小便不通名曰轉胞又胎滿尿出不知時名曰遺尿治之各有方	古今錄驗療妊娠卒不得小便	杏仁二十箇去皮尖熬令變色



右一味搗元如大豆燈心煎湯吞七粒立得利	又方 以滑石末水和泥臍下	又方 用車前草汁調滑石末塗臍四畔方四寸熱即	易之	治妊娠卒然小便不利方	滑石末 杏仁 等分	右先搗杏仁令爛次入滑石末以軟飯搗和為元如	小豆大每服二十元白湯送下	欽定四庫全書 婦人大全良方	治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂	葵子 研 榆白皮 切各一兩 葱白 七莖	右以水二大瓊煎取一瓊三分去滓分三服	又方 用紫苑去苗為末井花水調下二錢 一方用紫草	苦參元 治妊娠小便難飲食如故	當歸 貝母 去心炒 苦參 各三兩 滑石 半兩	右為末蜜元如小豆大以米飲下二十元不拘時	葵子散 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水



腫者王子亨云妊娠小便不通特避寒藥又名茯苓湯 千金翼 要同	葵子五兩 赤茯苓三兩	右二味為末每服二錢米飲調下小水利即愈	一方無茯苓有榆白皮一兩	八味元 治婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息	以脬系了戾不得溺故致此病名轉脬但利小便則愈	以此藥有茯苓故也此藥雖局中有賣除非自合方有效	欽定四庫全書 婦人大全良方	熟地黄八兩 山藥去核各四兩 附子炮 桂心各二兩	牡丹皮去心 茯苓去皮 澤瀉各三兩	右為末蜜元如梧子大每服三十元空心溫酒下	妊娠子淋方論第五凡五方	論曰夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數也膀胱熱則小便行澀而數不宣妊娠之人胞繫於腎腎間虛熱而成淋疾甚者心煩悶亂故謂之子淋也	小品療妊娠患子淋宜下地膚大黃湯



川大黃 地膚草 各三兩 知母 黃芩 猪苓 赤	芍藥 通草 川升麻 枳實 甘草 各二兩	右呔咀每服四錢水一錢煎至七分去滓溫服	經心錄療妊娠患子淋小便數出少或熱疼痛及足煩	地膚草 三兩	右細切水四升煮取二升半去滓分三服日三服文	仲小品同	療妊娠患淋小便澁不利小腹水道熱痛	欽定四庫全書 婦人大全良方	冬葵子 一升 芍藥 二兩 黃芩 赤茯苓 車前子 各三兩	右呔咀以水七升煎至二升溫分三服	療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思食	瞿麥穗 赤茯苓 桑白皮 木通 葵子 各一兩	黃芩 芍藥 枳殼 車前子 各五錢	右為粗末每服四錢水一錢煎至六分溫服	療妊娠子淋小便澁痛	冬葵子 滑石 木通 各等分



右為末每服四錢水一錢葱白七寸煎至六分去滓服	猪苓散 療姙娠子淋小便澀痛子母祕錄療姙娠胎	水	方見本卷第三論	姙娠遺尿方論第六 凡三方	療姙娠尿不知出時胎滿故也宜服白薇散	白薇 芍藥 各一兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末溫酒調二錢	又方	白礬 牡蠣 等分	右為細末溫酒調二錢 亦可治男子	又方 用鷄毛灰末之酒調方寸匕 亦見第八卷第四論	姙娠尿血方論第七 凡五方	論姙娠尿血者由勞傷經絡有熱在內熱乘於血血得熱則流溢滲入脬故令尿血也



千金療妊娠卒下血及子淋方 三方並出外臺	葵子 研一升	右以水五升煮取二升分溫三服	又方	生艾葉 一斤研冬用莖乾者亦得	右以酒五升煮二升分三服	又方	生地黄 切一升	欽定四庫全書 婦人大全良方	右以酒四升煮取二升溫分三服亦療落身後血	續斷湯 治妊娠下血及尿血	當歸 生地黄 各一兩 續斷 錢五 赤芍藥 分一	右為末空心葱白煎湯調下二錢	療妊娠尿血	阿膠 熟地黄	右各等分為細末空心粥飲調二錢	妊娠胎水腫滿方論第八 凡十一方



產寶論曰夫妊娠腫滿由藏氣本弱因產重虛土不尅
水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便祕澀
陳無擇云凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜脚腫俗呼為
皺脚亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水

論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩
若中風寒邪氣及有所觸犯則隨邪而生病也凡妊娠
經血壅閉以養胎若忽然虛腫乃胎中挾水水血相搏
脾胃惡濕主身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛水氣流溢

欽定四庫全書

婦人大全良方

故令身腫滿也然其由有自或因泄瀉下痢藏府虛滑
耗損脾胃或因寒熱瘧疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆
能使頭面或手足浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎
多損壞及其臨產日脚微腫乃胞藏水少血多水出於
外故現微腫則易生也宿有寒氣因寒冷所觸故能令
腹脹腫滿也

產乳集養子論

妊娠自三月成胎之後兩足自脚面漸腫腿膝以來行



步艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水出者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素有風氣或衝任經有血風未可妄投湯藥亦恐大段甚者慮將產之際費力有不測之憂故不可不治於未產之前也古方論中少有言者按名醫錄云宋少主元徽與徐文伯微行學鍼法文伯見一娠婦足腫不能行少主脉之此女形也文伯診之曰此男胎也在左則胎黑色少主怒欲破之文伯惻然曰臣請鍼之胎遂墮男形而色		欽定四庫全書	婦人大全良方	黑此妊娠足腫之說見於古者今巢氏病源中但有子煩之論千金并產寶方亦畧言之劉禹錫續傳廣信方以謂妊婦有水氣而成胎太平聖惠亦言之皆非也元豐中淮南陳景初名醫也獨有方論治此病方名初謂之香附散李伯時易名曰天仙藤散也	天仙藤散方	天仙藤 洗畧 香附子 炒 陳皮 甘草 烏藥 不須要天	台者但得軟白 香而辣者良



右等分淨秤為細末每服三錢水一大瓊薑三片木	瓜三片紫蘇三葉同煎至七分放溫澄清空心食前	服日三服小便利氣脉通體輕腫漸消更不須多服	元豐末王荆公居金陵墨家病以詩贈景初曰墨族 貧兼病煩君藥石功到家何所寄一一問征鴻因此 見方得於李伯時家傳	方錄于臨川張右丞宅	產寶療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少	茯苓四兩杏仁各三兩檳榔各三兩旋覆花各一兩郁李仁各一兩	右為粗末以水六升煮取二升去滓分溫三服小便	欽定四庫全書 婦人大全良方	通即差	崔氏療妊娠體腫有水氣心腹急滿	茯苓各四兩白朮各四兩旋覆花二兩杏仁各三兩黃芩各三兩	右細切以水七升煮取二升半分溫三服忌桃李雀	肉鮓物千金救急古今錄驗集驗同	療妊娠遍身洪腫	葶藶子一錢白朮二錢茯苓二兩桑白皮二兩郁李仁八分	右為粗末以水六升煮取二升分溫三服小便利即



差	又方	澤瀉 葶藶 各三兩 茯苓 枳殼 白朮 各六兩	右細切以水六升煮取二升分溫兩服小便利即差	澤瀉散 治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘急大便不通	小便赤澀	澤瀉 桑白皮 木通 枳殼 檳榔 赤茯苓	等分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右呶咀每服四錢水一椀薑四片煎至六分去滓食	前溫服	防己湯 治妊娠脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便	不利	防己 三分 桑白皮 紫蘇莖葉 赤茯苓 各一兩 木香	一分	右為粗末每服四錢水一椀薑四片煎至七分去滓	食前溫服



千金鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣	白朮 ^{五兩} 茯苓 ^{四兩} 當歸 ^{各三兩} 芍藥 ^{各三兩}	右細剉以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚不用	每服四錢入魚汁一錢半薑七片橘皮少許煎至七	分去滓空心服 集驗同	商陸赤小豆湯 治妊娠手足腫滿攣急	赤小豆 商陸 ^{等分}	右呖咀每服一兩用水一碗煎至七分澄清汁服集	欽定四庫全書 婦人大全良方	驗千金方有澤漆 產寶方無澤漆有桑白皮	腎著湯 治妊娠腰脚腫	茯苓 白朮 ^{各四兩} 乾薑 甘草 ^{各二兩} 杏仁 ^{三兩}	右呖咀每服四錢水一錢半煎至七分食前服	指迷方治胎水五皮散尋常脾虛腫滿亦治	大腹皮 桑白皮 生薑皮 茯苓皮 橘皮 ^{等各}	右呖咀每服半兩水二錢濃磨木香水一呷同煎至



八分去滓空心溫服亦治男子脾虛腫滿 一方無	桑白皮有白朮倍之名白朮散	妊娠腹內鍾鳴方第九方 凡一	治孕婦腹內鍾鳴用鼠窟前後土為細末研麝香酒調	下二錢其產立愈	龔彥德孕癰方第十方 凡一	治孕癰方立効	烏藥 研出洪州軟白香辣者良	欽定四庫全書 婦人大全良方	右用水一瓊牛皮膠一片同煎至七分溫服	妊娠不語論第十一方 無	孕婦不語非病也間有如此者不須服藥臨產月但服	保生元四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之	功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則	以為醫之功豈其功也哉 黃帝問曰人有重身九月而	絡脉絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰	之脉貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無	治也當 十月復



經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五官傷在五味若姙子飲食不節生冷毒物恣性食噉致傷脾胃故姙娠傷食最難得藥唯此二方最穩捷		木香元 治婦人有孕傷食		木香 錢二 三稜 人參 白茯苓 錢各三		右為細末麪糊元如綠豆大熟水吞三四十元		白朮散 治姙娠氣不調和飲食易傷		欽定四庫全書 婦人大全良方		白朮 炒 乾紫蘇 各一兩 人參 白芷 各三分 炒 川芎 訶		子皮 青皮 錢各五 甘草 一分		右為末每服二錢水一錢薑三片煎至七分溫服		愚詳小七香元 方見局 保氣散 見十六卷 第三論 豈無良効		姙娠臟燥悲傷方論第十三 方凡一		許學士云鄉里有一婦人數欠無故悲泣不止或謂之有崇析禳請禱備至終不應予忽憶有一證云婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈數欠者大棗湯予急令治藥盡	



劑而愈古人識病製方種種妙絕如此試而後知	大棗湯 治婦人臟燥悲傷欲哭象若神靈數欠者皆	主之	甘草 三兩 小麥 一升 大棗 十枚	右呖咀以水六升煮取三升去滓分溫三服亦補脾	氣專治婦人方名甘草湯 鄉先生程虎卿內人黃氏	感悲傷淚下數欠如有所憑醫與巫者兼治皆無益	僕年十四正在齋中習業見說此證而程省元皇皇	無計僕遂告之管先生伯同說記憶先人曾說此一	證名曰藏燥悲傷非大棗湯不愈虎卿借方看之甚	欽定四庫全書 婦人大全良方	喜對證笑而治	藥一投而愈矣				婦人大全良方卷十五



欽定四庫全書

婦人大全良方卷十六

宋 陳自明 撰

坐月門

妊娠疾病既明須知
坐月避忌故以次之

產寶方周頌序第一

頌聞至靈者人最重者命人皆知命之所重而不知養
命之方天年未終疾病攻奪嗟乎世無良醫著述則急
難倉卒尋醫其舛誤多矣醫之中惟產難為急子母性

欽定四庫全書

婦人大全良方

命懸在片時頌勤志方書常思救療每覽名醫著述皆
誌於心且夫男女構精陰陽分氣就中女弱疾狀頗多
蓋其稟柔質以為人有血藏而抱育妊娠之內導理有
常至於飲食之間動靜之際尤多制忌以節性情及乎
既產鮮保安者蓋是損觸臟腑傷動筋骨將理稍失疾
患便生更值盲醫取次下藥致其所苦積漸懸危日復
一日亟至於死可不痛哉故易曰天地之大德曰生則
知在天地之間以生育為本又豈因生產而反危人之



命乎自惟攝理因循藥餌差謬致其產婦不保安全且
婦人生產方二三次血氣未衰飲食易進但能節性則
無病生縱或偶有微病不難醫治至於四五次迨乎七
八次傷敗已深血氣衰微子藏虛弱穢敗內滯風邪外
攻若有病生宜須審療醫若不子細疾便危殆此醫殺
之理甚明矣且仕俗之家婦人產後復乳其子產既損
氣已甚乳又傷血至深靈命耗神莫極於此稍失常理
便合急醫或以家貧不及厚賂醫者醫者怠慢須臾困

欽定四庫全書

婦人大全良方

篤吁人之生產非小事也而醫者圖財侮而致死此醫
殺之理又明矣且夫產前產後血氣未寧一疾苟生百
疾同作古人所以著方論於產乳者正在此也至若鯉
魚阿膠能治胎動芎藭當歸善療胎痛祗如胎動胎痛
非至理也有因母疾而胎動者有因胎不堅固而自動
者痛亦如之此畧舉大綱蓋須知醫者之功也降及地
黃益血生薑助氣芍藥止痛黃耆補虛用之得門其効
如聖用之失理不如不醫乃知醫人不可苟作頌以此



疾心常思著方以濟危急而學解不博未能自信所以
偏採產術志在廣行復見咎殷產寶咎子深入醫門乃
大中歲相國白敏中傷茲婦人多患產難詢訪名醫思
救人命或人舉殷相國迎召問其產乳殷乃撰方三卷
贊於相國相國重其簡要命曰產寶此方雖存得者甚
少頌志在愈疾常恨不家藏一本故輒敢序之蓋欲開
其衆聽凡五十二篇三百七十一方兼拾咎氏之遺作
小論三篇次於序末庶幾妊娠之家自得覽斯為家內

欽定四庫全書

婦人大全良方

明師爾時丁巳歲秋八月序

將護孕婦論第二

凡婦人妊娠之後以至臨月藏府壅塞關節不利切不可多睡須時時行步不宜食粘硬難化之物不可多飲酒不可亂服湯藥亦不可妄行鍼灸須寬神減思慮不得負重或登高涉險若偶然胎不安腰痛者須服安胎藥一二服得安即止周頌論曰生產雖然觸穢排比須要在先入月一日貼產圖并日遊胎殺所在并借地法



於妊婦房內北壁上仍依位設床帳厚鋪茵蓐周密使
無孔竅夏月亦鋪厚薦用好油單薄席紗帳以備之常
焚香令潔淨備辦湯藥器物既覺欲產不得喧閤人力
雜亂大小愴惶驚動產婦宜預擇年高歷練生婆一人
并穩當曾經慣婦人一兩人扶持不得揮霍恐產婦憂
驚又忌閑雜外人并喪孝穢觸之人看視切不得驚動
傷早若坐婆拙不能體候胎氣方轉動之際便為欲生
多端下手驚動傷早則橫倒之憂從此而致也

欽定四庫全書

婦人大全良方

產寶方云妊娠欲產腹雖痛而腰不甚痛者未產也且
令扶行熟忍如行不得則凭物扶立行得又行或衣漿
先下然後作陣腰腹痛眼中如火生此是胎離腎經兒
逼產門也即服催生藥一二服即扶上蓐草切不可坐
草早務要產婦用力存養調停亦令坐婆先說諭之如
覺心中煩悶可取白蜜一匙用新汲水調下或覺飢即
喫軟飯或粥少許亦須預備勿令飢渴恐產婦無力困
乏也若不饑渴亦不須強食大凡生產自有時候不可



強服催生滑胎等藥或因坐草早勢不獲已則服之若無事強服恐變生他疾又須戒之	滑胎例第三	凡妊娠已滿十月形體成就神識咸備分氣趣產宜服	滑胎湯藥	滑胎枳殼散瘦胎易產胡陽公主每產累日不下南山	道士進此方	商州枳殼二兩粉草一兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末百沸湯點二錢服空心日三服凡懷孕六	七箇月已上服之令兒易生初生胎小微黑百日已	後肉漸變白此雖孫真人滑胎易產方然抑陽降氣	為衆方之冠此方分兩出必用方以此為正	一方枳殼六兩甘草一兩故加枳殼減甘草蓋未產人甘草性寒故也未產前	一月日三服 忌登高厠	一方有糯米半升淘洗控乾同炒為末米飲白湯調	下一二錢



溫隱居加當歸木香各等分	張氏方 治妊娠胎肥壅隘動止艱辛臨月服之縮胎	易產兼治腸中諸疾下氣寬膈 枳殼 五兩 甘草 一兩半	香附子 三兩炒 為末薑煎湯點亦可如丈夫婦人冷	氣攻刺脇肋疼痛者用葱白三寸同煎服 婦人脾	寒血氣成塊作痛熱酒調服 大小便不通白牽牛	為末煎湯調服	選奇方 香附子 枳殼 各二兩 甘草 半兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	內補元 治妊婦衝任脉虛補血安胎	熟地黄 二兩 當歸 一兩 微炒	右為細末煉蜜元如梧子大溫酒下三四十元	許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰蓋抑陽	助陰之藥甚多然胎前藥唯惡羣隊若陰陽交錯	別生他病唯是南山道士枳殼散所以抑陽四物	湯所以助陰故爾然枳殼散差寒若單服之恐有	胎寒腹痛之疾以內補元佐之則陽不至強陰不



致弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及也

易產滑胎方 其藥性滑利小便

車前子

右為末酒調方寸匕服不能飲者水調 詩云芣苢

能令婦人樂有子矣 陸機注云治婦人產難愚詳

孔子序詩云樂然而生易於生育後人以為注喜誤

矣

治產難神寢元瘦胎滑利易產臨入月服之極有神効

欽定四庫全書

婦人大全良方

知蕪州施少卿方蕪州徐大丞傳

通明乳香

半兩
別研枳殼
兩一

右為細末煉蜜元如梧子大空心溫酒吞下三十元

日一服懷孕九箇月以後方可服

陸氏方名寤生元乳香

只一分
酒糊元

榆白皮散 治妊娠滑胎易生

榆白皮

甘草
兩各二

葵子
兩一

右為粗末每服二錢水一錢煎至七分去滓溫服



一方無榆白皮名葵子散	主孕婦九箇月將產消息	猪肚 具 一全	依法用葱五味煮熟食食如不盡更食以盡為度不	得與別人食無効	保氣散安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜偶然	頓仆胎動胎痛漏胎下血兼服佛手散 見通 神寢元	枳殼散 前見 此三藥入月內大宜常服	欽定四庫全書 婦人大全良方	香附子 兩四 山藥 兩二 縮砂仁 兩一 木香 錢四 粉草 一分 益	智仁 紫蘇葉 兩各半	右為細末白湯點二錢服	月空方位例第四 出太平聖惠外臺同	正月 三月 五月 七月 九月 十一月 已上	在丙壬 二月 四月 六月 八月 十月 十二	月 已上在甲庚	逐月安產藏衣忌向方位第五



凡安產藏衣方位並於卧閣內分布太平聖惠方云凡
姙婦初入月便寫產圖一本以朱書某月某日空貼在
某位如正月在丙壬可於壬位安產婦床帳丙位藏衣
之類貼掛在產婦房內北壁上若值閏月只看節氣用
之又云每月產圖有雷公招搖運鬼力士天狗軒轅大
時咸池吳時豐隆白虎大夫天候狂虎凡十三神並從
月建易其位所謂月空者按內經云月廓空無寫王水
注云論月輪中空日也即非十三神之數今太平聖惠
方以六陽月在丙壬以六陰月在甲庚正如外臺所言
正月在丁壬至十二月在甲庚之類其理一也但外臺
言之詳聖惠言之簡耳今人多依聖惠方者特從其簡
而已或云凡逐月安產藏衣並向月德月空方位所有
十三神殺並從節氣更換若交次月節便作次月用書
產圖者非也假如正月十四日立春若姙婦十三日乳
卧豈可作去年十二月用也必依月分用之乃是若依
節氣更換則天德月德所在差矣然月空與壬謂之中



天空頗相類議者以為天空者非十三神之數蓋課中
有天乙貴人其位無可與對者故此空是謂天空值此
神百事不宜止宜安產婦床帳藏衣之類耳集聖歷云
天德正月在丁二月在坤三月在壬四月在辛五月在
乾六月在甲七月在癸八月在艮九月在丙十月在乙
十一月在巽十二月在庚

又堪輿歷有遊年白虎殺神在太歲後一辰如太歲卯
則白虎在寅餘倣此推之若產及藏衣犯之則子母皆

欽定四庫全書

婦人大全良方

不利也

王子亨云難產逆生論稱犯一切神殺固有是理然
亦有自然難產兒自逆生者及有產腸胃俱下者產
已則復如故此非疾病所致氣血所主天下之理亦
有不可窮詰者亦宜知之



欽定四庫全書

婦人大全良方 卷十六

十一

安產藏衣十三神吉凶方位

月	日	時	神	吉凶	方位
正月	壬寅	辰	天大	吉	東方
	癸卯	巳	天大	吉	南方
二月	甲辰	午	天大	吉	西方
	乙巳	未	天大	吉	北方
三月	丙午	申	天大	吉	東方
	丁未	酉	天大	吉	南方
四月	戊申	戌	天大	吉	西方
	己酉	亥	天大	吉	北方

欽定四庫全書		婦人大全良方		推婦人行年法第六		生氣方		反支月		禍害月		絕命方		懸尸日		閉肚方		八疰方	
產婦宜向之坐臥及		產婦宜向之開門大吉		遇此月即銷灰上用牛皮或馬		遇此月即銷草勿令惡血汚地吉		不得於其上產又不得		不得於其上產又不得		不得於其上產又不得		遇此日產不得攀繩		臨月至滿月並不得向之大		產帳不得向之	
五月		丙壬艮寅午卯辰申子申丑寅		六月		庚甲乾亥未子丑未酉卯巳寅卯		七月		丙壬坤申申酉戌戌戌子寅卯辰		八月		庚甲巽巳酉午戌丑亥卯亥辰巳		九月		丙壬艮寅戌卯辰辰子午申巳午	
十月		庚甲乾亥亥子丑未丑卯巳午未		十一月		壬丙坤申子酉戌戌寅午寅未申		十二月		庚甲巽巳丑午未丑卯酉亥申酉									



宜喚
臥宜
產母宜著
八疰方
閉肚方
懸尸日
絕命方
禍害方
反支月
生氣方

三歲行年戊申 艮正七 震坎 日辰戌在正東在正西黃色 首東北 衣東北方黃

三歲行年在未乾	日 艮 坎 震	艮 日 在正南在正南白色	首 西北	衣 西北方白
三歲行年在丙午兌	日 艮 巽 離	艮 日 在正南在正南白色	首 正西	衣 正西方白
三歲行年在乙巳巽	日 艮 兌 坤	艮 日 在正西在正西青色	首 東南	衣 東南方青
三歲行年在震坤	日 艮 巽 離	艮 日 在正西在正西青色	首 西南	衣 西南方黃
三歲行年在癸卯離	日 艮 兌 坤	艮 日 在正北在正北赤色	首 正南	衣 正南方赤
三歲行年在庚寅坤	日 艮 巽 離	艮 日 在正北在正北赤色	首 西南	衣 西南方黃
三歲行年在辛丑艮	日 艮 兌 坤	艮 日 在正西在正西青色	首 正東	衣 正東方青
三歲行年在壬子震	日 艮 兌 坤	艮 日 在正西在正西青色	首 東北	衣 東北方黃
三歲行年在癸亥乾	日 艮 坎 震	艮 日 在正南在正南白色	首 西北	衣 西北方白
三歲行年在壬戌離	日 艮 兌 坤	艮 日 在正南在正南白色	首 正西	衣 正西方白
三歲行年在辛酉巽	日 艮 兌 坤	艮 日 在正西在正西青色	首 東南	衣 東南方青
三歲行年在庚申坤	日 艮 巽 離	艮 日 在正西在正西青色	首 西南	衣 西南方黃
三歲行年在己未離	日 艮 兌 坤	艮 日 在正北在正北赤色	首 正南	衣 正南方赤
三歲行年在戊午坤	日 艮 巽 離	艮 日 在正北在正北赤色	首 西南	衣 西南方黃
三歲行年在丁巳巽	日 艮 兌 坤	艮 日 在正西在正西青色	首 正東	衣 正東方青
三歲行年在丙辰震	日 艮 兌 坤	艮 日 在正西在正西青色	首 東北	衣 東北方黃

欽定四庫全書

婦人大全良方

十四



欽定四庫全書 婦人大全良方 體玄子借地法第七 東借十步 西借十步 南借十步 北借十步 上借十步 下借十步 壁方之中四十餘步安產借地或有污穢或有東海神 王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有 日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅招搖舉高十丈天 符地軸入地十丈令此地空閑產婦某氏安居無所妨 碍無所畏忌諸神擁護百邪速去急急如律令勅 前項借地				
早歲行年辛卯乾 日巳亥在正南在正南黃色首西北衣師者產	早歲行年庚寅兌 日辰戌在正南在正南白色首正西衣師者產	早歲行年己丑巽 日卯酉在正西在正西黃色首東南衣師者產	早歲行年戊子坤 日寅申在正西在正西黃色首西南衣師者產	早歲行年丁亥離 日丑未在正北在正北赤色首正南衣師者產
早歲行年丙戌坎 日子午在正北在正北黑色首正北衣師者產	早歲行年乙酉震 日巳亥在正東在正東青色首正東衣師者產	早歲行年甲申艮 日辰戌在正東在正東黃色首東北衣師者產		



法於入月一日朱書一本貼於產婦
房內北壁上更不須避忌神殺也

禁草法第八 鋪草及氈褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王一言得之銅一言得之鐵母
子相生俱篋鐵急急如律令

禁水法第九 欲產時貯水呪曰

南無三寶水 水在井中為井水

水在河中為河水 水在器中為淨水

水在法中為真水 自知非真莫當真水

欽定四庫全書

婦人大全良方

以淨持濁 以正治邪 日遊月殺 五士將軍

青龍白虎 朱雀玄武 招搖天狗 軒轅女媧

天吞地吞 懸尸閉肚 六甲禁諱 十二神王

土符伏神 各安所在 不得動靜 不得忌干

若有動靜 若有忌干 施以神呪 當攝汝形

阿佉尼阿毗羅莫多梨娑地梨娑訶








入月預備藥物第十

保氣散 佛手散 枳殼散 神寢元 榆白皮散



保生元	催生丹	黑神散	大聖散	花藥石散
黑龍丹	理中元	催生符	生地黃	羗活
葵子	黃蓮	竹茹	烏梅	雌雄石燕
甘草	海馬	馬嘶鐵	棗子	陳皮
薑錢	黑豆	白蜜	無灰酒	童子小便
好醋	白米	煎藥爐	銚子	煮粥沙瓶
濾藥帛	醋炭盆	小石一二十顆	湯瓶	
軟硬炭	乾柴茅	煖水釜	洗兒肥皂頭髮	
欽定四庫全書		婦人大全良方		
斷臍線及剪刀	斷臍本不用刀只用帛裹臍下齒齧斷	乾蓐草		
卧交椅	軟厚氈	燈籠	火把	繳巾
油燭	發燭	燈心		
催生靈符第十一				
書符時宜以水飛朱砂書之貼於房內北壁上遇坐蓐之時劄於針上就穢內以燈燒之庶免飛揚溫水調服				



婦人大全良方卷十六	 	 	欽定四庫全書			治產難橫生逆產胞衣不下靈符 出聖惠方局方同
	 	此四符入月一日墨 書鞋底上仍密安產 婦席褥下勿令人知				
	 	此三符遇產難 以墨書吞之	婦人大全良方			
	 	治胞衣不出靈符四道 急則以朱砂書符吞下		治橫生靈符 朱砂書此符 以順水吞下		



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷十七

纂校官太醫院恩程臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄監生臣鄧培善



欽定四庫全書

婦人大全良方卷十七

宋 陳自明 撰

產難門

坐月既明須知
產難故以次之

產難論第一

夫產難之由有六所受各異故治
療之方不同今具言之以開世惑

凡婦人以血為主惟氣順則血順胎氣安而後生理和
今富貴之家往往保惜產母惟恐運動故羞出入專坐
卧曾不思氣閉而不舒快則血凝而不流暢胎不轉動

欽定四庫全書

婦人大全良方

以致生理失宜臨產必難甚至悶絕一也且如貧者生
育日夕勞苦血氣舒暢生理甚易何俟乎藥則孕婦常
貴於運動者明矣 次則婦人妊娠已經六七箇月胎
形已具而世人不知禁忌恣情交合嗜慾不節使敗精
瘀血聚於胞中致令子大母小臨產必難二也何以知
之生下孩子頭上有白膜一片滯膩如膠俗強名曰戴
白生兒身有青有黑俗強名曰宿痣此皆是入月交合
所致也如此則不特母病其子亦生浸淫赤爛瘡瘍俗



謂之胎蛆動逾歲月不差可不戒乎 三則臨覺太早
大小揮霍或信卜筮或說鬼祟多方誤恐致令產母心
驚神恐憂惱怖懼又被閑雜婦人喪孝穢濁之人衝觸
若不預為杜絕臨產必難三也何以知之如偷生之女
不正之屬既無產厄子母均安其理可知 凡臨產初
然腹痛或作或止名曰弄痛坐婆踈率不候時至便令
試水試水頻併胞漿先破風颯產門產道乾澁及其兒
轉便令坐草坐草太早兒轉亦難致令產難四也直候

欽定四庫全書

婦人大全良方

痛極眼中如火此是兒逼產門方可坐草即令易產如
坐草稍久用力太過產母困睡抱腰之人又不穩當致
令坐立傾側胎死腹中其為產難五也時當盛暑宜居
深幽房室日色遠處開啟窓戶多貯清水以防血運血
悶血溢妄行血虛發熱之證如冬末春初天色凝寒宜
密閉產室室塞罅隙內外生火常令暖氣如春仍下部
衣服不可去綿方免胎寒血結毋致產難六也 凡孕
婦入月斷不可洗頭方免產難及橫生逆產自明謹



論

楊子建十產論第二

凡人生產先知此十產證候則生產之婦永無傷損性命生產之間性命最重幸而孩子易生人不知福萬一有少艱難則須臾之間子母之命懸於絲髮但世人所患者惟看生產收生之人少有精良妙手緣此而多有傾性命予因傷痛其事不為無補

外有盤腸產僕添方法在後

一曰正產

欽定四庫全書

婦人大全良方

正產者蓋婦人懷胎十月滿足陰陽氣足忽然腰腹作陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹疼痛極甚乃至腰間重痛穀道挺迸繼之漿破血下兒子遂生此名正產

二曰傷產

傷產者蓋婦人懷胎忽有七月八月而產忽至九月十月而產忽有經一年二年乃至四年五年而後產者今獨以十月滿足為正產蓋一人之生陰注陽定各有時日不可改移今有未產一月已前忽然臍腹疼痛有如



欲產仍却無事是名試月非正產也但一切產母未有
前面正產證候即不可令人抱腰產母亦不可妄亂用
力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之人却教產
母虛亂用力兒身纔方轉動却被產母用力一逼遂使
兒子錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母未當用力之
所致也凡產母用力須待兒子順身臨逼門戶方始用
力一送令兒下生此方是產母之用力當也若未有正
產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗
而助之長非獨無益而又害之此名傷產

欽定四庫全書

婦人大全良方

三曰催產

催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣痛疼其痛極
甚腰重穀道挺迸已見是正產之候但兒却未生即可
服藥以催之忽有經及數日產母困苦已分明見得是
正產之候但兒子難生亦可服藥以助產母之正氣令
兒速得下生此名催產

四曰凍產



凍產者蓋言三冬之月天氣寒冷產母經血得冷則凝結而不散因其血之不散以至兒子不能生下此之一弊為害最深然世人不知覺若冬月產婦下部不可脫去綿衣并不坐卧寒冷之處當滿房着火令遍房常有暖氣常令產母背身向火令臍下腿膝間常有暖氣若背上心前少聞寒冷須是暖炙綿衣以色之貴其血得熱則流散使兒子易生此名凍產若春秋之間天地少有陰濕寒冷之氣亦可就房中以微炭火暖之為妙

欽定四庫全書

婦人大全良方

五曰熱產

熱產者蓋言盛暑之月欲產之婦當要其溫涼得所不可因熱恣意取涼反有傷損胎氣又生產之處不可多着人數切恐人多熱氣逼襲產母蓋人之血氣得熱則散熱過則損今當夏暑炎熱之盛而產母氣虛人氣一逼則其血沸溢而血得熱則上蒸能令產母發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事世有名血暈者緣此而成也此名熱產若值夏月少有清涼之氣陰雨之變產



母亦不可任意取涼恐生大病

六曰橫產

橫產者蓋兒子下生先露其手忽先露其臀此因未當用力而產母用力之過也臍腹疼痛兒身未順則是產母用力一逼遂致身橫而不能生下不幸而有此證候當令產母安然仰卧令看生之人推而入去凡推兒之去先推其兒身令直上漸漸通手以中指摩其肩推其上而正之漸引指攀其耳而正之須是產母仰卧然後

欽定四庫全書

婦人大全良方

推兒直上徐徐正之候其身正門路皆順煎催生藥一盞令產母喫了方可令產母用力令兒下生此名橫產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

七曰倒產

倒產者蓋因其母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能回轉順生便只直下先露其足也治之之法當令產母於床上仰卧令看生之人推其足入去分毫



不得令產母用力亦不得驚恐候兒自順若經久不生
却令看生之人輕輕用手內入門中推其足令就一畔
直上令兒頭一畔漸漸順下直待兒子身轉門路正當
然後煎催生藥令產母服一盞後方始用力一送令兒
生下此名倒產若看生之人非精良妙手不可依用此
法恐恣其愚以傷人命

八曰偏產

偏產者蓋因兒子回轉其身未順生路未正却被產母

欽定四庫全書

婦人大全良方

用力一逼致令兒頭偏挂左腿忽偏挂右腿致令兒雖
近人門而不能生下但云兒已露頂然不知兒之所露
即非頂也忽左額角忽右額角而已謂兒頭偏挂一畔
以此不能生收之之法當令產母於床上仰卧令看生
之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭先端正向人
門然後令產母用力一送即使兒子生下若是小兒頭
之後骨偏挂穀道即令兒却只露額當令看生之人以
一件綿衣炙令溫暖用裹手急於穀道外旁輕輕推兒



頭令正即便令產母用力送兒生也此名偏產凡於穀道外旁推兒頭正須推其上而正之仍是小用輕力推些上兒而正之也若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

九曰礙產

礙產者蓋言兒身已順門路俱正兒子已露正頂而不能生下蓋因兒身回轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生此名礙產收之之法當令產母於床上仰卧令看生之人輕輕推兒近上徐徐引手以中指按兒肩下其肚帶也仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒生下生此名礙產若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以傷人命

十曰坐產

坐產者蓋言兒子之欲生當從高處牢繫一條手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非令產母臨生兒時坐着一物此名坐產若是產母兒將欲生却令

欽定四庫全書

婦人大全良方



坐着一物即抵着兒路不能生也

十一曰盤腸產

續添凡四方

趙都運恭人每臨產則子腸先出然後產子產子之後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能療偶在建昌得一坐婆施之一法而收之其法遇產後子腸不收之時以醋半盞新汲冷水七分碗調停喫產婦面每喫一縮三喫收盡此良法也後學不可不知

治推腸生方又名盤腸產

欽定四庫全書

婦人大全良方

右以半夏為末搐鼻中則腸上矣

又方以大紙撚以麻油潤了點燈吹滅以烟熏產婦鼻中腸即上矣

又方以葶麻子十四粒去殼研如膏貼產婦頭頂中心腸即上即拭去

催生方論第三

凡三十方

五行論命以年月日時支干所遇五行所屬相生相值以推人之貴賤其間最切要者時也若林開命書以年



為父母為己身月為兄弟僚友曰為妻妾上官時為子
孫帝座蓋人之生也得其時則終身富貴失其時則終
身貧賤信乎人生之時不可忽也然則人生之時其可
催乎殊不知娠有諸生產之難若臨產起坐既久勞力
困乏須妙藥催趨以救其危當此之時又何暇論其時
耶又聖惠方有推娠婦行年法若行年有與本命相值
所產歲月者即鋪驢馬皮于灰草上令娠婦臨產時踐
之手攀鞍轡頭則易產今之醫者便以此等物為產卧

欽定四庫全書

婦人大全良方

所需之物誠謬論也其所以然者謂妊婦行年偶與本
命相值于所產歲月慮有諸般艱難之厄故以此厭禳
之取其快速之意耳如或不值則無用矣今錄催生數
方皆名醫士夫厯用良驗者以幸有緣產寶方論曰夫
產難者內宜用藥外宜用法蓋多門救療以取其安也
療產難坐草數日困乏不能生此為母先有病經絡俱
閉而然

催生柞木飲子 治產難或橫或倒死胎爛脹于腹中



此方屢用神妙

生大柞木枝

一大握長一尺淨洗寸剉

甘草

大者五寸剉作五段

右用新汲水三升半同入新沙瓶內以紙三重緊封之文武火煎至一升半令香覺腹痛便準脩候產婦腰重痛欲坐草時溫溫飲一小琖便覺心下開豁如覺再渴又飲一琖至三四琖覺下重便生更無諸苦切不可坐草早及坐婆亂下手如催生藥只消一服此方至驗乃上蔡張不愚方也

欽定四庫全書

婦人大全良方

催生如神散 療逆生橫產瘦胎兼治產前產後虛損月脉不調崩漏一名催生黑散一名烏金散一名二神散

百草霜

香白芷

不見火為細末

右二味等分研停每服二大錢於臨產蓐時以童子小便并少米醋打為膏沸湯調下集驗用酒童子小便各半琖同煎纔沸即調停熱服甚者不過再服

得血

黑則止此藥大能固血免得乾生其妙在此



催生如聖散	黃蜀葵花不以多少焙乾為細末熟湯調下二錢	神妙 或有漏血胎臟乾澁難產痛劇者并進三	服良久腹中氣寬胎滑即時產下如無花時只用	葵子爛研小半合以酒調濾去滓溫過頻服尤妙	亦治打撲傷損如胎死不下煎紅花溫酒調下	用子歌曰 經驗用子 四十九粒	黃金內子三十粒 細研酒調能備急	欽定四庫全書 婦人大全良方	命若懸絲在須臾 即令眷屬不悲泣	曹秀才方 用葵子一味研墨或研朱砂為衣每服四	十粒溫酒吞下	催生丹 療產婦生理不順產育艱難並宜服之 出聖 惠方	局方同宜 天醫日合	十二月兔腦髓 去皮膜 研如泥 通明乳香 一分 細研 母丁香 一 末	錢 麝香 一字 研細	右四味拌停以兔腦髓和圓如雞頭穰大陰乾用油



紙密封貼每服一圓溫水下即時產隨男左女右手
中握出是驗

又方 通明乳香一瑰如皂子大

右為末覺腰痛時用新汲水一小盞入醋少許同調

扶立令產婦兩手提兩石燕坐婆飼藥飲之先令姪

婦念醫靈藥聖三遍然後服之仍略扶行數步須臾坐

草便生更無痛楚神良

經驗方如神開骨膏 乳香不以多少五月五日午時

欽定四庫全書

婦人大全良方

令一人在壁背捧乳鉢在櫬上令一童兒以筆管透壁

縫內逐粒從筆管中過入乳鉢內研令極細以童兒面

北滴水圓如雞頭大每服一粒無灰酒吞下海上方用

乳香朱砂等分為細末麝香酒調下

治難產或倒橫不順方

蛇蛻 一條 全者 蚕蛻紙 一張 方無

右入新瓦瓶中鹽泥固濟燒存性為末煎榆白皮湯

調下一錢三服覺痛便生 一方云臨產腰痛用藥



三字麝香一字溫酒調下名二妙散	催生萬金不傳遇仙丹	草麻子 十四箇 去殼 朱砂 雄黃 各一錢半 蛇蛻一尺 燒	右為細末漿水飯和圓如彈子大臨產時先用椒湯	淋瀝臍下次安藥一圓於臍中用蠟紙數重覆藥上	以闊帛繫之須臾生下急取去藥一圓可用三次	如聖膏 治產難兼治胞衣不下兼治死胎	用草麻子七粒去殼細研成膏塗腳心胞衣即下	欽定四庫全書 婦人大全良方	速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入如	聖之妙一方男用七粒女用十四粒	一方用草麻子百粒雄黃末一錢同研並用如前	法	寸金散 治產難	用敗兔毫筆燒為灰細研為末生藕汁一錢調服	立產若產婦虛弱及素有冷病恐藕汁動氣當於	銀器內重湯調溫服



陸氏方云此難產第一方

金箔三片 兔毫筆頭三箇燒為灰

右二味和停用蠟為圓如梧子大作一服溫酒下

又方

大朱砂隨多少端午日晒至百日不得着而如滿百日取研如粉

右用蠟月兔腦髓和圓如綠豆大欲覺產粥飲下一

圓良久便產其藥男左女右手中把出

又方

欽定四庫全書

婦人大全良方

腦月兔頭一枚燒為灰

右為細末葱白煎湯調二錢立生

指迷方催生兔血散

腦月兔血蒸餅切作片子蘸之以紙袋盛掛當風

處陰乾為末煎乳香湯調下二錢

又方

腦月兔腦髓塗於一張薄紙上更用一張合搗以

秤槌搥三五十下每遇難生看大小書天生兩字



作符以醋湯調下極妙	又方	兔皮和毛燒為灰末之以酒調方寸匕服之即產 衣不下者服之即下	治橫倒生者或先手足者	明阿膠 炒一方 用酥 滑石末 各一兩 葵子 二合	右水一盞半煎至一盞去滓分二服	治難產五六日不得分娩疲困虛乏者	欽定四庫全書 婦人大全良方	光明水膠 二兩	右用好酒一升半微火鎔膠入新雞子一箇鹽一錢	匕攪溫令產婦坐椅物上伸腰大口作二次服之覺	小腹重便生緣坐草早驚動故也	救產難經日不生	雲母粉 半兩 溫酒調服入口當產不順者即產萬不	失一 陸氏方云是何德揚方云已救三五千人却	以無灰酒調下



治橫逆產理不順子死腹中	伏龍肝細研每服一錢酒調服之以土着兒頭上	戴出妙	廣濟療難產三日不下方	吞雞子黃三枚并少苦酒服	集驗 療橫產及胎死腹中以三姓雞卵各一枚三姓	鹽各一錢三姓水共一盞相和煮五七沸分溫二服令	產母東首服之立出	欽定四庫全書	婦人大全良方	療難產日久氣力乏盡不能生此是宿疾	赤小豆 _{二升} 以水九升煮熟取汁入炙了明黃膠一	兩同煎少時一服五合未效再服不過三四服即	產	備急方 療難產三日不出	吞槐子十四枚即下廣濟方有蒲黃一合千金集	驗崔氏同	又方



當歸為末酒調方寸匕服	催生如意散 臨產腰疼方可服之	人參 為末 乳香 各一錢 辰砂 半錢	右三味一處研臨產之時急用雞子清一箇調藥末	再用生薑自然汁調開冷服如橫生倒生即時端順	子母平善 傳於鄂倅施漢卿屢見功效	陳氏催生神效七聖散 臨產腰疼方可服之	延胡索 沒藥 白礬 白芷 薑黃 當歸	欽定四庫全書 婦人大全良方	桂心 等分	右為細末臨產陣痛時燒鐸 犁頭 鐵 是也 令通赤淬酒	調藥三錢服一二杯立產 此方鳳州河池縣喬醫家貨每服錢引一道遇一士	友楊濟伯密得之屢試屢驗	催生神妙乳珠丹	乳香研細以猪心血為圓如梧桐子大以朱砂為衣	日乾每服一粒如催生冷酒化下良久未下再服一	粒如大段難產時以蓮葉心蒂七箇水二錢煎至一



璣放溫化下一粒良久未下亦可再服此藥靈驗如	神無有不下者如胞漿先破惡水來多胎乾不得卧	時須先與四物湯及通真圓補養其血氣次更濃煎	葱湯放冷如躰令坐婆洗產戶須是款曲洗令氣上	下通暢仍更用酥調滑石末塗產戶裏次服前催生	藥則萬全矣如胎死不下者用黑豆三合好醋半升	煮令豆爛取汁一璣放溫化下藥一粒須臾便下矣	萬一未下亦可再服如胎下胞衣未下者服此亦便	欽定四庫全書 婦人大全良方	下也若胎橫逆不順即先服如神散 方見前 再服此藥	復以此藥催之合藥時要五月五日午時極妙或七	月七日或三月三日及月初上辰日合亦得	小品療逆產方 鹽塗兒足底又可急搔爪之并以鹽	摩產婦腹上即產	又方 以鹽和粉塗兒兩足下即順矣	集驗方 療逆產 燒錢令赤納酒中飲之	又方 取夫陰毛二七莖燒以猪膏和圓如豆大水吞



下兒手即握出神驗 刪繁療產難方取車軋中膏畫
腋下及掌心崔氏文仲小品千金集驗備急同
療逆產胞衣不出方 取竈屋黑塵研為細末酒調方
寸匕 一方用梁上塵
張文仲療橫生逆產服諸符藥不捷者灸右脚小指尖
頭三壯艾炷如小麥大
小品療橫生倒產手足先出方 並出外臺
用粗針刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自當
欽定四庫全書 婦人大全良方
回順 文仲備急千金 崔氏集驗同
橫產逆產二條其理雖別療法蓋同可以意量逐善
參用也
郭稽中產難方論第四 凡三方
論曰產難者何胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破
與敗血裹其子故難產但服勝金散逐其敗血即自生
若橫生逆生並皆治之
勝金散方



麝香

一錢
研

鹽鼓

一兩以舊青布裹了燒
令赤急以乳鉢研細

右為末取秤錘燒紅以酒淬之調下一大錢

陳無擇評曰產難不只胎側有兒枕破與敗血裹凝傷其胎息因緣自有難易其如橫逆多因坐草太早努力過多兒轉未逮或已破水其血必乾致胎難轉若先露脚謂之逆先露手謂之橫法當以針刺之便自縮入即服神應黑散以固其血必自轉生 養生方云倉皇之間兩命所係不可不廣傳蓋贊黑散之功也 或以鹽

欽定四庫全書

婦人大全良方

塗兒脚底抓搔之

神應黑散方

見前即催
生如神散

產難子死腹中方論第五

凡十
八方

夫產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌致令產難皆因穢沃先下產時未到穢露已盡而胎枯燥故子死腹中其候產母舌青黑及胎上冷者子已死也故產處坐卧須順四時方面并避五行禁忌若有觸犯多招災禍也



治妊娠三五箇月胎死在腹內不出	大腹子 赤芍藥 榆白皮 各三兩 當歸 炒一兩 滑石	末 三分 瞿麥 葵子 炒 茯苓 粉草 子苓 各半兩	右為粗末每服四錢水一錢煎至七分去滓不拘時	溫服	療死胎腹內不出母已危殆不得已者立效方	水銀半兩 桂末一錢	右只作一服溫酒調下粥飲亦可	欽定四庫全書 婦人大全良方	又方	以利斧煨赤置酒中待溫飲之其子便下	治妊娠胎死腹中候其母面赤舌青者是宜錫粉圓 指出	迷	錫粉 水銀 各一錢	右同研不見水銀為度以棗肉和圓如豌豆大煎瞿	麥湯吞下	十全博救療胎死腹中



又方 以好辰砂一两水煮數沸研令極細酒調二錢服	分晚後喫芸薹粥良	趙和叔傳下死胎方	桂心末 二錢 麝香當門子一箇	右同研溫酒調服須臾如手推下比之用水銀等藥 不損血氣	欽定四庫全書 婦人大全良方	何氏方無麝香每用桂末 二錢 痛陣密時用溫童子小便 調下名觀音救生散兼治產難及橫倒生	療胎死腹中不出母欲絕	水銀 二兩 頓吞下兒立出	又方 用水銀如彈子大以棗肉均研和如大豆許水吞 下立出	救急 治子死腹中



取夫尿二升煮令沸飲之	文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草	不產血氣上盪心母面無顏色氣欲絕方	猪脂 煎一升 白蜜 一升 淳酒 二升	右三味合煎取二升分溫兩服不能飲隨所能服之	又療子死腹中不出以牛屎塗母腹上立出	崔氏療胎死	甘草 一尺 蒲黃 二合 筒桂 四寸 香豉 二升 雞子 一枚	欽定四庫全書 婦人大全良方	右細切以水六升煮取三升頓服胎胞穢惡盡去大	良	產經數日不出或子死腹中母氣欲絕	瞿麥 六兩 通草 各三兩 桂心 各三兩 牛膝 四兩 榆白皮 一升	右呖咀以水九升煎取三升去滓分溫三服	一字神散治子死胎不下胞破不生此方累有效救	人幾萬數	鬼白不拘多少黃色者去毛碾為末以手指撚之



如粉極細為度每服二錢用無灰酒一瓊同煎至
八分通口服立生如神此藥不用羅只碾令極細
鄧知縣傳方 療死胎不出

朴硝為末每用二錢溫童子小便調下知洪州進
賢曾通仕定求云昔為豐城尉時有貓孕五子一
子已生四子死腹中啼喚欲死試問醫者令用此
藥灌之死子即下猫得再生後有一牛亦如此用
此法亦活醫云本治人方用以治畜也後因以救

欽定四庫全書

婦人大全良方

人無不驗

僕為兒時曾有一親戚胎死腹中不下
數日百計已窮記憶我先人用朴硝半

兩研細以童子小
便調下胎即落矣

治死胎不下其證指甲青舌青脹悶甚者口中作屎臭
先以平胃散一貼作兩服每服酒水各一瓊同煎至一
瓊却投朴硝半兩研細再煎三五沸傾出候微溫服盡
其胎即化血水而下

繆宅厥息孺人杜氏生產數日不下坐婆魂童救療皆
無効召僕診之僕曰產前脉不可考但當察色而知之



遂揭帳明燭以察之其面色赤舌色青見此色者知胎已死母却無憂矣或問曰何以知之予荅曰面赤舌青者子死母活明矣供自合至寶丹二粒服之胎即落矣以此見古人處方神速	至寶丹 方見和劑方	產難生死訣第六	欲產之婦脉離經難經云一呼三至曰離經此是陽加陰加于陽四倍也注云經者常也謂脉離常經之處細而言之一呼脉再至一吸脉再至曰平和之脉故一呼	欽定四庫全書 婦人大全良方	脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸一日一夜一萬三千五百息脉行八百一十丈乃為一周復從始之經再行今一呼脉行三至一吸脉行三至呼吸定息脉行九寸一日一夜脉行通計一千二百一十五丈過于平脉之數不在所起之經再起故曰離經若一呼一至脉行寸半一吸一至脉行寸半呼吸定息脉行三寸一日一夜通計脉行得四百半五丈乃為一周是及平脉之數周而復始亦不在所起之經再起亦曰離經也沉細而滑也同名臨產之婦脉見沉細而滑者乃腎茂與離經之夜半覺痛應分誕來日日午定知生若妊婦脉同名也夜半覺痛定知來日午時當分晚也聖惠方云夜半時時覺腹痛來日午時必定生產謂子午相對正半日時也身重體熱寒又頻舌下之脉黑復青反舌上冷子當



死腹中須遣母歸冥 凡妊婦身體沉重者胃氣絕也又也若舌根下脉見青黑色及舌反捲上冰冷不溫者子母俱死之候 面赤舌青細尋看子 死母活定應難 凡妊婦面赤色是榮氣流通母活之候舌上青色是妊脉絡絕胎死之候 唇 口俱青沫又出子母俱死總高判 若妊婦唇口俱青色中吐出痰沫者是脾胃之氣俱絕此子母俱死之候也 面青舌青沫出頻母死子 活定知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛陳 凡妊婦皆青色又頻吐痰沫者是產母榮衛俱絕胎氣衝上之候此是子活母死之候產下子母必死也此古賢哲應驗之文不虛妄陳其說也 新產之脉緩活吉實大弦急死來親 凡婦人新	欽定四庫全書 婦人大全良方 產之後其脉來緩滑者為氣血通和是生活安吉之兆也若見實大弦急之脉則凶必死之候 若得沉 重小者吉忽若堅牢命不停 此是形虛脉虛相應故云 吉兆之脉忽然診得堅硬牢實之脉是脉盛形衰相反性命不可停留必死也 寸口澁疾不調 死 若產後診得寸口脉澁疾大小不調 沉細附骨不絕 生 若重手按之乃得其脉沉細附着于骨不斷絕有力者此生活之兆也 審看此候分明 記長須念此向心經 凡為醫者宜詳審脉證分明記於心曾也 王子亨云凡產後諸疾最忌脉大 婦人大全良方卷十七



欽定四庫全書

婦人大全良方卷十八

宋 陳自明 撰

產後門

產難既明須知產後疾病故以次之

產後將護法第一

周頤論併在其中

論曰凡婦人生產畢且令飲童子小便一瓊不得便卧

且宜閉目而坐須臾方可扶上床仰卧

不得側卧宜立膝不可

足伸高倚床頭厚鋪茵蓐遮圍四壁使無孔隙免被賊風

欽定四庫全書

婦人大全良方

兼時時令人以物從心擗至臍下使惡露不滯如此三

日可止仍不可令多卧如卧多看承之人宜頻喚醒舊

說產婦分娩了三日方可上床若三日上床則必就地

睡卧又豈可令產婦近地氣乎 纔生產畢不得問是

男是女且先研醋墨三分服之一法云不可服醋墨有

傷肺經成欬嗽之戒誠過慮也然醋墨本破凝結之血

然不可用太釅之醋仍不可太多即不至傷肺然所在

皆同亦有不喫者更產後三日內令產婦嘗聞醋炭氣



或燒乾漆煙若無乾漆以破舊漆器燒之以防血逆血
迷血運不省之患夏月宜於房門外燒磚以醋沃之置
於房中夏月房中不須着大火及煮粥煎藥之類分晚之後須更且食白粥
一味不可令太飽頻少與之為妙逐日漸增之煮粥時
須是煮得如法不用經宿者又不可令溫冷不調恐留
滯成疾仍時與童子小便一錢飲之亦須先備小便若遇夏月以薄荷養
之新產後不問腹痛不痛有病無病以童子小便以酒
和半瓊溫服五七服妙一臈七日也之後方可少進醇酒
欽定四庫全書
婦人大全良方
并些小鹽味 一法纔產不得與酒緣酒引血迸入四
肢兼產母臟腑方虛不禁平聲酒力熱酒入腹必致昏悶
七日後少進些酒不可多飲如未出月間欲酒喫或服
藥者可用淨黑豆一升炒令煙出以無灰酒五升澆淋
之仍入好羌活一兩洗淨拍破同浸尤妙當用此酒下藥或
時時飲少許可以辟風邪養氣血下惡露行乳脉也如
產婦素不善飲酒或夏月之間亦不須強飲一臈之後
恐喫物無味可爛煮羊肉或雌雞汁畧用滋味作粥飲



攝至百晷始得血氣調和臟腑平復自然安帖設不依	工巧房慾 詳見產後通用方第一 及上高厠便溺之類如此節養	忌任意飲食觸冒風寒恣意喜怒梳頭用力高聲作勞	頭皆成血逆血運此產家謹護之常法也滿月之後尤	不得濯足恐血氣攻下又不得刮舌 傷心 刷齒及就下低	之所有血衣洗濯不得於日中晒曝免致邪祟侵傷又	不救又不得夜間獨處緣去血心虛恐有驚悸切宜謹	慎觸犯此多致身體強直如角弓反張名曰蓐風遂致	欽定四庫全書	婦人大全良方	醫亦不能療大都產婦將息須是滿百日方可平復大	手脚及腰腿痠重冷痛骨髓間颼颼如冷風吹繼有名	浴或冷水洗濯當時雖未覺大損滿月之後即成蓐勞	食生冷粘硬菜菜肥膩魚肉之物及不避風寒脫衣洗	思慮恚怒強起離床行動久坐或作鍼線用力工巧恣	多恐成積滯若未滿月不宜多語喜笑驚恐憂惶哭泣	亦 子亦補益 風俗也三月之後方可少食溫麵 食麵早成腫病 凡喫物過	之或喫爛煮猪蹄肉 忌母猪及白脚猪肉 不可過多 今江浙間產婦多喫熟雞



此即致產後餘疾矣小可虛羸失於將補便成大患終身悔而不及或有諸疾不論巨細後並有方藥醫療不得信庸醫妄投藥餌經云婦人非止臨產須憂產後大須將理慎不得恃身體和平取次為之乃縱心恣意無所不為若有觸傷便難整理犯時微若秋毫感病重如山岳知命者可不謹之

產後調理法第二

若產後將息如法四肢安和無諸疾苦亦須先服黑神

欽定四庫全書

婦人大全良方

散四服亦畧備補益圓散之類不可過多又恐因藥致

疾不可不戒

如四物湯四順理中圓內補當歸圓當歸建中湯

或產婦血盛初

經生產覺氣悶不安者調七寶散

在十九卷第二論中

服之若寧

帖不須服若三日後覺壯熱頭痛胸膈氣刺者不可便

作傷寒傷風治之此是乳脉將行宜服玉露散一二服

如無此證不須服

若因床帳大暖或產婦氣盛或素多喜怒覺

目眩暈如在舟車精神鬱胃者此是血暈即須服血暈

藥一二服

方見第五論

仍須看承之人照管問當也設或覺



粥食不美虛困即服四順理中圓一二服若不如此若

於兩三日間覺腹中時時撮痛者此為兒枕作痛必須

服治兒枕藥一二服方見第二十卷若大便秘或小便澀切不可

服通利藥以其無津液故也若投通利之藥則滑泄不

禁不可治也切須戒之若秘甚必欲通利方可服和暖

藥即通方見後二十卷第一論

產後通用方論第三凡二十三方

千金云凡產後滿百日乃可會合不爾至死虛羸百病

欽定四庫全書

婦人大全良方

滋長慎之 凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由此早行

房故也 凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下

塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例候兩三日消

息可服澤蘭圓比至滿月丸藥盡為佳不爾虛損不可

平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭圓補之服法

必七日外不得早服也 凡婦人因暑月產乳取涼太

多得風冷腹中積聚百病竟起迄至於死百方療不能

差桃仁煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬



須服一二劑以至年內常將服之佳	黑神散 治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胃	痞滿或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀	血諸疾並皆治之	熟乾地黄 蒲黃 炒 當歸 乾薑 炮 桂心 芍藥	甘草 各四兩 黑豆 炒去皮半升	右為細末每服二錢酒半棧童子小便半棧同煎調	服	欽定四庫全書 婦人大全良方	烏金散 治產後十八疾方論 方與局方黑神散同有	言語鄙俚故不錄	一曰產後因熱病胎死腹中者何但服烏金散 二	曰產難者何但服烏金散 三曰產後胞衣不下者	何但服烏金散 四曰產後血暈者何但服烏金散	五曰產後口乾心悶者何但服烏金散 六曰產後	乍寒乍熱者何但服烏金散 七曰產後虛腫者何	但服烏金散兼朱砂圓 八曰乍見鬼神者何但服



烏金散 九曰產後月內不語者何但服烏金散	十曰產後腹內疼痛兼瀉者何但服烏金散兼用止	瀉調氣藥 十一曰產後遍身疼痛者何但服烏金	散 十二曰產後血崩者何但服烏金散 十三曰	產後血氣不通咳嗽者何但服烏金散 十四曰產	後乍寒乍熱心痛月候不來者何但服烏金散 十	五曰產後腹脹滿嘔逆不定者何宜服烏金散次服	朱砂圓三二日炒生薑醋湯下七圓 十六曰產後	欽定四庫全書 婦人大全良方	口鼻黑氣及鼻衄者何論同此證不可治 十七曰	產後喉中氣喘急者何論同十死不治 十八曰產	後中風者何但服烏金散 已上論與郭稽中二十	一論問荅同故不詳錄	桃仁煎 療萬病婦人產後百病諸氣方	桃仁 一千二百枚去皮尖 及雙人煮令黃色	右一味擣令極細熟以上等酒一斗五升研三四遍	如作麥粥法以極細為佳納小長項瓷餅中密塞以



麵封之納湯中煮一復時不停火亦勿令火猛使餅口常出在湯上勿令沒之熟訖出溫酒服一合日再服丈夫亦可服	千金增損澤蘭圓 療產後百病理血氣補虛勞	澤蘭 甘草 當歸 川芎 附子 乾薑	白朮 白芷 北細辛 北防風 人參	牛膝 栝子仁 熟地黃 石斛 厚朴	藁本 蕪荑 麥門冬 桂心	欽定四庫全書 婦人大全良方	右二十味為末煉蜜圓如梧桐子大溫酒下二十元	產後醋墨	松煙墨不拘多少用炭火煨通紅以米醋淬之再煨	再淬如此七度研令極細用絹羅過纔產了喫醋墨	二錢用童子小便調下	四味湯 療產後一切諸疾纔分娩喫一服尤妙	當歸 延胡索 血竭	沒藥 各等分



右為細末每服各抄半錢用童子小便一錢煎至六分通口服	玉露散 治產後乳脉行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澀滯悉能治之涼膈壓熱下乳	人參 白茯苓 甘草 各半 兩 苦梗 炒 各一 當歸 一 兩 芍藥 三 分	右為細末每服二平錢水一錢煎至七分溫服如煩熱甚大便秘者加大黃二錢半	欽定四庫全書 婦人大全良方	地黃煎 治產後諸疾	生地黃汁 生薑汁 各一 升 藕汁 半 升 大麻仁 三 兩 去 殼為末	右和停以銀器內慢火熬成膏溫酒調半匙服更以北朮煎膏半錢入之尤佳 產寶方無麻仁用白蜜	治產後虛憊盜汗嘔吐	理中圓 治新產血氣俱傷五臟暴虛肢體羸瘦乏氣多汗纔產直至百晬日常服壯氣補虛和養臟氣蠲除餘疾消穀嗜食



甘草 二兩一 方三兩 白朮 人參 乾薑 各一兩	右為細末煉蜜為圓如梧桐子大溫米飲下三十圓	空心服纔產了以童子小便打開點服七日內日三	服 產乳方云此乃大理中圓加甘草兩倍耳然其	功比之四味等分大故不同蓋取甘味以緩其中而	通行經絡之功最勝者也此產婦月內不可闕者出	月不須服矣 古方中有婦人補益之藥如大澤蘭	圓小白薇圓熟乾地黃元大聖散之類其藥味稍衆	欽定四庫全書 婦人大全良方	而中下之家村落之地卒何以致且藥肆中少有真	者不若以四順理中圓易之較其功比澤蘭圓之類	主治頗多也	黑龍丹 治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾	垂死者但灌藥得下無不全活神驗不可言	當歸 五靈脂 川芎 良薑 熟地黃 各一兩	右細剉以沙合盛赤石脂泔縫紙筋鹽泥固濟炭火 十斤煨令通赤去火候冷取開看成黑糟色取出細



研却入後藥

百草霜

五兩

硫黃

乳香

各一錢半

花蘂石

琥珀

各一錢

右五味並細研與前五味再研如法修製和勻以米醋煮麵糊圓如彈子大每服一圓炭火燒令通赤投于生薑自然汁與童子小便入酒漉出晒乾研細只用此酒調下 茂恂熙寧初從事濮上幙府郡之蓐醫胡者為予言數政之前有朱汴水部施黑龍丹凡產後諸病危甚垂死者無不愈郡中及村落人賴以全活者甚衆汴受代歸婦人數千號泣遮道送行尚有一二粒未之施也先人自三峯謫官淮陽家嫂馬氏蓐中大病醫者康從變投丹立愈訪之乃得於汴也且言每鬻一粒輒受千錢必其獲厚利不欲求之後起守汝海從變餞別一驛臨行出此方為獻每以救人無不驗者盧道原侍郎再帥陞原時姨母妊娠至臨潼就蓐後數日有盜夜入其室驚怖成疾衆醫不能治乃以恂弟嘗遺此藥服之遂安家人金華君

欽定四庫全書

婦人大全良方



在秦生文度數日苦頭痛未止又心痛痛發兩股上下走注疾勢甚惡昏躁煩憤目視燈如金色勺飲不下服藥甚衆無效恠弟曰黑龍丹可服初以半粒投之即能飲粥而他藥入輒吐出不受覺痛稍緩又投半粒又得安眠自中夜服藥至五鼓下惡物數升頭痛頓減又至食時復下數升渙然醒愈蓋敗血所致其效如此建中靖國元年五月二十日郭茂恂記仲氏嫂金華君在秦產七日而不食始言頭痛頭痛而

欽定四庫全書

婦人大全良方

心痛作既而目睛痛如割如是者更作更止相去纔瞬息間每頭痛甚欲取大石壓食久漸定心痛作則以十指抓壁血流掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是者十日不已國醫二三輩郡官中有善醫者亦數人相顧無以為計且言其藥犯芎可以愈頭痛犯薑黃可以治心痛率皆悠悠不根之言竟不知病本所起張益困頓醫益術殫予度疾勢危矣非神丹不可愈方治藥而張召予夫婦付以諸子與仲氏別



慘怛不復言予瞋目戒張曰弟安心養疾亟出召伯	氏曰事急矣進此丹可乎仲氏尚遲遲以兩旬不食	恐不勝任黃昏進半粒疾少間中夜再服藥下瞋目	寢如平昔平旦一行三升許如蝗虫子三疾減半已	刻又行如前則頓愈矣遣荆釵輩視之奄殆無氣午	後體方涼氣方屬乃微言索飲自此遂平復大抵產	者以去敗惡為先血滯不快乃至是爾後生夫婦不	習此理老媪庸醫不能中病所以疾苦之人十死八	欽定四庫全書 婦人大全良方	九大數雖定豈得無夭不遇良醫終抱遺恨今以施	人俾終天年非祈于報者所冀救疾苦養性命爾崇	寧元年五月五日郭忱序	當歸散 療產後氣血俱虛慎無大補恐增客熱別致	他病常令惡露快利為佳	當歸 芍藥 川芎 黃芩 各一兩 白朮 半兩	右為細末溫童子小便或酒調下二錢 出指迷方又 出傷寒括要	周頌傳授濟急方四道



頤嘗見人傳經效諸方自曾修合實有大功遂編于卷 末普用傳授以濟急難治產後血暈血氣及滯血不散 便成癥瘕兼瀉面色黃腫嘔吐惡心頭痛目眩口吐清 水四肢羸弱五臟虛怯常日睡多喫食減少漸覺羸瘦 年久變為勞疾如此所患偏宜服勝金圓		澤蘭葉四兩 芍藥 蕪荑仁 甘草 當歸 芎藭		各六分 乾薑 桂心 各三分 石膏 桔梗 細辛 厚		朴 吳茱萸 栝子仁 防風 烏頭炮 白薇		欽定四庫全書 婦人大全良方		枳殼 南椒 石領 蒲黃 石斛 茯苓 各三分		白朮 白芷 人參 青木香 藁本 各一分		右揀擇上等州土如法修製為末煉蜜圓如彈子大 有所患熱酒研一圓入口便愈大忌腥膩熱麵豉汁 生葱冷水菜子等若死胎不下胎衣在腹並以炒鹽 酒研服未效再服		治產後諸疾聖散子 方與局方大聖澤蘭散同但無 地黃阿膠桔梗故不錄	



黑散子 神效產後一切疾	鯉魚皮 三兩 芍藥 蒲黃 各二兩 當歸 沒藥 桂	心 好墨 卷栢 青木香 麝香 各一兩 丈夫髮	灰 鎔墨 各半兩	右為細末以新瓷器盛密封勿令走氣每產後以好	酒調下一錢匕如血暈衝心下血不盡臍下攪刺疼	痛不可忍塊血癥疾甚者日加兩服不拘時候忌冷	物菓子粘食	欽定四庫全書 婦人大全良方	保生元 方與局方同却無麻仁有川椒故不復錄	朱砂元 治產後虛中有積結成諸疾	黑附子 桂心 白薑 各半兩 巴豆 一錢醋浸煮去皮研	右為細末入巴豆研停醋煮麵糊元如麻子大每服	三圓至五圓冷水下服之取瀉為度	薑粉散 纔產服此蕩盡兒枕除百病	當歸 人參 木香 黃耆 川芎 甘草 茯	苓 芍藥 桂心 知母 大黃 炒 草豆蔻 白



術 良薑 訶子 青皮 熟地黄 許少附子 重半兩一	右除地黄附子外各等分焙乾生薑一斤研取自然汁于碗中停留食久傾去清汁取下面粉脚攤在弱葉上入焙籠焙乾擣羅為末纔產後用藥三錢水一錢薑三片棗一箇煎至七分熱服服後產母自然睡着半日以來睡覺再服全除腹痛每日只三服至九日不可服肚中冷也	欽定四庫全書 婦人大全良方	地黄酒 治產後百病未產一月先釀產訖可服	地黄汁 好麴 好淨秫米 各二升	右先以地黄汁漬麴令發準家法釀之至熟封七日取清者服常令酒氣相接勿令絕忌蒜生冷鮓滑雞猪肉一切毒物婦人皆可服之但夏三箇月不可合春秋宜合以地黄汁并滓內米中炊合用之若作一碩十碩準此一升為率先服當歸湯後服此妙	地黄元 治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀或



胎衣不下失音不語心胃脹滿水穀不化口乾煩渴寒	熱往來口内生瘡咽喉腫痛心中忪悸夜不得睡產後	中風角弓反張面赤牙關緊急或崩中如豚肝臍腹疔	痛煩躁恍惚四肢腫滿及受胎不穩唇口指甲青黑	地黄減半當歸一兩延胡索琥珀各一兩名琥珀地黄元治狀同	生地黄 研取汁 生薑 各二斤研取汁留滓 蒲黃 各四兩 當歸 各四兩	右于銀石器內用慢火取地黄汁炒生薑滓以生薑	汁炒地黄滓各令乾四味同焙乾為細末醋煮麵糊	欽定四庫全書 婦人大全良方	圓如彈子大每服一圓食前用當歸酒化下神妙	琥珀散 治產後一切危困之疾	琥珀 朱砂 麝香 香墨 醋炙 白殭蚕 當歸 各一	分 鯉魚鱗 炒焦 桂心 百草霜 白附子 梁上塵	炒令煙出篩過秤各半兩	右為細末炒生薑熱酒調下二錢產後一切病服之	奇效	治產後諸疾如產卧畢切須用童子小便調黑神散數



服除百病如無小使用白湯亦可	或產勞力過度或下血頗多或微熱惡露來遲	馬尾大當歸 洗一兩半	右在未產前修製為末如遇產有疾無疾若產了但	用童子小便調服令產婦月後並無他證果有神效	療產後雖甚通利唯覺心腹滿悶脇脹咳嗽不能食大	便不通眼澁行坐心腹時痛 許仁則秘方三道	白朮 當歸 桑白皮 大黃 各三兩 細辛 桂心	欽定四庫全書 婦人大全良方	各二兩 生薑 四兩	右呔咀用水二升煎取一升分為三服如人行七八	里久再服此湯當得利利又不宜過多所利者為不	獲已而微利之其不然未合令利既初產後覺身皆	虛尚藉藥食補之豈宜取利此緣病熱既要不利苟	以當塗服湯得通氣息安帖利既未止即便須急取	三匙醋飯喫即止止後但須適寒溫將息後取痊復	飯食之節量其所宜如利不減宜依後方服之 產後不宜



輕易便投大黃如不得已後人更斟酌強弱而用之方得穩當
當歸 分十 白朮 分八 甘草 分七 細辛 分四 桂心 人參 生
薑 分各三 桑白皮 分六
右為末煉蜜圓如梧桐子大空心溫酒下三十圓
產後血氣不通當時不甚覺如在產出血少皆成癥結
心便疼硬乍寒乍熱飲食不進不生肌肉心腹有時刺
痛口乾粘手足沉重有此狀者宜此藥
當歸 芍藥 甘草 牛膝 鬼箭羽 人參 各五
欽定四庫全書 婦人大全良方
分 牡丹皮 虎杖 白朮 分各六 大黃 分八 乾地黃 分七
朴硝 分十 烏梅肉 炒 白薇 桂心 分各四 水蛭 炒 蒲黃
分各三 蜜虫 枚製十四
右為末煉蜜圓如梧桐子大空心酒下二十圓日兩
服外臺有石脂十分 許公在西京為女秘妙不傳此方于人後仁則女壻尋得依狀
相傳萬不失一 餘散歸本門
產科序論 陳無擇
世傳產書甚多千金外臺會王產寶馬氏王氏崔氏皆



有產書巢安世有衛生寶集子母祕錄等備則備矣但
倉卒之間未易歷試惟李師聖序郭稽中產科經驗寶
慶集二十一篇凡十八方用之頗效但其間序論未為至
當始用料理簡辯于諸方之下以備識之者非敢好辯
也愚詳產後要病無出于郭稽中二十一論一十八方
也有益于世多矣予家三世用之未有不效雖陳無擇
所評或是或否亦不可不詳而究之且如產後眩暈以
牡丹散然其中有大黃芒消況新產後血氣大虛豈宜
輕服又云去血過多而暈者或有之若言痰暈者十無
一二又如產後熱悶氣上轉為腳氣不應用小續命湯
僕以百問中方加減而用之此活法也故
孟子云盡信書則不如無書此之謂也

欽定四庫全書

婦人大全良方

胞衣不出方論第四

凡二十
二方

夫有產兒出胞衣不落者世謂之息胞由產初時用力
此產兒出而體已疲憊不能更用力產胞經停之間而
外冷氣乘之則血道澁故胞衣不出須急以方藥救治
不妨害于兒所柰者胞係連兒臍胞不出即不得以時
斷臍浴洗冷氣傷兒則成病也舊法胞衣不出恐損兒
者依法截臍而已產處須順四時方面并避五行禁忌
者若有觸犯多令產婦難產雖腹痛者未產也欲腹痛



連腰痛甚者即產也所以然者腎係於腰胞係腎故也
 診其脉轉急如切繩無殊者即產也郭稽中論曰胎衣
 不下者何荅曰母生子訖流血入衣中衣為血所脹是
 故不得下治之稍緩脹滿腹中以次上衝心胸疼痛喘
 急者但服奪命丹以逐去衣中之血血散脹消胎衣自
 下而無所患更有牛膝湯等用之甚效錄以附之

奪命丹

附子 半兩 炮 牡丹皮 一兩 乾漆 一分 碎之 炒令煙盡

欽定四庫全書

婦人大全良方

右為細末以釀醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥
 圓如梧桐子大溫酒吞五七圓不拘時

必效方牛膝湯 治胎衣不出腹臍堅脹急痛即殺人
 服此藥胞即爛下死胎

牛膝 瞿麥 各四兩 當歸 三兩 通草 六兩 滑石 八兩 葵子 五兩

右細切以水九升煮取三升分三服若衣不下腹滿
 即殺人推其源皆是胞衣有血奔心是以不出也或
 坐婆生踈斷帶收兒時衣失于繫住則帶縮入腹中



便不得出宜服此藥衣即爛出也廣濟集驗千金崔氏同

花藥石散 治產後氣欲絕緣敗血不盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭暖急以童子小便調一錢取下惡物如猪肝終身無血風血氣疾膈上有血化為黃水即吐出或小便中出也若先下胎衣則泛泛之藥不能達若先治血悶則尋常之藥無此功無如此藥有兩全之妙也

欽定四庫全書

婦人大全良方

花藥石 斤一 上色硫黃 兩四

右二味相拌令均先用紙和膠泥固瓦罐子一箇內可容藥候泥乾入藥在內密泥封口了焙籠內焙令透熱便安在四方磚上磚上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自己午時從下生火令漸漸上徹有墜下火放夾火上直至經宿火冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以絹羅至細釐合內盛依法用之此藥便是療金瘡花藥石散尋常人自宜時時收蓄以防急難至妙



有一親戚婦人產後胞衣不下血脹迷悶不記人事告之曰死矣僕曰某收得趙大觀文局中真花蘂石散在笥中謾以一貼贈之以童便調灌藥下即甦衣與惡物旋即隨下乘興無恙	牛膝散 治妊娠五六月墮胎胞衣不出	牛膝 川芎 朴硝 蒲黃 桂心 當歸 各三兩 半兩 一兩	右為粗末每服四錢水一盞薑三片生地黄一分煎至六分去滓溫溫頻服	若胞衣不出若腹脹則殺人	黑豆 一合炒 令熟	右入醋一盞煎三五沸去豆分為三服酒煮亦可必效方療胞衣不出方 服蒲黃如棗大集驗千金崔氏同	又方 以生地黄汁一升苦酒三合煖服之	救急一方 見子死腹中論中



又方 以水嚙產婦面神驗	延年方 以洗兒水令產母飲半瓊其衣便下勿令產	婦知	又方 牛膝 一兩 葵子 一合	右擣碎以水一瓊半煎至一瓊去滓分二服	廣濟 療胞衣不出方	右以末竈突中土三指撮以水服之集驗千金備急	文仲同	欽定四庫全書 婦人大全良方	又方 竈下土 一六寸 研碎 用好醋調令相合納臍中續煎	生甘草湯三四合服	又方 以醋湯飲之出	又方 雞子一枚苦酒一合和飲之立出	一方 用葶蘇子名如聖膏 見產難門	延年方 療胞衣不出腹脹則殺人	吞雞子黃三箇仍解髮刺喉中令嘔即出若困極以	水煮螻蛄一枚二十沸灌入口中汁下即出崔氏同



救急方 用赤小豆 男用七粒女用十四粒 東流順水吞下	產乳 療產後惡血衝心或胞衣不下腹中血塊等疾	同備急	右大黃一兩為末以好醋半斤熬成膏以藥末搜膏	為圓如梧桐子大溫醋湯吞五圓良久取下惡物不	可多服	療胞衣不下	栝樓實一箇 取子研令細	欽定四庫全書	婦人大全良方	右酒與童子小便各半棧煎至七分去滓溫服 如無實根	得亦	又方 紅花 一兩 酒煮濃汁服	又方 以鹿角鎔屑三分為末煮葱白湯調下	凡欲產時必先脫常所着衣以籠竈胞衣自下仍易產	神驗	廣濟方云取夫單衣蓋井上立出千金集驗救急崔氏	小品同



治胞衣不下訣

婦人百病莫甚于生產產科之難臨產莫甚于催生既
產莫甚于胞衣不下惟有花藥石散一件最為緊要如
黑神散琥珀散諸方之類雖皆有驗然鄉居或遠于藥
局倉卒之間無法可施今採得胡氏寶慶方一妙法云
若產訖胞衣不下停待稍久非特產母疲倦又且血流
入胞中為血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危篤若有
此證宜急斷臍帶以少物繫墜

以物繫墜之時切宜用心先繫然後截斷不爾

欽定四庫全書

婦人大全良方

則胞上掩心而死

使其子血脉不潮入胞中則胞衣自當痿縮

而下縱淹延數日亦不害人只要產母心懷安泰終自
下矣屢試有驗不可輕信坐婆妄用手法多有因此而
亡深可浩歎所以胡氏重引親見為據

產後血暈方論第五

凡十六方

論曰產後血暈者由敗血流入肝經眼見黑花頭目旋
暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈細酒調黑
神散最佳庸醫或作暗風中風治之凡暈血熱乘虛逆



上蒸心故昏迷不省氣閉欲絕是也然其由有三有用
心使力過多而暈者有下血多而暈者有下血少而暈
者其暈雖同其治特異當詳審之下血多而暈者但昏
悶煩亂而已當以補血清心藥治之下血少而暈者乃
惡露不下上搶于心心下滿急神昏口噤絕不知人當
以破血行血藥治之古法有云產婦纔分娩了預燒秤
鎚或江中黃石子硬炭燒令通赤置器中急于床前以
醋沃之得酸氣可除血暈產後一臈不妨時作為妙崔

欽定四庫全書

婦人大全良方

氏云凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空所致欲分
者第一須先取釀醋以塗口鼻仍置醋于傍使聞其氣
兼細細飲之此為上法如覺暈即以醋嚥面甦來即飲
醋仍少與解之一云仍少與水解之一法燒乾漆令煙濃熏產母
面即醒如無乾漆以舊破漆器以猛火燒熏之亦妙

郭稽中論曰產後血暈者何荅曰產後氣血暴虛未得
安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶
絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此



治之病必難愈但服清魂散即省	清魂散方	澤蘭葉 人參 各一分 荊芥 一兩 川芎 半兩	右為末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即	開眼氣定即醒 一方有甘草二錢	若去血過多而暈者當服芎藭湯 方見第二卷通用門 當歸芍藥	湯 方見十二卷論 廣濟 治產後血暈心悶不識人神言	鬼語氣急欲絕	欽定四庫全書 婦人大全良方	芍藥 甘草 各一兩 丹參 四分 並 生地黄汁 一升 生薑	汁 白蜜 各一合	右水二升先煎前三味取八分下地黄生薑汁蜜分	為兩服	又方	荷葉 二枚 真蒲黃 一兩 甘草 二兩 生地黄汁 半升 白蜜 一匙	右切細以水三升煮取一升去滓入蒲黃蜜地黄汁	暖服立愈



療產後血暈心悶	蒲黃 分四 紫葛 芍藥 分八 紅花 分十二	右咬咀以水二升煎至七合入生地黄汁二合更煎	三五沸每服三合	產後血暈心悶亂恍惚如見鬼	生益母草汁 三合根亦可 生地黄汁 二合 童子小便 一合雞	子清 三合	右煎三四沸後入雞子清攪停作一服	欽定四庫全書	婦人大全良方	產後血暈狂語不識人狂亂	童子小便 五合 生地黄汁 一合 赤馬通 七枚 紅雪 八分	右以上二味浸赤馬通絞去滓下紅雪溫為兩服	獨行散 治產後血暈昏迷不省衝心悶絕 衛生方名立應散	五靈脂 半生半炒二兩	右為末溫酒調下二錢口噤者拗開口灌之入喉即	愈一方加荊芥等分為末童便調下	又方 治產後血暈



右神麴為末熱水調二錢

療產後血暈狂言煩渴不止

生香附子

去毛

右為末每服二錢水一錢薑三片棗一箇煎至七分

溫服

治產後血暈危困國醫以此方獻禁中用之大效厚獲

賞賚時庚寅歲也

生地黄汁

一大

當歸

一分

赤芍藥

一分

欽定四庫全書

婦人大全良方

右水煎三五沸溫服如覺煩熱去當歸入童子小便

半錢妙

張氏方 治產後血暈全不省人事極危殆者

用韭菜切入在一有嘴甕瓶內煎熱醋沃之便密縛

瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋氣透入須先扶病人

起惡血衝心故有此證韭能去心之滯血加以醋氣

運達之用無不效

近效方 療血暈絕不識人煩悶言語錯亂惡血不盡



腹中絞痛胎死腹中紅藍花酒

紅花
一兩

右為末分二服每服酒二盞童子小便二盞煮取盞
半候冷分為二服留滓再煎 一方無童便

崔氏療產乳暈絕方

以洗兒水飲三合良 或以惡血服少許良

又方 半夏
洗不以多少

右為末圓如大豆內鼻中即省亦療五絕指迷文仲

欽定四庫全書

婦人大全良方

同

又方 生赤豆子禱為末取東流水和服方寸匕不瘥
再服救急同

奪命散 治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失志
及產後百病

沒藥 血竭
等分

右細研為末纔產下便用童子小便與細酒各半盞
煎一二沸調下二錢良久再服其惡血自循下行更



不衝上免生百疾專治婦人方只用白湯調 五羊
洪運使_{上天}子舍孺人產後語言顛倒譫語不已如
有神靈服諸藥無效召予診之六脉和平僕以此藥
兩服而愈

產後顛狂方論第六 凡三方

療產後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟宜用局方
大聖澤蘭散_{除是自合者方有效}加好辰砂研令極細每服加一
字許煎酸棗仁湯調下一服可安

欽定四庫全書

婦人大全良方

何氏方 療產後因敗血及邪氣入心如見祟物顛狂
方

用大辰砂一二錢重研令極細用飲兒乳汁三四茶
脚許調仍掘紫頂活地龍一條入藥候地龍袞三袞
取出地龍不用不令帶藥出但欲得地龍身上涎耳
却入無灰酒與前乳汁相合七八分瓊重湯溫遇疾
作分三二服

余家荆布方產一日忽見鬼物言語顛倒遂取自



合蘇合香圓一錢重以童子小便調服即醒神思
如故

產後狂言謔語如有神靈方論第七 凡一

夫產後言語顛倒或狂言謔語如見鬼神者其原不一

須子細辯證用藥治療產後驚風言語亂道如見鬼神

精神不定者研好朱砂酒調下龍虎丹 見局 三圓作一

服兼琥珀地黃圓服之 一則因產後心虛敗血停積

上干于心而狂言獨語者當在第十九卷第一論求之

欽定四庫全書

婦人大全良方

二則產後臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自

覺知神思不安者當在十九卷第二論求之 三則宿

有風毒因產心虛氣弱腰背強直或歌哭嗔笑言語亂

道當作風癰治療當在十九卷第三論求之 四則產

後心虛中風心神恍惚言語錯亂當在十九卷第四論

求之 五則產後多因敗血迷亂心經而顛狂言語錯

亂無常或暈悶者當于本卷第五六論求之 六則因

產後感冒風寒惡露斬然不行憎寒發熱如瘧晝日明



了暮則譫語如見鬼狀當作熱入血室治之宜琥珀地	黃圓及四物湯只用生乾地黄加北柴胡等分煎服如	不退者以小柴胡湯加生乾地黄如黃芩分兩煎服愈	雖然已上諸證大抵胎前產後之疾自有專門一定之	法毫髮不同如產後首當逐敗生新然後子細詳辯疾	證不可妄立名色自立新意妄自加減方藥大宜對證	依古法施治未有不妥者也	琥珀地黄圓 方見十九卷第二論 四物湯 方見二卷第五通用方	欽定四庫全書 婦人大全良方	小柴胡湯 方見六卷第五論	治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者 男六德續添	乾荷葉 生地黄 乾 牡丹皮 等分不以多少	右三味濃煎湯調生蒲黃二錢匕一服即定	產後不語方論第八 凡二方	論曰產後不語者何荅曰人心有七孔三毛產後虛弱	多致停積敗血閉于心竅神志不能明了又心氣通于	舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服七珍散



婦人大全良方卷十八									
欽定四庫全書									
婦人大全良方									
右每服一錢以熟水調下									
白礬									
細研									
胡氏孤鳳散 治產後閉目不語									
右為細末每服一錢薄荷湯調下不拘時									
防風 辰砂									
別研各半兩									
人參 石菖蒲 生乾地黄 川芎									
各一兩									
細辛									
一錢									



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷十九

詳校官太醫院恩糧臣 朱天錫
編修臣 倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣 王燕緒
校對官中書臣 葉 蘭
滕錄監生臣 曹方昇



欽定四庫全書	
婦人大全良方卷十九	
宋 陳自明 撰	
產後乍見鬼神方論第一 凡三方	
論曰產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣虛則敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁卧起不安乍見鬼神言語顛錯醫人不識呼為風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦	
欽定四庫全書	
婦人大全良方	
一捻得睡即安	
調經散方	
沒藥	琥珀
並細研	
桂心	各一錢
芍藥	當歸
各一分	
麝	
香	細辛
各半錢	
右為末每服半錢生薑汁溫酒各少許調服	
栝子仁散 治產後狂言亂語皆由內虛敗血挾邪氣	
攻心	
栝子仁	遠志
去心	
人參	桑寄生
防風	琥



珀別研當歸炒生地黃焙甘草等分	右為粗末先用白羊心一箇切片以水一大錢半先 煮至九分去羊心入藥末五錢煎至六分去滓無時 服	茯神散 治產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不安	茯神一兩去皮人參一兩龍齒研琥珀研赤芍藥 黃耆	牛膝各三分生地黃一兩半桂心兩半	右為末每服三錢水一錢煎至七分不拘時去滓溫	欽定四庫全書 婦人大全良方	服	產後臟虛心神驚悸方論第二 凡七方	夫產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經為 風邪所乘也或恐懼憂迫令心氣受於風邪風邪搏於 心則驚不自安若驚不已則悸動不安其狀目睛不轉 而不能呼診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為 悸矣	產乳七寶散療初產後服之調和血氣補虛安神壓驚



悸	辰砂 ^研 桂心 當歸 川芎 人參 白茯苓	羚羊角 ^{燒存性已} 乾薑 ^{一錢產科} 上各二錢 各等分	右為末每服一錢用羌活豆淋酒調下 ^{將護產} 如不	飲酒用清米飲調下 如覺心煩熱悶以麥門冬去	心煎水調下若心下煩悶而痛用童子小便調下若	覺心胃煩熱即減薑桂冷即加之腹痛加當歸心悶	加羚羊角心虛氣怯加桂心不下食或惡心加人參	欽定四庫全書 婦人大全良方	虛顫加茯苓以意斟酌日二夜一服	治產後臟虛心中驚悸志意不安言語錯亂不自覺知	茯神 遠志 人參 麥門冬 甘草 生地黃	當歸 龍齒 桂心 白芍藥 羚羊角 ^{等分}	右為粗末每服三錢水一棧薑三片棗一箇煎至六	分去滓溫服無時候	治產後心虛驚悸神思不安	龍齒 黃耆 白薇 生地黃 ^{各一兩} 人參 茯神



遠志 羌活 各三分 甘草 桂心 防風 各半兩 一方無黃耆 有荊芥與銀	右爲粗末每服三錢水一棧薑三片棗一箇煎至六分去滓無時服	治產後臟腑虛心怔驚悸言語錯亂	麥門冬 去心 人參 各八錢 牛黃 研 白薇 各二錢 茯神 獨	活 遠志 生地黃 朱砂 飛 防風 天竺黃	甘草 龍齒 研各四錢 龍腦 麝香 並細研各一錢	欽定四庫全書 婦人大全良方	右爲末用薄荷酒調下二錢	療血虛多驚及產後敗血諸疾	辰砂 琥珀 沒藥 並細研 當歸 爲末等分	右爲細末每服二錢空心日午臨卧白湯調服	產後驚風亂道言語如見鬼狀精神不定者研好朱砂	酒調下局方龍虎丹參圓作壹服兼琥珀地黃圓服之	琥珀地黃圓方	南番琥珀 別研 延胡索 糯米同炒赤去米 當歸 各一兩 蒲黃 四兩



炒生地黄 研裂汁 生薑 各二斤洗研裂汁留滓以 香 黃澤以地黄汁炒生薑 滓 各至乾堪為末則止	右為末煉蜜圓如彈子大食前當歸湯化一圓服	產後心驚中風方論第三 凡五方	論曰產後心悶氣絕眼張口噤遍身強直腰背反偃狀 如癰疾心忪驚悸言語錯亂皆是宿有風毒因產心氣 虛弱發成風瘕	療產後心氣虛損卒驚狂語或歌哭嗔笑性氣不定	欽定四庫全書 婦人大全良方	上等銀一斤 桂心 甘草 各六分 細辛 四分 人參 生薑 遠志 茯神 各八分 生地黃 二十分 龍骨 三分 棗子 一箇	右呔咀以水八升煮銀至一升半入藥煎至一升分 作三服溫進	療產後多虛羸弱若大汗利皆至於死此重虛故也若 患中風語謬昏悶不知人者	人參 茯苓 羌活 桂心 大棗 遠志 各十分	竹瀝 一升



右用水六升煮取三升下竹瀝更煎取二升温分三服	療產後心驚中風	防風 當歸 茯苓 防己 麻黃各八分 秦艽	人參 川芎 獨活 白鮮皮 甘草 白薇各六分	分石膏十二分 竹瀝二升	右水七升先煮麻黃掠去沫下諸藥入竹瀝煎取二	升半去滓温分三服忌菘菜猪肉生冷	欽定四庫全書 婦人大全良方	茯苓散 療產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛風邪所致	茯苓一方使 生地黄十二分 遠志 白薇 龍齒各十	分防風 人參 獨活各八分	右以銀一大斤水一斛五升煎取七升下諸藥煎取	三升温分三服忌如前 一方治產後風邪所干心	神恍惚志意不定加荆芥八分甘草五分	療產後心虛忪悸不定亂語錯誤精神恍惚不主當由



心虛所致									
人參 甘草 芍藥 當歸 生薑 遠志									
分各十 茯苓 分六 桂心 分六 麥門冬 分各十 大棗 分各十									
右爲散以水八升煮取三升去滓溫分三服									
產後中風恍惚方論第四 凡三方									
夫產後中風恍惚者由心主血血氣通於榮衛臟腑遍									
循經絡產則血氣俱傷腑臟皆虛心不能統於諸臟榮									
衛不足即爲風邪所乘則令心神恍惚不定也									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
千金療產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆因心虛									
所致									
茯苓 兩三 芍藥 兩二 甘草 桂心 當歸 兩各一 生薑 分六									
麥門冬 升一 大棗 枚三十									
右爲散水三升煎取一升去滓分作兩服食後									
經効療產後心虛忪悸志意不定煩躁恍惚									
茯神 當歸 黃芩 麥門冬 去心 甘草 人參									
芍藥 酸棗仁 白鮮皮 兩各三 大棗 七									



右爲粗末水二升煮取七合去滓溫服

療產後中風恍惚語澁四肢不利天麻圓

天麻 朱砂 防風 羌活 各一兩 僵蚕 三分 乾蝎

炒 白附子 炮 五靈脂 各半兩 雄雀糞 炒 牛黃 各一分

右爲末糯米軟飯爲員如梧桐子大以薄荷酒研十

五圓服之

產後所下過多虛極生風方論第五 凡一方

論曰產後所下過多虛極生風者何答曰婦人以榮血

欽定四庫全書

婦人大全良方

爲主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目眩神

昏命在須臾此但虛極生風也如此則急服濟危上丹

若以風藥治之則誤矣

濟危上丹方

乳香 研 五靈脂 硫黃 玄精石 同研 極細 阿膠 卷

栢 生 桑寄生 陳皮 各等分

右將上四味同研停於銀石器內微火炒勿焦了再

研極細復入餘藥爲末用生地黃汁和員如梧桐子



大每服二十員食前溫酒或當歸酒送下									
產後虛汗不止方論第六 凡八方									
夫虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗也因之遇風則變為瘧縱不成瘧則虛乏短氣身體柴瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也 亦可就第三卷第六論中求之									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
麻黃根散 治產後虛汗不止									
當歸 黃耆 麻黃根 牡蠣 澀為粉 人參 粉草									
各等分									
右咬咀每服四錢水一錢煎至七分去滓溫服									
又方 當歸 黃耆 各一兩 麻黃根 二兩									
右咬咀每服三錢水一錢煎至七分去滓溫服									
千金療產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸									
甘草 炙一兩	附子 半箇炮	桂心	芍藥 各一兩						



右咬咀每服三錢水一錢生薑四片棗一枚煎至七分去滓空心溫服忌猪肉冷水生葱等物	經効療產後汗出不止	黃耆十二分 白朮 牡蠣 茯苓 防風 麥門冬	心去生地黃各八分 大棗七箇	右咬咀水二升煎取七合去滓空心分溫兩服	又療產後血氣暴虛汗出	淡竹葉煎湯三合微溫服之須臾再服	欽定四庫全書 婦人大全良方	又方 馬齒莧研取汁三大合如無乾者亦可	右煮一沸投蜜一匙令停頓服	止汗散 治產後盜汗不止應多汗者皆可服	牡蠣煅研細 小麥麩炒令黃色研為細末	右等分研細煮生猪肉汁調下二錢無時候	人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗二方出胡氏	人參 當歸等分 右為末以猪腰子一隻去脂膜切小片子以水三升



糯米半合葱白兩條煮米熟取清汁一椀入藥二錢煎至八分溫服不拘時候

產後胃悶汗出不識人方論第七 凡一方

凡產後忽胃悶汗出不識人者暴虛故也

破雞子三枚吞之便醒若未醒可與童子小便一升

甚驗丈夫小便亦得切不得用病人者 又若久不

識人或時復發者此為有風因產血氣暴虛風行脉

中故也若產後去血多者又增此疾與雞子不醒者

欽定四庫全書

婦人大全良方

可急作竹瀝汁一服五合須臾不定再與五合頻與

三五服瘥

產後汗出多而變瘥方論第八 中風口噤角弓反張附

論曰產後汗出多而變瘥者何答曰產後血虛肉理不

密故多汗因遇風邪搏之則變瘥瘥者口噤不開背強

而直如發癰狀搖頭馬鳴身反折須臾拾發氣息如絕

宜速斡口灌小續命湯稍緩即汗出如雨手拭不及者

不可治也



小續命湯 治中風及剛柔二瘓及脚氣痺弱不能轉側兼治小兒驚風

麻黃 製可去 桂心 甘草 各半 防風 三錢 芍藥 三分

白朮 人參 川芎 附子 防己 黃芩 各一分

右咬咀每服五錢水一椀半煎至一椀去滓取八分

清汁入生薑汁再煎一二沸溫服日三服夜二服若

柔瘓自汗者去麻黃夏間及病有熱者去附子減桂

一半冬及初春去黃芩 第三卷雖有然其 雖然陳無

欽定四庫全書

婦人大全良方

擇評曰產後汗出多變瘓亦令服續命湯此又難信

既汗多如何更服麻黃官桂防己黃芩輩不若大豆

紫湯為佳太醫局方大聖散亦良藥也愚觀朱奉議

云凡剛柔二瘓小續命湯並可加減與之若柔瘓自

汗者有去麻黃加葛根之說朱奉議必有所據雖大

豆紫湯大聖散良亦不可偏見曲說有妨古人之意

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百

病或中風瘓瘓背強口噤直視煩熱脉緊大者不治



小品方主產後中風困篤背強口噤或但煩躁或頭身
皆重或身重痒劇嘔吐直視者

指迷方名
獨活湯

川獨活兩半大豆半升 酒三升

右先以酒浸獨活煎一二沸別炒大豆極焦煙出急
投酒中密封候冷去豆每服一二合許得少汗則愈
日拾服此藥能去風消血結如妊娠折傷胎死腹中
服此得差凡產後口噤腰背強直角弓反張皆名曰
瘓又名曰瘓古人察有汗無汗以分剛柔陰陽而治

欽定四庫全書

婦人大全良方

今產寶諸書有中風口噤一門又有角弓反張一門
其實一也如增寒發熱有類傷寒皆不論及豈可只
以一二藥治之愚今取百問中方論已詳備前篇

見三

卷第
二論 庶幾覽者如指諸掌

中風口噤角弓反張方論附

凡產後中風口噤是其血氣虛而風入於頷頰夾口之
筋也手三陽之筋結入於頷產則勞損腑臟傷於筋脉
風若乘之其三陽之筋脉則偏搏之筋得風冷則急故



令口噤也若角弓反張者是體虛受風風入於諸陽之經也人陰陽經絡周環於身風邪乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀也	愈風散 療產後中風口噤牙關緊急手足癱瘓如角	弓狀 亦治血暈四肢強直不省人事或築心眼倒吐	瀉欲死 出華佗方 百問經驗產寶陳氏本事同	荊芥 畧焙為末	右每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其效如	欽定四庫全書 婦人大全良方	神口噤者灌齒斷噤者吹鼻中皆效	一方用古老錢煎湯調服名一捻金散	一方云用舉卿古拜二味蓋切脚隱語以祕方也此藥	委有奇効神聖之功大抵產室但無風為佳不可衣被	帳褥太暖暖即汗出則腠理開易於中風便昏冒 指迷方但	為粗末 許學士云記有一婦人產後護密閣內更生	濃煎服 火睡久及醒則昏昏如醉不省人事其家驚	惶醫用此藥佐以交加散祝云服之即睡	睡中必以左手搔頭覺必醒矣果如其言	交加散 方見第二卷第五論 又名交解散 見產後虛煩



專治婦人方治產後中風不省人事口吐涎手足癱瘓	當歸 荆芥穗 等分	右為細末每服二錢水一盞酒少許煎至七分灌之	如牙關緊急用匙斡微微灌下但下咽即有生理不	問多少便服不可以藥味尋常忽之屢用救人有効	小品療產後中風虛人不可服他藥者一物獨活湯主	之及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮之	川獨活 三兩 細切	欽定四庫全書 婦人大全良方	右水三升煮取一升分服奈酒者亦可酒水煮	一方用白鮮皮亦依此法	產後中風瘧口噤面青手足急強者	以竹瀝二升分為五服溫溫頻服大効	治產後中風口噤四肢頑痺不仁身體如角弓反張羌	活酒	羌活 防風 各三兩 黑豆 一升炒 令烟出	右細剉以好酒一斗於瓶中攪動密封經半日許又



於鍋中重湯煮瓶至半日候瓶冷取出每服暖一中
錢飲之日可三四服度之當汗出即差

治產後中風身如角弓反張口噤不語方

川烏

五兩剉
如豆大

右取黑豆半升同炒半黑以酒三升瀉於鐺內急攪
以絹濾取酒微溫服一小錢取汗若口不開者拗開
口灌之未効加烏雞糞一合炒內酒中服之以瘥為度
寶方療產後腹中堅硬兩脇膈脹手足冷心中煩熱欲

欽定四庫全書

婦人大全良方

飲水乾嘔關節勞瘵中風之疾

羚羊角

二分

防風

十二分

羌活

苦梗

敗醬

各八分

桂心

柴胡

大黃

浸過各
六分

右水二升煎取八合空心兩服服了吐即良久更服
了喫地黃酒用地黃切一升炒令黑甕瓶中下熱
酒三升密封口煮令減半任意服之

千金雞屎醴療產後中風及男子諸風并產後百疾神

効方又治產後中風口噤拘急困篤腰背強直時時反折



烏雞屎 升三 大豆 升二	右先炒豆令聲絕次炒雞屎令黃以酒一升先淋雞屎取汁淋大豆每服一升重者凡四五服之極妙	深師療產後中風口噤不任大小	獨活 分八 乾葛 分六 甘草 分二 生薑 分五	右咬咀以水二升煮取一大升分為兩服	張文仲療產後中風風癰遍身冷直口噤不識人方	白朮 四兩細切	欽定四庫全書 婦人大全良方	右以酒三升煮取一升頓服効	經效療產後中風腰背強直時時反張名曰風癰	防風 葛根 川芎 地黄 各八分 麻黃 去節 甘草	桂心 川獨活 防己 各六兩 杏仁 五箇去皮尖炒	右細切以水八升煮麻黃去沫後下諸藥煎取三升	分溫三服 有汗者不可服	治產後中風口噤潰悶不能言身體強直	羌活 防風 秦艽 桂心 粉草 葛根 各三分



生薑八分 附子一箇

杏仁八十枚 麻黃十分
炮 去皮尖 去節

右咬咀水九升煮麻黃去沫後下諸藥煮取二升分

為三服有汗者不可服

產後中風方論第九 凡七方

論曰產後中風由產傷動血氣勞損臟腑未平復起早

勞動氣虛而風邪氣乘虛傷之故中風風邪冷氣客於

皮膚經絡但疼痺羸乏不任少氣若筋脉挾寒則攣急

喝僻挾溫則緩弱若入諸臟恍惚驚悸隨其所傷臟腑

欽定四庫全書

婦人大全良方

經絡而生病焉

郭稽中產後中風方論

論曰產後中風者何答曰產後五七日內強力下床或

一月之內傷於房室或懷憂怒擾盪冲和或因着艾傷

動臟腑得病之初眼澁口噤肌肉攣搐漸至腰脊筋急

強直者不可治此乃人作非偶爾中風所得也

陳無擇評曰問產後中風風是外邪血虛則或有中之者

直答以人作不可治問答不相顧解如何開示後人立



論之難有如此者若是中風當以脉辨看何臟依經	調之強力下床月內房室憂怒着灸非中風類蓐勞性	氣火邪治各有法非產後病不暇繁引學者識之	經効療產後風虛頭目痛語言時僻	防風 乾葛 茯苓 麥門冬 芍藥 黃	芩 犀角 甘草	右呖咀以水二升煎取七合分為兩服	療產後中風心忪悸志意不定恍惚語言錯亂方	欽定四庫全書 婦人大全良方	人參 羚羊角 麥門冬 茯神 黃芩 白	鮮皮 甘草 石膏 淡竹瀝	右呖咀水二大升煎至七合下竹瀝分三服	療產後中風身背拘急如束并渴	川芎 羌活 羚羊角 酸棗仁 芍藥 桑	白皮 防風	右呖咀水四升煎取二升分溫三服	療產後中風四肢拘束筋節掣痛不得轉側如角弓反張



麻黃八分去根節 生薑 桂心 白朮各四分 防風 芍	藥各六分 川芎五分 竹瀝二合	右細剉以水三升先煮麻黃掠去沫下諸藥煎取七	合下竹瀝再煎三沸分三服取微汗為度	治產後納涼太過中風者或成喘急唇青鼻黑男六德續添	以局方小續命湯連進三服即愈	療產後中風煩渴	紅花子五合炒微熱研碎	欽定四庫全書 婦人大全良方	右以水一升煎取七合每一匙頭徐徐呷	治產後中風半身手足不遂言語謇澁恍惚多忘精神	不定	川獨活 當歸 芍藥 防風 川芎 玄參各二	分 桂心半	右細剉以水八升煮取二升半分為三服覺効又更	作一劑漸瘥須適寒溫將息如不差即以此方作元	每服二十元有熱加乾葛五兩有冷加白朮五兩有



氣加生薑六分手足不穩加牛膝五分草薢三兩黃 耆四兩腹痛加當歸芍藥各三分不食加人參二分 玄參四分		產後中風筋脉四肢攣急方論第十 凡四方		夫產後中風筋脉攣急者是氣血不足臟腑俱虛日月 未滿而起早勞役動傷腑臟虛損未復為風邪冷氣初 客於皮膚經絡則令人頑痺不仁羸乏少氣風氣入於 筋脉挾寒則攣急也		欽定四庫全書 婦人大全良方		治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強直		防風 一兩 赤芍藥桂心 各半兩 羚羊角 屑 川芎羌 活 當歸 酸棗仁牛蒡子 炒各三分		右咬咀每服四錢水一錢煎至六分去滓溫服		療產後中風睡卧不安筋脉四肢攣急或強直獨活散		獨活天麻防風 各一兩 桂心當歸荆芥		川芎蔓荊子 各半兩 麻黃 去節 附子 炮 羚羊角 屑 赤 芍藥 各三分	



右咬咀每服四錢水酒各半棧煎至六分去滓溫服 有汗者 莫服	療產後中風四肢筋脉攣急疼痛	羌活 天麻 酸棗仁 川牛膝 防風 當歸	薏苡仁 栝子仁 鹿角膠炒各一兩 蔓荊子 桂	心各半兩 羚羊角屑 附子炮 川芎各三分 麝香一分研	右為細末無時以豆淋酒調二錢服	治產後中風四肢筋攣急疼痛心神煩悶背項強直	欽定四庫全書 婦人大全良方	羌活 防風 附子炮去皮 羚羊角屑 麻黃去節各一兩	地黄 桂心各三分 酸棗仁炒 黃耆 當歸 川牛	膝 川芎 葶藶各半兩	右為細末煉蜜元如梧桐子大每服三十丸溫酒吞下	產後熱悶氣上轉為脚氣方論第十一 凡一方	論曰產後熱悶氣上轉為脚氣者何答曰產卧血虛生	熱復因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以着為	脚氣其狀熱悶掣癢驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也可



服小續命湯 方見本卷 第八論 兩三劑必愈若醫者誤以逐敗	血藥攻之則血去而疾益增矣陳無擇評曰脚氣固是	常病未聞產後能轉為者往往讀千金見產婦多有此	疾之語便出是證文辭害意槩可見矣設是熱悶氣上	如何便服續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經	脚氣要須依脚氣方論陰陽經絡調之此涉專門未易	輕論既非產後要病更不繁引 陳無擇雖有此評然	小續命湯加減與之用無不效故百問云寒中三陽所	欽定四庫全書 婦人大全良方	患必冷小續命湯主之 加生薑 汁最快 暑中三陰所患必熱小	續命湯 去附子減 桂心壹半 大煩躁者紫雪最良 僕取百問中加 減法庶使後人	均得 如無紫雪用真薄荷煎冷水嚼下	婦人大全良方卷十九



欽定四庫全書

婦人大全良方卷二十

宋 陳自明 撰

產後遍身疼痛方論第一

凡二方

論曰產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脉流
散遇氣弱則經絡肉分之間血多流滯累日不散則骨
節不利筋脉急引故腰背不得轉側手足不能動搖身
熱頭痛也若醫以為傷寒治之則汗出而筋脉動惕手
足厥冷變生他病但服趁痛散除之

欽定四庫全書

婦人大全良方

趁痛散方

牛膝

兩半

甘草

薤白

各一分

當歸

桂心

白朮

黃耆

獨活

生薑

各半兩

右呖咀每服半兩水三盞煎至盞半去滓食前服陳
無擇評曰趁痛散不特治產後氣弱血滯兼能治太
陽經感風頭疼腰痛自汗發熱若其感寒傷食憂
恐驚怒皆致身疼發熱頭痛况有蓐勞諸證尤甚趁



痛散皆不能療不若五積散入醋煎用却不妨

五積散

方見和劑局

產後腰痛方論第二

凡十方

論曰腎主腰脚產後腰痛者為女人腎位繫於胞產則

勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰

故令腰痛也若寒冷邪氣連滯背脊則痛久未已後忽

有娠必致損動蓋胞絡屬腎腎主腰故也

療產後風冷腰痛不可轉

欽定四庫全書

婦人大全良方

獨活 川芎 芍藥 桂心 續斷 生薑 桑

寄生

各六分

當歸

防風

各八分

右呖咀以水三升煮取一升去滓空心分二服

廣濟療產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉

敗醬

當歸

各八分

川芎

芍藥

桂心

各六分

右呖咀水二升煮取八合空心分溫二服並忌葱

救急療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胃滿氣

急兩脇痛方



生薑一斤淡竹葉切一升

右二味以水二升煮取一升去滓分溫二服

千金療產後中風腰背強痛中風煩熱苦渴頭身皆重

此因風冷所致及傷寒大豆酒方

大豆五升炒以酒一升投之密蓋令溫去豆服一

升日夜數服卧取微汗避風亦有加羗活者亦佳

廣濟療產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手脚疼不

下食生地黄湯方

欽定四庫全書

婦人大全良方

生地黄汁一升芍藥甘草各二兩丹參四兩蜜一合生薑

汁半合

右切以水三升煮取一升去滓內地黃汁蜜薑汁微

火煎一二沸一服三合日二夜三利一兩行中間進

食與藥更進服

陳氏如神湯亦効方見第四卷七論中

右生料五積散加桃仁煎亦妙此藥逐敗血去風濕

產後惡露方行忽然漸少斷絕不來腰中重痛下注兩



股痛如錐刀刺痛入骨中此由血滯於經絡不即通之 有大痛處必作癰疽宜桃仁湯恐作癰者預服五香連 翹湯	桃仁湯方	桃仁去皮 蘇木 生地黃各半 蜜虫去足 水蛭炒 三十箇	右為粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服無 時候惡露下即住服	欽定四庫全書 婦人大全良方	五香連翹湯方一方有大黃一兩	木香 沉香 丁香 乳香 麝香 升麻 獨	活 桑寄生 連翹 木通各二兩	右為粗散每服五錢水二盞煎至一盞入竹瀝少許 攪停去滓溫服	產後惡露不絕方論第三凡九方	夫產後惡露不絕者由產後傷於經血虛損不足或分 解之時惡血不盡在於腹中而臟腑挾於宿冷致氣血



不調故令惡露淋瀝不絕也	廣濟療婦人產後惡血不絕崩血不可禁腹中絞痛氣	息急療蓐中三十六疾	亂髮 燒一兩 阿膠 二兩 代赭 乾薑 各三兩 馬蹄 一箇 乾	地黄 四兩 牛角鰓 五兩	右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心米飲下三四十	圓日兩服	文仲葛氏療惡露不絕方	欽定四庫全書 婦人大全良方	右以鋸截桑木取屑五指撮酒服日三差	療產後泄血不止無禁度及治腹痛胃鬲悶	乾黃末酒服方寸匕日三四服 胡氏方云薑黃治惡露不止	療產後血不止虛羸迨死亦治血氣 二方並出產寶	蒲黃 二兩 水二升煎取八合頓服	獨聖湯 療產後亡血過多心腹微痛然後血下久而	不止亦治赤白帶下年深諸藥不能療者良驗此京師	祝景助教方



貫衆 狀如刺蝟者一箇全用不 剉斷只揉去毛花萼用之	右用好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為細末用米飲 調下二錢空心食前服	療產後七八日惡露不止	敗醬 當歸 各六分 芍藥 續斷 各八分 川芎 竹茹	各四分 生地黃 炒乾十分	右細剉以水二升煮取八合空心頓服	治產後虛羸臍腹冷痛淋露不止或惡物不下方 養生必用	欽定四庫全書 婦人大全良方	當歸 白芍藥 甘草 乾薑 桂心 熟地黃	蒲黃 各半兩 黑豆 炒一兩	右為細末溫酒調下二錢食前服米飲亦可似黑神散	牡蠣散 治產後惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢乏弱	不思飲食頭目昏重五心煩熱面黃體瘦	牡蠣 川芎 熟地黃 白茯苓 龍骨 各一兩 續	斷 當歸 炒 艾葉 酒炒 人參 五味子 地榆 各半兩	甘草 一分



右為末每服二錢水一中錢生薑三片棗一枚煎至
六分去滓食前服

產後惡露不下方論第四 凡六方

夫惡露不下者由產後臟腑勞傷氣血虛損或胞絡挾
於宿冷或產後當風取涼風冷乘虛而搏於血血則壅
滯不宣積蓄在內故令惡露不下也

療產後三四日惡露不下嘔逆壯熱

芍藥十分 知母八分 生薑 當歸 蒲黃各四分 紅花二分

欽定四庫全書

婦人大全良方

荷葉中心蒂七箇 生地黄汁二合

右細切以水二升煎至七合去滓下蒲黃煎四沸分

溫空心三服

治產後惡血衝心胎衣不下腹中血塊等備急丹 出產乳

右以錦紋大黃一兩杵為細末用醎醋半升同熬成

膏元如梧桐子大患者用醋七分盞化五元至七元

服之須臾血下即愈亦治墜馬內損惡血不出神効

此藥難用大段虛弱不可服仍調藥醋不宜太酸便



損肺臟全在醫者斟酌	荷葉散 療產後惡露不下腹中疼痛心神煩悶	乾荷葉 二兩 鬼箭羽 桃仁 劉寄奴 蒲黃 各一兩	右為粗末每服三大錢以童子小便一大盞薑錢三	片生地黃一分搥碎同煎至六分去滓無時熱服	廣濟療產後惡露不多下方	川牛膝 大黃 各八分 牡丹皮 當歸 各六分 芍藥	蒲黃 桂心 各四分	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為末以生地黄汁調酒服方寸匕日二服血下愈	生料五積散局方治產後惡露不快腹中疼痛或腹有	塊及發寒熱並加醋少許煎通口服亦能療血崩 見易簡方	不復重錄 產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒熱臍腹百脉	皆痛如以錐刺非常此由冷熱不調或思慮動作氣所	擁遏血畜經絡宜沒藥圓	當歸 一兩 桂心 芍藥 各半兩 桃仁 去皮尖 沒藥 研各一分	蜜蛭 去足翅炒 水蛭 炒各三十箇



右為末醋糊元如豌豆大醋湯下三元

產後餘血上搶心痛方論第五

凡三方

論曰夫產後血上搶心由產後氣虛挾宿冷冷搏於血則凝結不消氣逆上者則血隨上衝擊而心痛也凡產後餘血不盡得冷則留結與氣相搏則痛困重遇寒結血尤甚則變成血瘕亦令月水否澁不通也

論曰產後心痛者何答曰心者血之主人有伏宿寒因產大虛寒搏於血血凝不得消散其氣遂上衝擊於心

欽定四庫全書

婦人大全良方

之絡脉故心痛但以大岩蜜湯治之寒去則血脉溫而經絡通心痛自止若誤以為所傷治之則虛極寒益甚矣心絡寒甚傳心之正經則變為真心痛朝發夕死夕發朝死藥不可輕用如此

大岩蜜湯方

生乾地黄 當歸 獨活 吳茱萸 芍藥 乾

薑 甘草 桂心 小草 各一兩 細辛 半兩

右為散每服半兩水三錢煎至一錢去滓稍熱服評



曰產後心痛雖非產蓐常疾庸或有九痛未必便是	血痛設是岩蜜湯豈可用熟地黄熟地黄泥血安能	去痛此方本出千金用生乾地黄耳茱萸一升合準	五兩乾薑三兩細辛治陳寒在下焦方本一兩却減	半兩制芎制偶量病淺深自有品數不可妄意加減	然以岩蜜湯治血痛不若失笑散用之有效	失笑散 治心腹痛欲死百藥不効服此頓愈與第八	論紫金元大同小異 見本卷八論	欽定四庫全書 婦人大全良方	五靈脂 蒲黃 等分	右為末先用醎醋調二錢熬膏入水一盞煎至七分	食前熱服是驗	經心錄蜀椒湯療產後心痛此大寒所為方	蜀椒 二合 芍藥 三兩 半夏 當歸 桂心 人參 甘	草 茯苓 各二兩 生薑汁 五合 蜜 一升	右切以水九升煮椒令沸下諸藥煮取二升半去滓	下薑汁蜜等更煎取三升一服五合至六合 千金同



產後惡露不盡腹痛方論第六

凡十二方

論曰產後惡露不盡腹痛者何答曰產後惡血雖常通

行或因外感五邪內傷七氣致令斬然而止餘血停積

壅滯不行所下不盡故令腹痛 產寶云皆因妊娠當

風取涼則胞絡有冷至於產時其血必少或新產時而

取風涼皆令風冷搏於血血則壅滯不得宣通蓄積在

內有時惡露不盡故令腹痛

溫隱居澤蘭湯療產後惡露不盡腹痛往來兼胃滿少氣

欽定四庫全書

婦人大全良方

澤蘭煑

生乾地黄

當歸

各三分

芍藥

生薑

各十分

甘草

六分

大棗

十四箇

右細切以水九升煮取三升分為三服欲死塗身得

瘥

救急療惡露不盡腹脹痛

取亂髮如雞子大灰汁洗盡淨燒為末酒調服二錢

又療產後血不盡血痛悶方

取荷葉燒作灰暖水和服煮取汁亦良



又方 以鐵秤錘一枚燒赤投酒五升中用此酒煮當	歸三兩取二升去滓分溫再服千金同一方無當歸	療產後下血不盡腹內堅痛不可忍	當歸 芍藥 桂心 各三兩 桃仁 一百二十枚製	右細切以水六升煮取二升分溫二服如未差加大	黃三兩	療產後血結下不盡腹中絞痛不止	大黃 別浸 生乾地黄 當歸 各十分 川芎 芍藥 桂	欽定四庫全書 婦人大全良方	心 各八分 甘草 黃芩 各六分 桃仁 四十九粒製	右細切以水七升煮取二升半下大黃更煎三沸分	溫三服	療產後血下不盡腹中痛無計	青木香 當歸 牛膝 川芎 黃耆 芍藥 各八分	分 大黃 十三分 芒硝 十二分	右細切以水七升煮取二升入大黃更煎三沸分三服	療產後惡露不盡結聚小腹疼痛



當歸分三 香附子一兩 琥珀 沒藥 青皮 赤芍藥	木香 桂心各半兩	右為細末以豆淋酒調下二錢	產寶療產後餘血作疼痛兼塊者	桂心 薑黃等分	右為細末酒服方寸匕血下盡妙	地黄散 治產後惡物不盡腹內疴痛產後常服甚妙	生乾地黄 當歸並畧炒各一兩 生薑細切如蠅頭大新瓦炒令焦黑半兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為細末炒薑酒調一大錢服	卷荷散 治產後血上衝心血刺血暈血氣腹痛惡露	不快	初出卷荷 紅花 當歸各一兩 蒲黃紙炒 牡丹皮各半兩	右為細末每服二平錢空心溫酒調下一臈內只使	童子小便調如纔產後便服此藥即諸疾不生出婦人方	芸臺散 療產後惡露不下血結不散衝心刺痛將來	纔冒寒踏冷其血必往來心腹間刺痛有不可忍謂之



血母塊但產後心腹諸疾並宜服之 出產乳	芸臺子 紙炒 當歸 桂心 赤芍藥 各等分	右為細末溫酒調服二平錢趕下惡物產後三日不可無此	產後兒枕心腹刺痛方論第七 凡十八方	夫兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破散與兒俱下則無患也若產婦臟腑風冷使血凝滯在於小腹不能流通則令結聚疼痛名曰兒枕也	欽定四庫全書 婦人大全良方	產寶論產後心腹痛者由產後氣血俱虛遇風寒乘之與血氣相搏隨氣上衝於心或下攻於腹故令心腹痛若久痛不止則變成疝瘕也	延胡索散 治產後兒枕腹痛得効 出經驗婦人方	延胡索 當歸 各一兩 真琥珀 蒲黃 各一分 赤芍藥	半兩 桂心 三分 紅藍花 二錢	右為細末以童子小便合細酒溫溫調三錢食前服	治產後兒枕亦治赤白痢



丁香 三錢 嬰粟殼 去穢 香白芷 各半 百草霜 六錢	右為細末每服二錢童子小便調下如痢疾米飲調下	產後兒枕痛不可忍	五靈脂慢火熬為細末每服二錢溫酒調下	天僊藤散 治產後腹痛不止及一切血氣腹痛 出經驗婦人方	天僊藤 五兩 炒焦為細末每服二錢產後腹痛用炒生薑	小便和細酒調下常患血氣用溫酒調服効	產後腹中有塊上下時動痛發不可忍此由妊娠聚血	欽定四庫全書 婦人大全良方	產後氣羸惡露未盡新血與故血相搏而痛俗謂之兒	枕乃血瘕也宜蒲黃散	真蒲黃研飲調服二錢如燥渴者新水調	黑神散 療產後血塊痛經脉行後腹疼并經脉不調	熟地黄 一斤 陳生薑 半斤	右拌同炒乾為末每服二錢產前烏梅湯調下常服	酒調經脉不通烏梅荊芥酒調下	療新產後腹痛惡血不盡行黑神散 方見局方



療新產後七八日腹痛兩脇痛	當歸 劉寄奴 苦梗 各十分 延胡索 別為末 桂心	陳皮 各四分 茯苓 芍藥 各八分	右呖咀以水二升煮取八合調延胡索末空心服	療先患冷氣因產後發腹痛	芎藭 桂心 當歸 吳茱萸 茯苓 芍藥	甘草 各六分 桃仁 十分	右呖咀水七升煮取二升去滓分三服	欽定四庫全書 婦人大全良方	桃仁芍藥湯 千金療產後腹痛	桃仁 半升 芍藥 當歸 川芎 乾漆 碎熬 桂心 甘草 各二兩	右細切以水八升煮取二升半去滓分三服	廣濟療腹中絞痛不可忍	當歸 白芍藥 川芎 乾薑	右等分為末每服二錢溫酒調下一方加延胡索妙	必効方療產後腹痛方	羌活 四兩切 以酒二升煮取一升分服



千金治產後餘疾腹中絞痛不下食瘦乏方	當歸 黃耆 芍藥 乾地黄 白朮 桂	心 甘草 棗 筍	右呖咀水二升煮取八合去滓空心作兩大服忌生葱	千金茱萸酒治心腹内外痛	吳茱萸 酒三升煮取一升空心分二服	聖惠療同前	生地黄汁 藕汁 童子小便	欽定四庫全書 婦人大全良方	右同煎三二沸分溫三服	薑黃散 治產後腹疼	沒藥 川薑黃	右以水童子小便各一盞入藥煎至一盞半分作三	服通口服約行五七里再進一服即止不過三服便安	療血氣痛欲死	槐雞半兩為末酒濃煎頓服立愈	獨聖散 療產後腹痛



當歸為末每服二錢水一盞煎至七分溫服	又局方當歸散亦治產後腹痛不錄	外臺療新產後腹中如弦常堅絞痛無聊方	白蜜 一兩 當歸 一兩	右當歸為末入蜜中煎融二沸適寒溫頓服	產後小腹痛方論第八 凡六方	夫產後小腹痛者此由產時惡露下少胞絡之間有餘	血與氣相擊搏令小腹痛也因重遇於冷則血結變成	欽定四庫全書 婦人大全良方	血瘕亦令月水不利也	延胡索散 治產後臍下痛	延胡索 桂心 各半兩 當歸 一兩	右為細末熱酒調下二錢	香桂散 治產後臍下疼痛不止	川芎 當歸 各一分 桂心 半兩	右為細末分為三服每服酒一盞煎三五沸更入小	便少許煎至七分溫服甚者不過再服即差 出博濟



又方

釜底墨醋炒 延胡索 劉寄奴 桂心 菴闍子

右等分為末熱酒調下二錢

紫金圓 治產後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱

頭痛不思飲食亦治久有瘀血月水不調黃瘦不思飲

食並能治之亦可療心痛與失笑散同 出產乳

五靈脂 水淘去石焙乾秤炒為末 真蒲黃

右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃

欽定四庫全書

婦人大全良方

末搜和圓如櫻桃大每服一元水與童子小便各半

盞煎至七分令藥化溫服之少頃再一服惡露即下

久有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

產後六七日忽然臍腹痛皆由呼吸之間冷氣乘虛而

入宜服當歸建中湯和四順理中元共研再元作小元

飯飲吞下極妙

產後寒疝方第九 凡三方

王子亨云產後臍腹大痛由呼吸冷氣乘虛入客於血



宜局方當歸建中湯	羊肉湯 療虛及產婦腹中痛虛眩不能支持兩脅當	臍急痛氣上衝前後相引痛治之如神	精羊肉 四兩 當歸 各半 川芎 一兩 生薑 一兩	右細切以水十盞煎至三盞掠去沫去滓分四服空	心熱服一日來日再作兩日滓合為一日煎當一劑	服 千金當歸湯療婦人寒疝虛勞不足若產後腹	中絞痛其方無川芎有芍藥 陳無擇云仲景羊肉	欽定四庫全書 婦人大全良方	湯治寒疝右用生薑羊肉湯服之無不驗有一人產	當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不得犯此寒疝也	醫將治之以抵當湯謂有瘀血或曰非其治也可服	仲景羊肉湯少減水二服遂愈	羊肉湯 外臺療產後內虛寒氣入腹腹中絞痛下赤	白痢譌語見鬼	肥羊肉 一斤 當歸 甘草 芍藥 各一分 產寶 各一兩	右咬咀以水一斗先煮羊肉取七升入藥更煮取二



升去滓分服

產寶療產後心腹切痛不能飲食乏氣忽然往來寒熱

當歸 川芎 黃芩 人參 甘草 芍藥 防

風 生薑 各三分 大黃 二分宜相人強 桃仁 八十

右水七升煮取二升下大黃更煎三沸分作三服

千金羊肉湯無大黃人參桃仁有羊肉煮汁煎藥崔氏同

產後兩脇脹滿氣痛方論第十 凡六方

論曰產後兩脇脹滿疼痛由膀胱宿有停水因產後惡

欽定四庫全書

婦人大全良方

露下不盡水壅痞與氣相搏積在膀胱故令脇肋脹滿

氣與水相激故令痛也

經効療產後血氣脇肋脹痛

當歸 十二分 芍藥 苦梗 檳榔 枳殼 各八分 桂心

青木香 柴胡 各六分

右咬咀以水二升煎取八合去滓空心分溫二服

療產後惡露不下血氣壅痞脹痛不下食

蘇木 紫葛 各十分 芍藥 當歸 各八分 桂心 蒲黃



各六分 生地黄汁 三合	右呖咀以水二升煎取七合下蒲黃分兩服	當歸散 治產後腹痛腹脇脹滿	當歸 乾薑 等分	右為末每服三錢水一盞煎八分入鹽醋少許食前	熱服 選奇方用酒煎	經効理血氣煩悶脇肋脹滿及痛	芍藥 八分 蒲黃 延胡索 各四分 當歸 六分 荷葉蒂 三枚 炙	欽定四庫全書 婦人大全良方	右水二升煎取七合後入蒲黃空心分作兩服	廣濟療產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微痢	茯苓 人參 當歸 甘草 各六分 生薑 陳皮 各四分	厚朴 八分	右呖咀以水二升煎取八合去滓分溫服	產後積聚癥塊方論第十一 凡三方	夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者



痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣 陰性沉伏故痛不離其部聚為陽氣陽性浮動故痛無 常處產後血氣傷於臟腑臟腑虛弱為風冷所乘搏於 臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也									
治產後餘血不散結成癥塊疼痛宜服桃仁散									
藥	延胡索	琥珀	各三	川芎	桂心	各半	桃仁	當歸	鬼箭羽
							大黃	鱉甲	各一
							赤芍		
右為粗末每服三大錢水一盞薑三片煎至七分去									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
滓溫服									
京三稜散 治產後積血不散結聚成塊或時寒熱不									
思飲食									
京三稜	熟地黃	鱉甲	各一	桂心	當歸	川	芎	牡丹皮	劉寄奴
							赤芍藥	各半	大黃
							炒桃		
仁	牛膝	各三							
右為粗末每服三錢水一大盞薑三片煎至七分去									
滓溫服									



桂心元 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成 寒熱四肢羸瘦煩疼不思飲食	青皮 乾漆炒煙盡 沒藥 檳榔 當歸 桂心	赤芍藥 牡丹皮各半 大黃炒 桃仁 鱉甲	厚朴 三稜 延胡索各一兩	右為細末煉蜜元如梧桐大溫酒下三十元	產後血瘕方論第十二 凡八方	夫新產後有血與氣相搏而痛者謂之瘕瘕之言假也	欽定四庫全書 婦人大全良方	謂其痛浮假無定處也此由宿有風冷血氣不治至產 血下則少故致此病也不急治則多成積結妨害月水 輕則否澁重則不通也	鱉甲元 治產後惡露不盡結成血瘕乍寒乍熱心腹	脹痛不欲飲食四肢羸瘦或時口乾	當歸 木香 赤芍藥各半兩 鱉甲一兩 大黃炒 牛	膝 白朮 水蛭製 蜜虫製 牡丹皮 桂心各	分 鬼箭羽半兩



右為細末煉蜜元如梧桐子大桃仁湯吞下二十元 食前服 更宜加減不 可違併服	治產後血氣不調腹中生瘕結而不散生地黃煎元一 名萬病元 方見第一 卷第七論	產寶療血瘕痛無定處	童便 三升 生地黃汁 生藕汁 各一升 生薑汁 三升	右先煎前三味約三分減二次下薑汁慢火煎如稀	錫每取一合暖酒調下	欽定四庫全書 婦人大全良方	療血瘕痛臍下脹不下食	當歸 八分 桂心 芍藥 麒麟竭 蒲黃 各六分 延胡	索 四分	右為細末空心溫酒調二錢匕	千金療血瘕	生乾地黃 一斤 烏賊骨 二兩	右為細末空心溫酒調二錢匕服	凌霄花散 治血瘕血塊及產後穢露不盡兒枕急痛



應干積聚疼痛漸成勞瘦悉皆治之	凌霄花 分一 牡丹皮 山梔子仁 赤芍藥 紫荷	車 血竭 沒藥 礪砂 地骨皮 五加皮	甘草 兩各二 紅娘子 筒十一 桃仁 紅花 桂心 延	胡索 當歸 兩各一	右為細末溫酒調一錢服	葛氏方療腹中瘕痛	桂心為末溫酒調二錢	欽定四庫全書 婦人大全良方	產後血瘕腹痛及喉痺熱塞本人呼血瘕為兒枕產後 即起痛不可忍	鐵秤錘煨令通赤淬酒中候溫飲之用斧亦得	治產後血海氣虛腹臟疼痛心曾注悶每遇紅脉行或	多或少及有塊積者蓬莪茂散 出博濟	莪茂 桃仁 去皮尖 大黃 濕紙 當歸 炒各 桂心	川芎 木香 牡丹皮 延胡索 炒 赤芍藥 兩各半	右為細末溫酒調一錢空心臨卧服



產後餘血奔心煩悶方論第十三 虛煩當附於此	論曰餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便并擗心下及卧太速兼食不相宜之物所致但能依方療之無不痊可	療產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛	川芎 生乾地黄 枳殼 芍藥 等分	右為末酒服方寸匕日二服	廣濟療血氣煩悶方	欽定四庫全書 婦人大全良方	生藕汁飲二升甚效 竹瀝亦得千金同	集驗療產後血氣煩方 千金同	生地黄汁 清酒 各一升	右相和煎一沸分為兩服	療產後七日内宿血不散時時衝心迷悶	荷葉 六分 延胡索 八分 地黄汁 二合	右水二升煮二味取八合下延胡索空心三服忌肉	食一日



療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕	羊血一盞頓服如不定更服立效	經效療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹滿	當歸 桂心 川芎 吳茱萸 橘皮 生薑 各二兩	芍藥 三兩	右呶咀以水三升煮取一升去滓空心服	治產後餘血奔心	右用陳白梅搥碎濃煎湯喫	欽定四庫全書 婦人大全良方	金黃散 治產後惡血衝心時發躁 出博濟	延胡索 一兩 蒲黃 半兩 桂心 一分	右為細末烏梅煎湯冷調下一錢	沒藥元 治產後心胃煩躁惡血不快 博濟	沒藥 研 蠻薑 延胡索 乾漆 炒 當歸 桂心	牛膝 牡丹皮 乾薑 等分	右為細末醋煮麪糊元如梧桐子大煎麪湯下十元	至十五元



產後虛煩方第十四 凡七方		薤白湯 治產後胃中煩熱逆氣方		薤白 半夏 甘草 人參 各二兩 栝樓根 三兩 麥門	冬 半升	右六味㕮咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服	日三夜二熱甚即加知母一兩	竹根湯 治產後虛煩方	甘竹根細切一斗五升水二斗煮取七升去滓內小	欽定四庫全書 婦人大全良方	麥二升大棗二十枚復煮麥熟三四沸內甘草一兩	麥門冬一升湯成去滓服五合不差更服取差短氣	亦服之	人參當歸湯 治產後煩悶不安方	人參 當歸 麥門冬 桂心 乾地黄 各一兩 大	棗 二十枚 粳米 一升 淡竹葉 三升 芍藥 四兩	右九味㕮咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升	去滓內藥煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當



取豉一升以水三升煮取一升盡服之甚良	甘竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣方	甘竹茹 升一 人參 茯苓 甘草 兩各一 黃芩 兩三	右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服日三	千金療婦人產後短氣欲絕心中煩悶不解必效方	竹葉 切 麥門冬 小麥 各一 甘草 兩一 生薑 兩二 大棗	十四箇	右六味細切以水一斗煮竹葉小麥取八升去滓內	欽定四庫全書 婦人大全良方	餘藥煮取三升去滓溫服若虛悸加人參二兩少氣	力加粳米五合	一方用竹皮若曾中氣逆加半夏二兩忌如常法	淡竹茹湯 大同小異	赤小豆散 治產後煩悶不能食虛滿方	赤小豆三七枚燒作末以冷水和頓服之	治產後煩悶蒲黃散	蒲黃以東流水和服方寸匕極良



尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知產後與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死										欽定四庫全書		婦人大全良方		婦人大全良方卷二十									



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷二十一

詳校官太醫院恩貢 袁天錫

編修 臣 倉聖脈覆勘

總校官原任中允 臣 王燕緒

校對官中書 臣 葉 蘭

謄錄監生 臣 張元任



欽定四庫全書

婦人大全良方卷二十一

宋 陳自明 撰

產後口乾痞悶方論第一

論曰產後口乾痞悶者何答曰產後榮衛大虛血氣未
定食麪太早胃不能消化麪毒結聚於胃脘上熏胸中
是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胸膈壅滯以
藥下之萬不得已但服見現圓則愈

欽定四庫全書

婦人大全良方

見現元方

薑黃 三稜 華澄茄 陳皮 良薑 人參

莪茂 等分

右為細末用蘿蔔浸煮爛研細將汁煮麪糊元如梧
桐子大用蘿蔔湯下三十元

評曰產後口乾痞悶未必只因食麪或產母內積憂煩
外傷燥熱飲食甘辛使口乾痞悶當隨其所因調之可
也煩心宜四物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱



看屬何經當隨經為治難以備舉飲食所傷見現元却	能作効	四物湯 方見本卷 第二論	產後血渴方第二	產寶療產後大渴不止	蘆根 切一升 栝樓 人參 甘草 茯苓 各三兩 大棗	二十 生四 麥門冬 兩	右以水九升煮取三升分三服頓服四劑即差忌菰	欽定四庫全書	婦人大全良方	菜	楊氏家藏方黃芩散 治產後血渴飲水不止	黃芩 麥門冬 等分	右呶咀每服三錢水淺半煎至八分去滓溫服無時	栝樓根湯 集驗療產後血渴	栝樓根 四兩 麥門冬 人參 各三兩 生乾地黄 甘草	各二 兩 土瓜根 五兩 大棗 二十枚	右呶咀以水八升煮取二升半分三服 產寶無地黃 麥門冬有牡



蠟粉 等分	竹葉湯 千金療產後虛渴少氣力	竹葉 ^三 升 甘草 人參 茯苓 ^{各一} 兩 小麥 ^五 合 生薑	半夏 ^{各三} 兩 麥門冬 ^五 兩 大棗 ^{十五} 枚	右咬咀以水九升先煮竹葉小麥生薑棗取七升去	滓內藥再煎取二升去滓一服五合日三夜一	延胡散 博濟療產後血渴不止	延胡索 蔚金 乾葛 桂心 青皮 枳殼 ^製 等	欽定四庫全書 分 婦人大全良方	右並以好醋浸一宿焙乾杵為細末每服一錢冷橘	皮湯調下不過三服差	產後乍寒乍熱方論第三 產後癰疾附 凡九方	論曰產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能	令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽	勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟腑血	弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒



醫人若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減

增損四物湯方

人參 當歸 芍藥 川芎 乾薑 甘草

重

各一兩 四錢

右咬咀每服四錢水一盞薑錢三片煎至七分去滓

欽定四庫全書

婦人大全良方

熱服無時候

評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入脾肺二藏邪大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳

大調經散 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣血未



平之所為也	大豆 一兩半 炒去皮 茯神 一兩 真琥珀 一錢	右為細末濃煎烏豆紫蘇湯調下	五積散 方見局方	產寶療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡	時時乾嘔困乏悶絕	人參 獨活 白鮮皮 葛根 防風 青竹茹	遠志 各六分 茯神 八分 白斂 十分 玄參 十二分 竹瀝 二升半	欽定四庫全書	婦人大全良方	右銀一斤水一斗五升煎取七升下諸藥重煎取三升分溫三服忌魚酒麪等物	產後乍寒乍熱心痛月候不來如何答曰敗血充心痛	遶臍腹面色無采縱然得效暫時安痊不過三兩日又	發服局方黑神散大効	知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶方	知母 三兩 芍藥 黃芩 各二兩 桂心 甘草 各一兩	右五味咬咀以水五升煮取二升半分三服一方不



用桂心加生地黃

產後方論附

評曰郭稽中云產後乍寒乍熱者多是敗血為害或陰陽不和所作若作瘧疾治之誤矣如陳無擇評曰只可云敗血循經流入閉諸陽則熱閉諸陰則寒血氣與衛氣解則休亦未盡善亦有產後病瘧而作寒熱有一日一發或一日二三發或間日一發或三兩日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或但寒

欽定四庫全書

婦人大全良方

但熱者亦有產前病瘧而產後未愈者最難用藥如柴胡常山信砒等斷不可用今有經效草果飲子生熟飲子用之有效謾備檢閱如易簡方四獸飲亦可用

男六
德補

遺

草果飲子 治婦人產後瘧疾寒熱相半者或多熱者

宜

半夏泡 赤茯苓 甘草炙 草果炮去 川芎 陳皮

白芷各二錢 青皮去 良薑 紫蘇各一錢 乾葛四錢



右咬咀每服三錢重水一大瓊薑三片棗二箇同煎至七分去滓當發日侵早連進三服無有不安

生熟飲子 治產後癰疾多寒者

肉豆蔻 草果仁 厚朴 生去粗皮 半夏 陳皮 甘

草 大棗 核去 生薑

右八味等分細剉和勻一半生一半用濕皮帑裹煨令香熟去帑與一半生者和勻每服秤五錢重水二瓊煎至七分食前一服食後一服

欽定四庫全書

婦人大全良方

產後蓐勞方論第四

夫產後蓐勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平復不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風冷搏於血氣則不能溫於肌膚使人虛乏勞倦乍卧乍起顏容憔悴食飲不消風冷邪氣而感於肺肺感微寒故欬嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受於風邪流注藏府須臾頻發時有盜汗寒熱如癰背膊煩悶四肢不舉沈重著床此則蓐勞之候也



又論曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞心慮致令虛
羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痰逆腹中
絞刺名曰蓐勞

石子湯 療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛
面色痿黃名為蓐勞

猪腎 一雙去脂
膜四破 香豉 一方無此
有知母 葱白 粳米 當

歸 芍藥 各二
兩

右呖咀分為兩劑用水三升煮取一小椀去滓分三

欽定四庫全書

婦人大全良方

服廣濟方無芍藥有人參

許仁則療產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力遂

覺頭膊肢節皮肉痛乍寒乍熱此為蓐勞

猪腎 一雙去脂
膜四破 當歸 芍藥 生薑 各二
兩 葱白 切

桂心 各一
兩

右水八升煮腎取六升下藥煎取二升分溫為二服

胡氏方人參鼈甲散 治婦人產後蓐勞皆由在產內

未滿百日體中虛損血氣尚弱失於將理或勞動作傷



致成蓐勞其狀虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭	目昏痛發歇無常夜有盜汗寒熱如癰背膊拘急沈困	在床服此大効	人參 桂心 當歸 桑寄生 白茯苓 白芍	藥 桃仁 熟地黄 甘草 麥門冬 續斷	分 牛膝 分 鼈甲 炙 黃耆 各一	右為細末每服先以猪腎一對去筋膜以水兩大瓊	生薑半分棗三箇煎至一瓊去猪腎薑棗然後入藥	欽定四庫全書 婦人大全良方	末二錢入葱三寸烏梅一箇荆芥五穗煎至七分去	滓空心晚食前溫服此藥神妙	老孫太保增損柴胡湯 治產後虛羸發寒熱飲食少	腹脹方 出養生 必用	北柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮 川芎	白芍藥 各等 分	右咬咀每服三錢水一大瓊薑五片棗二枚煎七分	去滓食後溫服日二服



熟地黄散 治產後蓐勞皆由體虛氣力未復勞動所致四肢煩疼時發寒熱不思飲食	熟乾地黄 人參 白芍藥 白茯苓 白朮 各一兩	續斷 黃耆 桂心 五味子 當歸 麥門冬 各三兩	右呖咀每服四錢水一大錢薑三片棗一箇煎至七分去滓溫服無時	白茯苓散 治產後蓐勞蓋緣生產日淺久坐多語運動用力遂致頭目四肢疼痛寒熱如瘧狀宜服	白茯苓 一兩 當歸 川芎 桂心 白芍藥 黃耆 各半兩	人參 熟乾地黄 各半兩	右呖咀先以水二錢入猪腎一雙去脂膜細切以生薑三片棗三枚煎取一錢去腎薑棗入藥半兩煮取七分去滓食前分溫二服	黃耆圓 治產後蓐勞寒熱進退頭目眩痛百骨節疼痠氣力羸乏



黃耆 鼈甲 當歸 炒各一兩 桂心 續斷 白芍藥	川芎 牛膝 蓯蓉 沉香 柏子仁 枳殼	各三分 北五味 熟地黄 各半兩	右為細末煉蜜元如梧桐子大食後粥飲吞下四十	元	療產後大虛心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益方	黃耆 白朮 當歸 甘草 人參 各二兩 生薑 四兩	右先以白羊肉三斤去膜以水一斗九升煮肉取汁	欽定四庫全書 婦人大全良方	五升後下諸藥更煎取三升分溫三服	療產後喘乏氣羸腹內絞痛自汗出	黃耆 人參 茯苓 甘草 白朮 五味子	芎藭 當歸 各八分 澤蘭葉 陳皮 各六分 麥門冬	訶子 各二分 桂心 熟乾地黄 各十分	右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下三四十	元日再服	胡氏牡丹散 治婦人產後虛羸發熱自汗欲變蓐勞



或血氣所搏及經候不調及發寒熱自汗羸瘦並宜服之									
白芍藥 當歸 五加皮 地骨皮 人參 各半兩									
沒藥 桂心 各二錢 牡丹皮 三錢									
右為細末每服二錢水酒各半錢如不飲酒只用水									
一錢開通錢一錢麻油蘸之同煎七分去滓通口服									
煎不得攪喫不得吹									
黃耆煮散 治產後蓐勞肌膚黃瘦面無顏色或增寒									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
壯熱四肢痠疼心煩頭痛									
黃耆 鼈甲 醋炙各一兩 桂心 當歸 炒 桑寄生 白 茯苓 白芍藥 人參 熟地黄 麥門冬 去心 甘 草 炙各半兩 牛膝 三分									
右為細末每服用猪石子一對去脂膜先以水一錢									
入薑半分棗三枚煎至七分去滓并石子却下藥五									
錢更煎至四分去滓空心晚食前溫服二滓併煎									
產後虛羸方論第五									



產寶論曰產後虛羸者因產傷損臟腑勞傷氣血輕者									
將養滿日即差重者日月雖滿氣血猶不調和故患虛									
羸也夫產後氣血虛竭臟腑勞傷若人年齒少盛能節									
慎將養滿月便得平復如產後多因血氣虛弱雖逾日									
月猶常疲乏或因飲食不節調適失宜為風冷邪氣所									
侵搏於氣血流注於五臟六腑則令肌膚不榮顏容痿									
悴故曰虛羸									
人參散 治產後虛羸脾胃乏弱四肢無力全不思飲									
欽定四庫全書									
婦人大全良方									
食心腹脹滿									
黃耆 人參 草果仁 厚朴 附子 各一兩 白朮									
當歸 白茯苓 木香 川芎 桂心 甘草									
各半兩 陳皮 良薑 阿黎勒皮 各三分									
右咬咀每服四錢水一棧薑三片棗一枚煎至六分									
去滓無時溫服									
熟乾地黄湯 治產後虛羸短氣不能食									
熟乾地黄 二兩 人參 北五味子 石斛 白茯苓									



白朮 鹿角膠 附子 各一兩 桂心 當歸 川	芎 澤蘭葉 黃耆 續斷 各三分	右呿咀每服四錢薑棗依前煎服	澤蘭補虛元 刪繁療婦人虛勞或本來虛寒或產後	血脈虛竭四肢羸弱飲食減少血脈斷絕血脈不通虛	實依源	澤蘭葉 九分 石膏 八分 川芎 甘草 當歸 各七分 白芷	防風 白朮 藁本 川椒 厚朴 乾薑	欽定四庫全書 婦人大全良方	桂心 細辛 各五分	右為細末煉蜜元如梧桐子大酒下二三十元日再	忌海藻菰菜桃李生葱雀肉	羊腎湯 治產後虛羸乏力短氣	羊腎 一雙去脂膜 麥門冬 羚羊角 屑 北五味子 茯	神 桂心 續斷 黃耆 川芎 當歸 各半兩 人	參 附子 炮 乾薑 各三分 熟乾地黄 一兩	右呿咀先以水二大瓊煮腎至一瓊去腎入藥五錢



椒二七粒薑錢二片棗三枚煎至五分去滓空心溫服	羊肉當歸湯 治產後虛羸乏弱無力喘急汗出腹中	疔痛 肥羊肉 二斤 當歸 白芍藥 各半 桂心 附子 炮 川	芎 黃耆 人參 龍骨 白朮 各三 熟地黄 一	右為粗末先以水五大升煮羊肉取汁二大瓊每服 四錢汁一中瓊薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服	欽定四庫全書 婦人大全良方	黃雌雞湯 治產後虛羸腹痛宜服	小黃雌雞 一隻去頭足翅 當歸 白朮 熟地黄	桂心 黃耆 各半 右咬咀先以水七升煮雞至三升每服藥四錢以雞 汁一瓊煎至六分去滓溫服日三 產寶療產後經三臈諸疾退後身虛無力 澤蘭葉 炒 細辛 熟乾地黄 各五 黃耆 當歸 防風 各十 麥門冬 去心 石膏 七分 藁本 白芷



川芎 柏子仁 五味子 甘草 各四分 桂心 三分	右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下三四十元	救急療產後羸乏不復令肥白方	大烏豆淨拭熬熟如造豆黃法去皮擣為末以臘月猪脂成煉者和元如梧桐子大酒下五十元日再服	一月內肥白也無所忌	婦人方當歸散 治產後補虛益血	欽定四庫全書 婦人大全良方	當歸 羌活 各一兩 延胡索 半兩	右為細末用猪腰子一隻切作片以水一盞入藥末	二錢同煎至七分同腰子喫	佛手散 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰	當歸 川芎 黃耆 各一兩 北柴胡 前胡 各一分	右呔咀每服三錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各一枚薑三片煎至六分去滓溫服如有痰去烏	梅



當歸羊肉湯 許仁則療產後雖無疾狀但覺虛弱兼 心腹痛欲得補氣力	肥羊肉 一斤去脂水一斗 煮取八升去肉 當歸 兩 五 黃耆 兩 四 生薑 兩 六	右以肉汁煮三味取二升五合分為四服若覺惡露 下不盡加桂心三兩惡露下多覺有風加芎藭三兩 有冷加茱萸一兩有氣加細辛二兩有熱加生地黃 汁二合	欽定四庫全書 婦人大全良方	療產後雖無餘苦但覺氣虛 當歸 十二分 乾地黄 十分 澤蘭葉 八分 地骨皮 芍藥 各七分 黃耆 防風 續斷 各六分 人參 桂心 各五分	右為細末煉蜜元如梧桐子大溫酒吞下二十元	療產後虛羸 黃雌雞 一隻去毛 背上破 生百合 煨三枚 白粳米 半升	右依尋常着五味調和縫背合五味汁煮令熟開腹 取百合并飴相和汁作羹食之肉亦食令盡略卧佳



產寶療產後虛乏不思飲食四肢皆倦心腹陣痛補虛 治氣	人參 芍藥 桂心 甘草 生薑 各一兩 當歸 一兩	半 生地黄 二兩	右咬咀每服三錢水兩錢棗二枚煎至一錢去滓溫 服日三服	地黄羊脂煎方 古今錄驗療產後諸疾羸瘦欲令肥 白飲食和調	欽定四庫全書 婦人大全良方	生地黄 汁一升 生薑汁 五升 羊脂 二斤 白蜜 五升	右四味先煎地黄汁令餘五升下羊脂煎減半次下 薑次下蜜便以銅器盛著湯中煎令如飴狀空肚酒 一升取煎如雞子大投酒中飲日三良	產後風虛勞冷方論第六	夫產則血氣勞傷臟腑虛弱而風冷客之冷搏於血氣 血氣不能溫於肌膚使人虛乏疲頓致羸損不平復若 久不平復若久不瘥風冷入於子臟則胞臟冷亦使無



子謂之風虛勞損也		黃耆散 治產後風虛勞損羸瘦不思飲食四肢疼痛		黃耆 白朮 木香 羚羊骨 _屑 人參 當歸		桂心 川芎 白芍藥 白茯苓 _兩 甘草 _{各半} 一分		右呖咀每服三錢水一錢薑三片棗一箇煎至七分		去滓溫服無時		木香散 治產後風虛勞損氣攻心腹四肢疼痛不思飲食		欽定四庫全書		婦人大全良方		木香 人參 陳皮 白茯苓 白芍藥 黃耆		川芎 _{各三} 熟乾地黄 當歸 附子 _{各一} 甘草 _兩		一分桂心 白朮 _{各半}		右呖咀每服三錢水一錢薑三片棗一枚煎至七分		去滓溫服		人參散 療產後風虛勞損羸瘦四肢無力不思飲食		人參 黃耆 熟地黄 _{各一} 羚羊角 _屑 桂心 _三		川芎 防風 當歸 北五味子 白茯苓 白	



欽定四庫全書		婦人大全良方	
術	各半	甘草	一分
右為粗末每服三錢先用水二大瓊獺猪腎一雙切			
去脂膜薑棗同煎至一瓊去猪腎入藥煎至四分去			
滓空心溫服			
枸杞子元 療產後風虛勞損四肢疼痛心神虛煩不			
飲食			
枸杞子	牛膝	白茯苓	人參
黃耆	各一兩	當歸	各一兩
歸	漏蘆	防風	桂心
酸棗仁	羚羊角	屑	
羌活 五加皮 白朮 川芎 各三分			
熟地黄	二兩	甘	
草	半兩	麥門冬	一兩
右為細末煉蜜元如梧桐子大溫酒下三十元荊芥			
湯亦可			
白薇元 治產後風虛勞損腹痛冷氣脚膝無力面色			
痿黃飲食減少日漸羸瘦補益			
木香	當歸	桂心	澤蘭葉
牛膝	白薇		
牡丹皮	枳殼	人參	川芎
厚朴	白朮		



續斷 熟地黄 北細辛 赤石脂 龍骨 禹	餘糧 黃耆 各一兩 白茯苓 附子 各三分 吳茱萸 一分	右為細末煉蜜為元如梧桐子大食前溫酒下三十元	產寶療產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉	黃耆 當歸 芍藥 人參 各二兩 桂心 甘草	川芎 生薑 各八分 大棗 十二箇	右水七升煮取三升分溫三服	欽定四庫全書 婦人大全良方	療產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出	當歸 人參 生薑 各二兩正 黃耆 三兩 淡豉 五合 猪	腎 一雙 粳米 三合 薤白 三合	右水一斗五升先煮猪腎取六升後下諸藥煎至二	升分為三服	又方	猪腎一雙煮入葱豉作臠如常食之	延年澤蘭元 主產後風虛損瘦不能食令肥悅方



澤蘭葉 熟 當歸 甘草 各七 厚朴 藁本 食茱	萸 蕪荑 白芷 乾薑 芍藥 各三 石膏 八	參 柏子仁 桂心 各四 白朮 五	右為細末煉蜜元如梧桐子大酒服十五元至二十	五元日二服忌生冷鮓滑猪牛肉麪生葱桃李雀肉	海藻菰菜	古今錄驗澤蘭元 產後風虛勞損羸弱百病必效方	澤蘭葉 六 白芷 川椒 蕪荑仁 藁本 北細	欽定四庫全書 婦人大全良方	辛 各四 人參 白朮 柏子仁 防風 桂心	厚朴 丹參 各五 川芎 當歸 甘草 各七 乾地	黃 十	右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下二十元	至三十元日二服忌如前	廣濟療產後患風虛冷氣腹內不調補益肥白悅澤方	澤蘭 七 厚朴 人參 石斛 蕪荑仁 續斷 防風 桂心 各三 川芎 白朮 柏子仁 北五



味子 黃耆 遠志 各四分 赤石脂 甘草 乾地	黃 各六分	右為細末煉蜜元如梧桐子大酒下二十元至三十	元日二服忌如前	延年增損澤蘭元 主產後風虛勞損黃瘦方	澤蘭 分 熬七 防風 乾地黄 當歸 北細辛 桂	心 茯苓 芍藥 人參 甘草 藁本 烏頭	炮 麥門冬 石斛 紫苑 川芎 各五分 乾薑 栝	欽定四庫全書 婦人大全良方	子仁 蕪荑仁 厚朴 川椒 各四分 白朮 黃耆	各六分 紫石英 石膏 各八分	右為細末煉蜜元如梧桐子大酒下二十元或三十	元	產後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七	論曰產後腹脹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血散於脾	胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能	受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥



治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服抵	聖湯則愈	抵聖湯方	赤芍藥 半夏 澤蘭葉 人參 陳皮 各一分 甘草	草 一錢	右呖咀每服一劑用水一碗生薑焙乾半兩煎至半碗去滓分熱三服	產後嘔逆不食方論第八	欽定四庫全書 婦人大全良方	夫胃為水穀之海水穀之精以為血氣榮潤藏府因產則臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸胃燥澀其氣則逆故嘔逆不下食也	丁香散 治產後脾胃氣寒心胸滿悶吐逆四肢少力	不納飲食	丁香 人參 檳榔 白朮 桂心 當歸 厚	朴 前胡 各三分 甘草 半兩 良薑 一兩	右為粗末每服四錢水一錢薑三片煎至七分去滓



溫服空心	開胃散 治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜服	訶子肉 兩半 人參 兩一 甘草 兩半	右三味為細末別以半夏半分生薑一分薤白二七	莖水一大棗煎至六分去滓分為兩服	療產後嘔逆不止 鄧知縣傳	橘紅 兩一 半夏 兩一 麴 兩一 甘草 兩各半 藿香 兩三	右為細末每服二錢水一棗半薑三片煎至六分無	欽定四庫全書 婦人大全良方	時候	治產後更無他疾但多嘔逆不能食	白朮 分五 生薑 分六	右細切酒水各二升煎取一升分三服	產後霍亂方論第九	夫產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風	冷所致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相	搏冷熱不調上吐下痢故曰霍亂也經云渴而飲水者



五苓散寒多不飲水者理中元大段虛冷者加附子來	復丹亦妙 見局方	白朮散 治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷	白朮 橘紅 麥門冬 人參 乾薑 各一兩 甘草	半兩	右為粗末每服四錢生薑五片水一瓊煎至七分去	滓溫服	附子散 療產後霍亂吐利不止手足逆冷	欽定四庫全書	婦人大全良方	附子 白朮 當歸 吳茱萸 桂心 人參	丁香 橘紅 甘草 各半兩	右為細末粥飲調下二錢無時候	溫中散 治產後霍亂吐瀉不止	人參 白朮 當歸 草豆蔻仁 乾薑 各一兩 厚	朴 二兩	右為粗末每服三錢水煎服	高良薑散 治產後霍亂吐利腹中疴痛



婦人大全良方卷二十一										欽定四庫全書		婦人大全良方		良薑 當歸 草豆蔻仁		右等分為細末每服二錢粥飲調下	訶子散胡椒湯亦妙
																方見第七卷第二論	



欽定四庫全書

婦人大全良方卷二十二

宋 陳自明 撰

產後傷寒方論第一

凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等疾證多是血虛或敗血作梗血虛者陰虛也陰虛者陽必湊之故發熱且以平和之劑與服必效如玉露散方

見十八卷

第三論 或四物湯以生地黃易熟地黃加北柴胡等分煎

欽定四庫全書

婦人大全良方

服或人參當歸散秦艽鼈甲散人參輕骨散人參百解散逍遙散皆可選用常見不學無聞纔見產後發熱不退便以為熱入血室便以小柴胡湯竟不可救者亦有
用竹葉石膏湯而死者亦有見前失而投以溫劑其熱愈熾者諸如此等非不知罪福皆是不觀古典杜撰臆度枉傷人命殊不知此等疾狀是產後去血過多而陰虛發熱亦有寒極生熱但以上件之藥以脈證選用無不獲安若是陰陽不和乍寒乍熱宜增損四物湯如敗



血不散者宜奪命丹大調經散五積散加醋煎却效
二十卷
第三論
見詳

王子亨云婦人新產去血過多津液燥少陰陽俱虛大
凡有疾如中風傷寒時氣之類雖當發汗如麻黃謹不
可用取汗母令過多以意斟酌

夫人觸冒寒氣而為病者謂之傷寒產婦血氣俱虛日
月未滿而起早勞動為寒所傷則淅淅惡寒翕翕發熱
頭項肩背骨節皆痛至七八日乃差也

欽定四庫全書

婦人大全良方

婦人產後亡血汗多故令鬱冒其脈微弱不能食大便
反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲
解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以
為產婦無汗出者亡陰血陽氣獨盛故當汗出陰陽乃
復所以便堅者嘔不能食也方可用小柴胡湯加生地
黃主之

秦艽鼈甲散人參輕骨散神仙百解散

並見和
劑局方

人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生



內熱內熱曰煩其證心胸煩悶吸吸短氣頭痛悶亂骨節疼痛晡時輒甚與大病虛煩相類急宜治之	人參 當歸 生乾地黄 桂心 麥門冬 去心 各一	白芍藥 兩二	右呔咀每服四大錢水二盞先將粳米一合淡竹葉十片煎至一錢去米竹葉入藥并棗二枚煎至七分去滓溫服虛甚者用熟地黄	三物黃芩湯 治婦人草蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼	欽定四庫全書 婦人大全良方	與小柴胡湯若頭不疼但煩者	黃芩 兩半 苦參 兩一 生乾地黄 兩二	右呔咀每服四錢水一錢煎至七分去滓溫服	增損柴胡湯 治婦人產後虛羸發寒熱飲食少腹脹	等疾宜	柴胡 錢三 人參 芍藥 半夏 炮 甘草 橘紅 川	芎 各三	右呔咀每服四錢水一錢薑三片棗一枚煎至七分



去滓溫服	竹葉防風湯 治婦人產後傷風發熱面赤喘而頭痛	宜服	淡竹葉 半把 防風 人參 桂枝 苦梗 甘草 各半	兩 葛根 一兩半	右咬咀每服三錢水一錢薑三片棗一枚煎至七分	去滓溫服使汗出頸項強用附子炮去皮臍剉如豆	大抄一錢同煎嘔者加半夏煎服	欽定四庫全書 婦人大全良方	陽旦湯 治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒 時時有熱心下堅乾嘔汗出宜	桂枝 芍藥 各三兩 甘草 炙 黃芩 各二兩	右咬咀每服三錢水一錢薑三片棗一枚煎至七分	去滓溫服無時候自汗者去桂加炮熟附子一枚渴	者去桂加栝樓根三兩下痢者去芍藥加乾薑三兩	心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦	湯主之煎時入膠飴為佳若脈浮緊無汗發熱者莫



與也		治產後惡露方下忽而斷絕晝日明了暮則譫語寒熱		往來如見鬼狀此由為熱入血室不即治之諸變不測		宜服柴胡地黃湯 方見第六卷十五論中 四物湯加北柴胡		芍藥湯 千金翼療產後虛熱頭痛身體發熱兼治腹		內拘急疼痛		桂心 三兩 牡蠣 三兩 白芍藥 各五兩 黃芩 二兩 千金翼云 若通身發熱方		加黃芩 五兩 生乾地黃 五兩		欽定四庫全書		婦人大全良方		右呖咀每服五錢水一錢半煎至一錢去滓溫服		千金蜀漆湯 產後療虛熱往來心胸煩滿骨節疼痛		及頭痛壯熱日晡加甚又如瘧狀		黃耆 五兩 生地黃 一斤 蜀漆葉 桂心 甘草 黃芩		各一兩 知母 芍藥 各二兩		右呖咀每服五錢水一錢半煎至一錢去滓溫服		產後頭痛方論第二 凡三方		夫人頭者諸陽之會也凡產後五臟皆虛胃氣虧弱飲	



食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上湊於頭陽實
陰虛則令頭痛也○又有產後敗血頭痛不可不知黑
龍丹言之甚詳

川芎散 治產後頭痛

真天台烏藥皮 大川芎

等分

右為細末每服三錢秤鎰淬酒調服

芎附散

治產後敗血作梗頭痛諸藥不効者

涂明仲先生傳

大附子一枚皃醋一椀用火四畔炙透蘸醋令盡去

欽定四庫全書

婦人大全良方

皮臍川芎一兩並為細末每服二錢茶清調下

一奇散 治產後頭疼

取當歸川芎為細末每服二錢水一椀煎七分溫服

產後咳嗽方論第三

凡四方

夫肺者主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或
風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也○若產後喫鹽太早
而咳嗽者難治

產後血氣不通咳嗽者何答曰產後咳嗽多因食熱麪



壅納或熱病或有氣塊發時充心痛氣急咳嗽四肢寒 熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛肢體無力宜服 局方真黑神散五積散加棗煎服	二母散 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服此	藥如傷風痰嗽却以尋常傷風藥主治	知母 貝母 白茯苓 人參各半 桃仁 杏仁	並生去皮 尖各一分	右為細末每服三錢水一錢半煎至八分無時溫服	欽定四庫全書 婦人大全良方	如覺腹痛併服之立有神效	集驗療產後感風傷寒咳嗽多痰唾粘產寶同	甘草 苦梗各六分 款冬花四分 生麥門冬 生地黃	各十分 二分 葱白一握 無葱白與豉	右呖咀每二升煮取八合去滓食後分二服	經効療咳嗽多痰唾粘氣急	前胡 五味子 紫苑 貝母各六分 桑白皮 茯	苓各八分 淡竹葉二十片



右呔咀水二升煎取八合去滓食後分兩服
療產後咳嗽氣喘

百部根 苦梗 各六分 桑白皮 二十分 乾百合 赤茯
苓 各八分

右呔咀水二升煮取七合去滓食後分兩服

產後喉中氣急喘促方論第四 凡四方

論曰產後喉中氣急喘促者何答曰榮者血也衛者氣也榮行脈中衛行脈外相隨上下謂之榮衛因產所下

欽定四庫全書

婦人大全良方

過多榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤

陽絕陰為難治若惡露不快敗血停凝上熏於肺亦令

喘急但服奪命丹 方見十八卷第四論中 血去喘自定

評曰產後喘急固可畏若是敗血上熏於肺猶可責効

奪命丹若感風寒或因憂怒飲食鹹冷等奪命丹未可

均濟况孤陽絕陰乎若榮血暴絕宜大料煮芎藭湯亦

自可救傷風寒宜旋覆花湯性理鬱發宜小調經散用

桑白皮杏仁煎湯調下傷食宜服見現元五積散



芎藭湯 方見第二卷第五論 又名佛手散	旋覆花湯 治產後傷風感寒暑濕咳嗽喘滿痰涎壅盛坐卧不寧	旋覆花 赤芍藥 前胡 半夏麴 荆芥穗	甘草 茯苓 五味子 杏仁 麻黃 各等分	右呖咀每服四錢水一錢半薑五片棗一枚煎至七分去滓食前溫服 有汗者莫服	小調經散 方見本卷第十論 五積散 方見和劑見現元卷第一論	欽定四庫全書 婦人大全良方	參蘇飲 治婦人產後血入於肺面黑發喘欲死者 胡氏	人參 一兩別為末 蘇木 二兩	右以水兩碗煮取一碗以下去滓調參末隨時加減服神效不可言	產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五 凡二方	論曰產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脈	之海起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左	產後氣消血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故



令口鼻黑起及變鼻衄此緣產後虛熱變生此證其疾不可治名胃絕肺敗此證不可治故不出方

經驗方云遇有此疾急取緋線一條并產婦頂心髮兩條緊繫中指節上即止無藥可療亦厭禳之一端也

海上方治產後鼻衄中風以荊芥為末童子小便調下

二錢匕

產後咳噫方論第六 凡六方

夫肺主於氣五臟六腑俱稟於氣產後則氣血傷臟腑

欽定四庫全書

婦人大全良方

皆損而風冷搏於氣氣則逆上而又脾虛聚冷胃中伏

寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣厥而不順則咳噫也

脾者主中焦為三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰

陽氣虛使榮衛氣厥逆則致生斯病也經云吃噫者胃

寒所生服藥無効者灸期門三壯必愈期門穴乃胃之

大絡 穴見六卷第十五論

丁香散 治產後心煩咳噫不止

丁香 白豆蔻仁 各半兩 伏龍肝 一兩



右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服	石蓮散 治氣吃噫又治吐逆心怔目暈不思飲食 婦出	人經 驗方	石蓮肉 炒兩半 白茯苓 一兩半 丁香 兩半	右為細末每服三錢米飲調下無時候	產寶療產後咳逆三日不止欲死	桂心 半兩 薑汁 三合	欽定四庫全書 婦人大全良方	右同煎取二合以火先炙背摩令背熱時塗藥汁盡妙	產後咳逆方	乾柿 一個	右切碎以水一錢煎至六分熱呷	又方	古壁鏡窠三四个水一小錢煎至一半熱服 並出產寶	羌活散 治欬逆 出靈苑方



羌活

附子

炮

茴香

炒各半兩

木香

白薑

炮各一分

右五味為末每服二錢水一瓊鹽一捻煎一二十沸

熱服一服止

產後血崩方論第七

凡八方

論曰產後血崩者何答曰產卧傷耗經脈未得平復而勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷蠹榮衛氣血衰弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服固經元以止之

欽定四庫全書

婦人大全良方

固經元方

艾葉

赤石脂

煨

補骨脂

木賊

各半兩

附子

一個炮

右為末陳米飲和員如梧桐子大食前溫酒下二十

員米飲亦可

評曰血崩不是輕病况產後有此是謂重傷恐不止鹹酸不節而能致之多因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經元自難責効不若大料煮芎藭湯加芍藥候定續次隨證諸



藥治之為得	芎藭湯加芍藥方	芎藭 當歸 芍藥 等分	右呶咀每服四錢水淺半煮取七分出滓無時熱服	熟乾地黄散 治產後崩中頭目旋運神思昏迷四肢	煩亂不知人事	熟乾地黄 伏龍肝 黃耆 赤石脂 各一兩 阿膠	甘草 白朮 艾葉 炒 川芎 人參 各半兩 當歸	欽定四庫全書 婦人大全良方	分 三	右呶咀每服三錢薑三片煎至七分去滓溫服	白芍藥散 治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損宜	白芍藥 牡蠣 乾薑 熟乾地黄 桂心 黃	耆 烏賊骨 鹿角膠 龍骨 各一兩	右為末食前溫酒調下二錢	又方	熟地黄 赤石脂 各一兩 鹿茸 牡蠣 當歸 各半兩



右為細末食前粥飲調二錢	阿膠元 治產後崩中下血不止虛羸無力	阿膠 赤石脂 各一兩半 續斷 川芎 當歸 甘草	丹參 各一兩 龍骨 鹿茸 酥炙 烏賊骨 鼈甲 各二兩	右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下二三十元	元	葛蒲酒 治產後崩中不止下血	葛蒲 一兩半	欽定四庫全書 婦人大全良方	右細剉以酒二瓊煮取一瓊去滓分溫三服食前	瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉水	瑞蓮 百枚燒存性 棕櫚 燒存性 當歸 桂心 各一兩 鯉魚鱗	燒川芎 各三分 檳榔 二枚	右為細末每服三錢煨薑酒調下如未止更進一服	或非時血崩無藥可治但進三服即止	產後月水不調方論第八 凡二方	夫產後月水不調者由產傷動血氣虛損未復而風邪



冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故	令血或多或少或在月前或在月後故名不調也	琥珀散 治產後經脈不調四肢煩疼飲食全少日漸	羸瘦	琥珀 牛膝 生乾地黄 當歸 各一 桃仁 赤	芍藥 各半 兩	右為粗末每服三錢水一棧薑三片煎至六分去滓	溫服	欽定四庫全書 婦人大全良方	薑黃元 治產後虛乏不足胸心短氣腹內緊急腰背	疼痛月水不調食少煩渴四肢無力	薑黃 當歸 熟地黄 牡丹皮 厚朴 桂心	川芎 續斷 桃仁 白朮 各一 兩 赤芍藥 木	香 各三 分 羚羊角屑 一 分	右為細末煉蜜元如梧桐子大食前溫酒下三十元	產後月水不通方論第九 無 方	論曰夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷所傷



血之為性得冷則凝結故風冷傷於經血結於胞絡之
間故令月水不通也凡血結月水不通則血結成瘕水
血相併復遇脾胃衰弱肌肉虛者則為水腫也

但於第一卷第

六七論
中求方

夫婦人衝任之脈為經絡之海皆起於胞內而手太陽
小腸之經手少陰心之經也此二經上為乳汁下為月
水若產後月水不通者蓋新產之後勞傷氣血或去血
過多乳汁通行自是不通

關

或一歲之內而

欽定四庫全書

婦人大全良方

月經不行此是常候即非病也何必通之諺云妳假是
也若半歲而行者或四五箇月便經行者皆是少壯血
盛之人注受極易產乳必衆其子失乳必四肢羸肚
大青筋頭大髮焦好啖泥土病名無辜若經血有餘者
不可以藥止之若產後一二歲月經不通而無疾苦何
必服藥或勞傷氣血衝任脈虛氣血衰少而不能行者
但服健脾胃資氣血之藥自然通行若以牛膝紅花蘇
木乾漆蜜虫水蛭等藥以通之則為害滋大經水枯竭



則無以滋養其能行乎初虞世所謂譬猶索萬金於乞
丐之手雖捶楚並下而不可得也後之學者更宜詳審
而療之自明補註

產後四肢浮腫方論第十方凡九

論曰產後四肢浮腫者何答曰產後敗血關乘虛停積

於五臟循經流入四肢留淫日深却還不得腐壞如水

故令面黃四肢浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水

氣多用導水藥極虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂

欽定四庫全書

婦人大全良方

重虛往往因致天枉但服小調經散血行腫消則愈

小調經散方

沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸各一錢 細辛

麝香各半錢

右為細末每服半錢匕薑汁溫酒各少許調停服

評曰產後浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有

產後失於將理外感寒暑風濕內作喜怒憂驚血與氣

搏留滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脈證治



之宜得其情小調經散治血分固効但力淺難憑不若	吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也	經云產後肌浮柑皮酒服	加減吳茱萸湯 治婦人臟氣本虛宿挾風冷胸膈滿	痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄	或泄不止少氣羸困及因生產臟氣暴虛邪冷內勝宿	疾轉增	吳茱萸 一兩半 苦梗 乾薑 甘草 麥門冬 防	欽定四庫全書 婦人大全良方	風 半夏 細辛 當歸 赤茯苓 牡丹皮	桂心 各半兩	右為粗末每服四錢水棧半煎至七分去滓食前熱	服	枳朮湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰	氣分	枳實 一兩半 白朮 三兩	右咬咀每服四錢水一棧半煎至七分去滓溫服中



軟即當散也

奪魂散 治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑 三兩 白麪 三兩 半夏 七箇
取汁

右以生薑汁搜麪裹半夏為七餅子炙焦熟為末水

調一錢小便利為効

大調經散 最治產後腫滿喘急煩渴小便不利 方見二十

一卷第三論中

又論曰夫產後勞傷血氣腠理虛則為風邪所乘邪搏

欽定四庫全書

婦人大全良方

於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若

皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者

利小便差也

漢防已散 治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫

漢防已 猪苓 枳殼 桑白皮 各一兩 商陸 甘

草 各三分

右為粗末每服四錢水一錢半薑三片煎至七分去滓

溫服空心



治產後遍身青腫疼痛產後血水疾

出婦人經驗方

乾漆 大麥蘖

等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘖一重乾漆

如此填滿用鹽泥固濟火煅通赤放冷研為散但是

產後諸疾熱酒調下二錢

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉 防已

等分

右為末每服一一錢溫酒調下不能飲者醋湯調亦可

欽定四庫全書

婦人大全良方

產後腹痛及瀉痢方論第十一

凡七方

論曰產後腹痛及瀉痢者何答曰產後腸胃虛怯寒邪

易侵若未滿月欲冷當風乘虛襲留於育膜散於腹脇

故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞泄

腸鳴或下赤白胠脇膜脹或痛走不定急服調中湯立

愈若醫者以為積滯取之禍不旋踵謹之謹之

調中湯方

高良薑 當歸 桂心 芍藥 附子

炮川芎各一



兩 甘草 兩半	右為粗末每服三錢匕水三瓊煎至一瓊去滓熱服 評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云飲冷 當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜怒憂思還從自 性況勞逸飢飽皆能致病若其洞泄可服調中湯赤白 滯下非此能愈各隨門類別有正方今錄桃膠散白頭 翁湯以備用餘從滯下門選之	桃膠散 治產後痢下赤白裏急後重疔刺疼痛等證	欽定四庫全書 婦人大全良方	桃膠瓦上焙乾 沉香 蒲黃隔紙炒等分	右為末每服二錢食前陳米飲調下	白頭翁湯 治產後下痢虛極	白頭翁 甘草 阿膠各二兩 黃連 蘖皮 秦皮	各三兩	右呖咀每服四錢水瓊半煎至七分去滓空心服	調中湯 張氏方的奇散治產後泄瀉惡露不行此餘	血滲入大腸為瀉分過則愈雖洞泄不禁下青黑色物



亦驗因食傷動用	荊芥大者四五穗於琰內然火燒成灰不得犯油火 入麝香少許研沸湯一兩呷調下此藥雖微能愈大 病宜勿忽之			產後諸痢方	煮薤白食之	又方	羊腎脂炒薤白空腹食尤佳		欽定四庫全書	婦人大全良方	又方	炙肥羊肉食之	產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第十二 凡三十一		方	論曰產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛乏 未復或勞動太早或誤食生冷若行起太早則外傷風 冷乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆 令洞泄水瀉甚者變為痢也若血滲入大腸則為血痢	



難治泄謂之產子痢是也得冷則白或如魚腦得熱則赤黃或為驟血若冷熱相搏則下痢赤白或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛更加久痢不止無力瘦乏愈見羸弱謂之虛羸下利又有產後氣宇不順而下痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則調之滑者澁之虛羸者補之水穀不分者當利小便若產婦性情執著不能寬解須當順其氣未有不妥者也治之各有											
方											
欽定四庫全書											
婦人大全良方											
黃連元 深師療產後冷熱痢											
黃連_{六兩} 烏梅_{三兩} 乾薑_{二兩}											
右為細末煉蜜元如梧桐子大空心米飲下三十元											
忌猪肉											
經效治產後赤白痢臍下氣痛											
厚朴_{八分} 當歸 枳殼 訶子肉_{各六分} 甘草_{五分} 肉豆											
寇_五 薤白_三											



右水一升煮取九合空心分為三服	張文仲治產後赤白痢腹中絞痛不可忍	黃連 四兩 阿膠 蒲黃 梔子仁 各一兩 當歸 半兩 黃	芩 二兩 黃蘗皮 三兩	右為細末煉蜜元如梧桐子大飲下六十元日三夜	一立定破血止痢	救急治產後赤白痢腹中絞痛	芍藥 四兩 阿膠 艾葉 各二兩 乾地黄 四兩 甘草 當歸	欽定四庫全書 婦人大全良方	各二兩	右水二升煮取八合分兩服空心	必效療新產後赤白痢疾心腹刺痛	薤白 切一升 當歸 二兩 酸榴皮 三兩 地榆 四兩 粳米 五合 阿膠	人參 甘草 黃連 各兩半	右呔咀以水六升煮取一升日三服一方有厚朴一	兩千金方只有前五味	又療產後赤白痢腹中絞痛不下食



當歸 石榴皮 地榆 各二分 白蘘荷 黃連 各十分	黃蘗 一分 犀角 屑四分 黃芩 枳殼 甘草 升麻 各六分	茜根 分八 粳米 分二 薤白 升一	右為末煉蜜元如梧桐子大空心米飲下二十元	療產後赤白痢疾	黃連 分八 阿膠 分六 赤茯苓 當歸 黃蘗 各四分	右為末煉蜜元如梧桐子大粥飲吞下二十元空心	療產後下痢赤白有血	欽定四庫全書 婦人大全良方	赤石脂 黃連 地榆 各六分 當歸 分四 乾薑 甘草	各三分 厚朴 分十二 葱白 分七	右水二升煎取八合空心分作兩服	廣濟療產後腹痛氣脹肋下妨滿不能食兼微痢方	茯苓 人參 厚朴 各八分 甘草 橘紅 當歸	黃芩 各六分一方無黃芩有生薑	右為細末以飲調下方寸匕至匕半日三	赤石脂元 大治冷痢色青驚澹又療產後下痢



赤石脂 兩三 甘草 當歸 白朮 黃連 乾薑	秦皮 兩各二 川椒 附子 兩各一	右為細末煉蜜為元如梧桐子大酒下二十元日三	良忌猪肉冷水海藻菰菜	膠蠟湯 深師療產後下痢	阿膠 當歸 各六分 蠟 一枚如雞子大 粳米 一合 黃連 十分	右細切以水六升先煮米令蟹目沸去米內藥煮取	二升入阿膠蠟煮令烊分溫三服	欽定四庫全書 婦人大全良方	當歸湯 千金療產後下痢腹痛	當歸 龍骨 各三兩 乾薑 附子 甘草 熟艾 各一兩	白朮 兩二 川芎 兩二	右八味細切以水五升煮取二升半去滓分為三服	日三一日令盡忌猪肉冷水桃李雀肉毒物	廣濟療產後赤白痢臍下絞痛	當歸 芍藥 地榆 龍骨 黃連 艾葉 甘草 厚朴 各八分 黃芩 乾薑 各六分



右咬咀以水八升煮取二升半去滓分溫三服即差 忌生冷油膩海藻菰菜猪魚肉	又療產後赤白痢臍下氣痛 當歸 八分 厚朴 各十分 黃連 二分 肉豆蔻 五枚 甘草 六分	右咬咀以水五升煮取二升去滓分溫三服	桂枝湯 千金療產後餘寒下痢便膿血赤白日數十 行腹痛時時下血	桂心 乾薑 甘草 各二兩 赤石脂 十兩 當歸 三兩 附子	欽定四庫全書 婦人大全良方 一兩 蜜 一升	右細切以水七升煮取三升入蜜再煎一二沸去滓 分服一升日三	必效療產後痢日五十行者方	取木裏蠹蟲糞炒令黃急以水沃之稀稠得所服 之差止獨孤祭酒訥方	療產後虛羸下痢膿血腹痛	黃連 芍藥 甘草 當歸 乾薑 人參 各八兩



艾葉 分三	右呔咀水七升煮取二升分為三服忌猪鹿肉	治產後下痢不止困乏氣欲絕無問赤白水穀不分	黃連 厚朴 各三兩 芍藥 黃蘗 各二兩	右水六升煮取二升分溫二服	治產後羸困赤白痢疾心腹絞痛	薤白 石榴皮 黃連 各三分 當歸 二兩 地榆 三分	右水七升煮取二升半分為三服	欽定四庫全書 婦人大全良方	療產後氣痢不止方	青木香 三分 訶子 酥炙黃去核八分	右為細末空心米飲調下方寸匕一方有縮砂仁三	味等分為細末入蜜一匙米飲調下二錢	療產後水痢	枳殼 四分 厚朴 茯苓 黃連 各六分 當歸 三分	右水一升煮取八合空心分為三服	療產後水痢



黃連 分六 烏梅 分五 石榴皮 赤石脂 當歸 分各四 乾	薑 分三	右為細末煉蜜為元如梧桐子大空心米飲下三十	元	療產後血痢	艾葉 分三 阿膠 分十 黃連 分七 芍藥 黃蘗 甘草 分各六	右為細末粥飲調下方寸匕	療產後下痢膿血相雜	欽定四庫全書 婦人大全良方	赤石脂 五色龍骨 黃連 分各十 白朮 分五 阿膠	黃耆 分各六 黃蘗 分四	右為細末飲服方寸匕	礪砂煎元 治一切積滯化氣消食補益真氣產後逐	敗血補虛至善	礪砂 揀透明無石 金鈴子 去皮 天雄 用無灰酒煮	軟刮 去皮 當歸 各淨秤 巴戟 檳榔 舶茴香 木香	附子 炮 沉香 各一兩 阿魏 半兩 肉蓯蓉 一兩



右為細末以無灰酒煮白麪糊元如梧桐子大每服三十元空心日午溫酒下此方家家有子家婦人嘗病蓐中下痢日久甚困篤百方不差士人李潛善醫曰蓐中痢與他痢不同常痢可用苦澁藥止之蓐中痢生於血不足投澁藥則血愈不行痢當更甚為予作礪砂法云此藥最能治產後痢先以桂元小下之次投礪砂圓日九十圓痢頓減半次日遂愈礪砂圓產後雖無疾亦宜服之能養血氣去積滯									
欽定四庫全書 婦人大全良方									
桂元方 沈內翰方									
礪砂 桂心 甘遂 丁香 木香 芫花 以礪砂炒									
焦已上等分 巴豆 去心皮不去油減半									
右為細末麪糊元如菉豆大每服二元三元溫水下加減更量虛實潛名醫也云此元取積最勝不以久近皆能消化									
又許仁則秘方									
神麪末 五合炒 枳殼 白朮 各六分 人參 四分 赤石脂 十分									



右為細末米飲調下方寸匕	續命湯 療產後驟血不止	白蜜 匙一 生薑 片一	右同煎候蜜色赤投童子小便一升去薑更煎兩沸	分為三次頓服之	療產後血痢小便不通臍腹痛	生馬齒莧	右搗取汁三大合煎一沸下蜜一合調頓服	欽定四庫全書 婦人大全良方	療產後血痢不止	臭樗根 分六	右為末水和元如棗核大麪担作餛飩無度煮二七	箇熱吞之	療產後下血不止	桑耳 炙 芍藥 炙 地榆 茜根 牛角腮 阿膠 各六	分 艾葉 雞蘇 各四 白龍骨 分十二	右呔咀以水二升煮取八合分三服



婦人大全良方卷二十二								欽定四庫全書								
								婦人大全良方								



欽定四庫全書

子部
婦人大全良方卷二十三
四

詳校官太醫院恩羅_臣表天錫
編修_臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允_臣王燕緒
校對官中書_臣葉蘭
騰錄監生_臣王建璧



欽定四庫全書

婦人大全良方卷二十三

宋 陳自明 撰

產後痢疾作渴方論第一 凡三方

論曰產後不痢作渴夫水穀之精化為血氣津液以養臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止反溢水氣脾胃既虛不能剋水水自流溢浸漬皮膚則令人腫但止其渴痢則自差

欽定四庫全書

婦人大全良方

必効療產後痢而渴飲無度數

麥門冬 十二分 烏梅 二十箇

右細剉以水一升煮取七合細呷

經效療產後久痢津液竭渴不止

龍骨 十二分 厚朴 茯苓 黃耆 麥門冬 人參

各八分 生薑 六分 大棗 十四箇 並細剉

右水一大升煮取七合空心分兩服

古今錄驗療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌



燥	冬瓜 一枚	右以黃泥裹厚五寸煨令爛熟去皮攪汁服之差	產後大便秘澀方論第二 凡七方	論曰產後大便秘澀者何答曰產卧水血俱下腸胃虛	竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中	悶脹者此有燥屎在臟腑以其乾澀未能出耳宜服麻	仁元以津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則陽消陰	欽定四庫全書 婦人大全良方	長變證百出性命危矣	麻仁元方	麻仁 枳殼 人參 各四分 大黃 二分	右為末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下二十元未	通漸加元數不可太過	評曰產後不得利利者百無一生去血過多藏燥大便	秘澀澀則固當滑之大黃似難輕用唯葱涎調臘茶為	元復以葱茶下之必通 僕常以局方四物湯以生乾地黃易熟地黃加青皮去白煎服



效	療產後五七日不大便切不可妄服藥先宜用麥蘖散	方	大麥芽 不以多少	右炒黃為末每服三錢沸湯調下與粥間服	阿膠枳殼圓 治產後虛羸大便秘澀	阿膠 枳殼 等分	右為末煉蜜圓如梧桐子大別研滑石末為衣溫水	欽定四庫全書 婦人大全良方	下二十圓半日以來未通再服	許學士云婦人產後有三種疾鬱冒則多汗汗則大便	秘故難於用藥唯麻子仁蘇子粥最佳穩當	紫蘇子 大麻子仁	右二味各二合淨洗研令極細用水再研取汁一盞	分二次煮粥啜之此粥不惟產後可服大抵老人諸	虛風秘皆得力	千金療產後熱結大便不通蜜兌法



白蜜五合慢火煎令如硬錫以投冷水中良久取出 捻如母指大長二寸內穀道中即通
產後大小便不通方論第三 凡三方
論曰產後大小便不通者腸胃本挾於熱因產血水俱 下津液燥竭腸胃痞澁熱氣結於腸胃故令大小便不 通也
葵根湯 千金療產後淋瀝
葵根 二兩 乾者 通草 二兩 車前子 一升 亂髮 灰 大黃 桂心
欽定四庫全書 婦人大全良方
各一兩 冬瓜汁 七合 生薑 六兩 滑石末 別研一兩
右九味切以水七升煮取二升半去滓下滑石末分 三服 以愚考之既有大黃亦可治大便不通故錄 於此更宜斟酌量虛實而投之
集驗療產後津液燥竭大小便不通
芍藥 大黃 枳殼 麻仁 等分
右為細末煉蜜元如梧子大空心熟水下二十元一 方有甘草山梔仁



桃花散 治產後大小便秘澀	桃花 葵子 滑石 檳榔 等分	右為細末每服二錢葱白湯空心調下	產後遺糞方第四	廣濟療產後遺糞方	取故燕窠中草燒為末以酒調下半錢亦治男子	集驗方	礬石 牡蠣 熟	欽定四庫全書 婦人大全良方	右等分為末酒服方寸匕日三亦治男子	又療產後遺糞不知出時方	白欬 芍藥	右各等分為末酒服方寸匕	產後諸淋方論第五 凡十五方	論曰產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱	則小便澀痛故謂之淋	又有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血血即流滲於胞



中故血隨小便出而為血淋淋者如雨之淋也	三因論曰治諸產前後淋秘其法不同產前當安胎產	後當去血如其冷熱膏石氣淋等為治則一但量其虛	實而用之瞿麥蒲黃最為產後要藥唯當尋其所因則	不失機要	茅根湯 治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之	白茅根 兩八 瞿麥穗 白茯苓 兩各四 葵子 人參 各二	兩 蒲黃 桃膠 滑石 甘草 兩各一 紫貝 十箇 石	欽定四庫全書 婦人大全良方	首魚頭中石 二十箇 燒	右剉為散每服四大錢水一盞半薑三片燈心二十	莖煎至七分去滓溫服亦可為末木通煎湯調下二	錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調服	集驗療產後患淋小便痛	通草 三兩 大棗 二十枚 葵子 一升 白朮 一兩 榆白皮 五兩 石韋	黃芩 各二兩	右以水八升煮取二升半空心服溫呷千金有甘草



生薑	療產後小便淋瀝不通	葵子 一合 朴硝 八分	右水二升煮取八合下硝分兩服	滑石散 千金療產後淋	滑石 五分 通草 車前子 葵子 各四分	右為末以漿水調服方寸匕至二匕為妙	療產後小便不通張不愚方	欽定四庫全書 婦人大全良方	陳皮 一兩 去白	右為末空心溫酒調二錢一服便通	療卒不得小便	杏仁 十四箇 去皮尖	右炒為末和飲頓服立通	古今錄驗療產後勞傷熱大小便赤澀	雞蘇 一分 通草 十分 冬葵子 三合 芍藥 滑石 芒硝 各八分	生地黃 十二分



右水三升煮取八合下芒硝空心分三服	療睢轉小便不通八九日	滑石 十二分 寒水石 八分	右水二升煮取八合空心分三服	經效療氣結成淋小便熱淋引痛或如豆汁面色痿黃	貝齒 三箇為末 葵子 一合 石膏 十二分 滑石 八分	右水一升煮取八合下猪膽汁半枚合煎三四沸空	心溫服	欽定四庫全書 婦人大全良方	療產後小便澀痛或血淋者	瞿麥 黃芩 冬葵子 各二兩 通草 三兩 大棗 十二枚	右以水七升煮取二升半分作兩服	療產後血淋	車前子 瞿麥 各四兩 黃芩 三兩 鬱金末 一兩	右水六升煮取二升下鬱金末分三服	廣濟療產後卒患淋小便礮痛及至尿血	冬葵子 一升 通草 三兩 滑石 末別處四兩 石韋 去毛三兩 茯苓



黃芩 各二兩	右水九升煮取三升入滑石末空心服忌熱麪醋物 療產後淋小便痛及血淋	白茅根 五兩 瞿麥 車前子 各二兩 冬葵子 二合 鯉魚齒	一百箇 通草 三兩 為末	右水二升煮取一升入齒末空心服	治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未產之前 內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用鹽於產臍中填	欽定四庫全書 婦人大全良方	可與臍平却用葱白剥去麤皮十餘根作一縛切作一 指厚安鹽上用大艾炷滿葱餅子大小以火灸之覺熱 氣直入腹內即時便通神驗不可具述 出產乳集	木通散 治產後小便不通	木通 大麻仁 葵子 滑石 檳榔 枳實	甘草 各半兩	右為粗末每服三大錢水盞半煎至七分去滓溫服	產後小便數方論第六 凡二方



夫產後小便數者此由脬內宿有冷氣因產後發動冷	氣入腹虛弱不能致其小便故數也	桑螵蛸散 千金翼治產後小便數及遺尿	桑螵蛸 三十箇 炒 鹿茸 酥炙 黃耆 各三兩 牡蠣 煅 人參厚	朴 赤石脂 各二兩	右為末空心粥飲調下二錢外臺方無厚朴石脂有	甘草生薑	栝樓湯 集驗療產後小便數兼渴	欽定四庫全書	婦人大全良方	桑螵蛸 甘草 並炙 黃連 生薑 各二兩 栝樓根 人	參 各三兩 大棗 五十箇	右細切以水七升煮取二升半分三服忌猪肉冷水	產後小便不禁方論第七 凡四方	廣濟療產後小便不禁	以雞尾毛燒作灰細研溫酒調方寸匕服日三	又方	桑螵蛸 半兩 炒 龍骨 一兩



右為細末食前粥飲調下二錢

千金翼療產後遺尿不知出

白薇 芍藥

右等分為細末以酒服方寸匕日三服

固脬散 治婦人臨產時傷手胞破小便不禁

黃絲絹

自然黃者不用染成者三尺以炭灰汁煮極化爛用清水洗去灰令盡入黃蠟半兩

蜜一兩白茅根二錢

錢馬屁勃末二錢

右用水一升再煎至一瓊空心頓服服時歛氣服之

欽定四庫全書

婦人大全良方

不得作聲如作聲無效

產後小便出血方論第八

凡三方

夫產後損於血氣血氣虛而挾於熱血得熱則流散滲

於脬內故血隨小便出 治小便利血方

亂髮

淨洗燒成灰研細為末

右米飲調服方寸匕一方有滑石等分每服一錢生

地黃汁調下

療產後大小便不利下血



車前子 黃芩 蒲黃 生地黃 牡蠣 芍藥 各六分	右為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜	崔氏療產後血滲入大小腸	車前子草汁一升蜜一大合	右相和煎一沸分為兩服	產後陰脫玉門不閉方論第九凡十二方與八卷第十八論通	用	欽定四庫全書 婦人大全良方	三因論曰婦人趣產勞力努嚔太過致陰下脫若脫肛狀及陰挺下出逼迫腫痛舉動房勞能發作清水續續小便淋露	硫黃散 治產後勞傷陰脫	硫黃 烏賊骨各半兩 五味子一分千金翼用三銖一方無之	右為細末研令極細糝患處日三易	當歸散 治陰下脫方見八卷第十八論	千金方治產後陰下脫



以鐵精粉上推內之 又灸臍下橫文二七壯 廣濟療產後陰腫下脫內出玉門不閉產寶只有此一方無論	石灰壹升炒令能燒草	右熱湯二升投灰湯中適溫冷澄清坐水中以浸玉	門斯須平復如故	當歸散 治產後陰下脫方傳心方	當歸 黃芩 牡蠣各二兩芍藥一兩蠅皮燒存性半兩	右為細末每服二錢空心溫酒調服米飲調服亦可	欽定四庫全書 婦人大全良方	忌登高舉重	集驗療婦人產後虛冷玉門不閉寬冷方千金同	蛇床子 硫黃各四分兔絲子五分吳茱萸六分	右為細末以湯一升投藥方寸匕以洗玉門日再用	陳氏玉龍湯 治婦人產後用力太過產門惡出	以四物湯入真龍骨末少許煎空心連進二服麻	油湯熏洗	熨法集驗療婦人產後陰下脫方



單炒蛇床子一升乘熱以帛裹熨患處亦治產後	陰中痛	桃仁膏 治產後陰腫妨悶	桃仁 去皮尖別 研為膏 枯礬 五倍子	右等分為細末以膏子拌均傅之	檮枝散 治產後子腸下出不能收拾不論年深者皆	治之	檮枝 取皮焙乾一握	欽定四庫全書 婦人大全良方	右用水五升連根葱五莖漢椒一撮同煎至三升去	滓傾在盆內乘熱熏候通手淋洗如冷傾入五升瓶	內再煎一沸依前用一服可作五度用洗了睡少時	忌鹽鹹鮓醬濕麪發風毒物及用心力房勞等事	古今錄驗療產後陰下脫方	鰲頭 二箇 陰乾 葛根 一斤當 作一兩	右二味為末酒服方寸匕日三服	皂角散 治產後魘



皂角樹皮 川棟樹皮 各半 心 皂角核 一合 石蓮 炒去	右為粗末用水煎湯乘熱以物圍定熏通手洗於淨	房中就熏洗處鋪薦席纔熏洗了以帛挹乾便喫玉	露通真元熱酒下二元便仰睡 方見通 用方中	古今錄驗療產後陰下脫方	川椒 斗一 吳茱萸 二 戎鹽 半雞 升 子大	右為末以綿裹如半雞子大內陰中日一易二十日	欽定四庫全書 婦人大全良方	愈	婦人陰蝕五疳方論第十 凡八 方	凡婦人少陰脉數而滑者陰中必生瘡名曰蠹瘡或痛	或痒如蟲行狀淋漓露膿汁陰蝕幾盡者此皆由心神煩	鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡皆屬於心	又云陽明主肌肉痛痒皆屬於心治之當補心養胃外	以熏洗坐導法治之乃可	千金療陰蝕瘡方



當歸 芍藥 甘草 芎藭 各二兩 地榆 三兩
右細切以水五升煮取二升去滓熏洗日三夜一
又方
蒲黃 一升 水銀 一兩
右二味研均以粉上
又方
肥猪肉 三十斤
右以水三碩煮熟去肉入盆中浸之冷即易不過三
欽定四庫全書 婦人大全良方
兩度
崔氏療陰蝕洗搨湯方
甘草 乾漆 各一兩 黃芩 乾地黄 當歸 芍藥
各二兩 龜甲 五兩
右細切以水七升煮取一半去滓以綿帛內湯中以
搨瘡處良久即易日二度每搨湯可行十里許即裏
乾捻取甘濕散薄傳瘡上使遍可經半日又以湯搨
搨訖如前傳藥 余家婢遇此疾就甘家療不差蝕處作兩瘡深半寸余於消子方中檢得



此甘草湯方仍以自處蚺蛇膽散不經七日瘡乃平復甚効凡救十八人手下即活遇斯疾者請廣流布	甘濕散又名蚺蛇膽散療疔蟲陰蝕方	蚺蛇膽真者青木香末石硫黃關精麝香各四	分臨時分之多少入用元麝香辟蛇毒若先以相和蛇膽即無力也舊用五月五日蝦麻	右五味等分分為末更細研有患取如三碁子和井	花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部	訖然後取藥如碁子安竹管裏吹入下部中亦日再	欽定四庫全書 婦人大全良方	度老少量減其熏法每日一度不用再為之良	又療疔蟲食下部及五藏方	取桃東南枝三七枚輕打頭使散以綿纏之又搗石	硫黃為末將此綿纏桃枝撚轉之令末少厚又截一	短竹筒先內下部中仍以所撚藥桃枝熟然熏之	文仲療陰蝕欲盡者方	蝦蟇兔屎	右等分為末傳瘡上良



狼牙湯 古今錄驗療婦人陰蝕其中爛傷膿水淋漓

臭穢

狼牙
兩 三

右咬咀以水四升煮取半升去滓內苦酒如雞子中

黃大沸湯一盃消盡夜適寒溫以綿纏筋頭大如蠶

濡湯以瀝瘡中日四五度即差

產後乳汁或行或不行方論第十一
凡十五方

論曰凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡

欽定四庫全書

婦人大全良方

不調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之令乳無汁若

乳盈溢可潑東壁上佳或有產後必有乳若乳雖脹而

產後譽作者此年少之人初經產乳有風熱耳須服清

利之藥則乳行若累經產而無乳者亡津液故也須服

滋溢之藥以動之若雖有乳又却不甚多者須服通經

之藥以動之仍以羹臠引之蓋婦人之乳資於衝脉與

胃經通故也有屢經產而乳汁常多者亦婦人血氣不

衰使然也大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而其



色帶黃所生之子怯弱而多疾	三因論曰產婦有二種乳脉不行有氣血盛而壅閉不	行者有血少氣弱澁而不行者虛當補之盛當疎之盛	者當用通草漏蘆土瓜根輩虛者當用成煉鍾乳粉猪	蹄鯽魚之屬概可見矣	漏蘆散 療乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯妳	乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然內消乳汁	通行	欽定四庫全書 婦人大全良方	漏蘆 二兩 半 蛇脫 十條 炙 瓜樓 十箇 急火燒 令焦存性	右為末溫酒調下二錢無時候服藥後即以猪蹄羹	投之經驗方有牡蠣並燒存性 一方只用牡蠣煨	為末酒調下二錢	又方	葵菜子 炒 香 分 縮砂仁 各等 分	右為細末每服二錢熱酒調下滋益氣脉榮衛行津	液上蔡張不愚方常用極有驗



療乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕少	成煉鍾乳粉 研 濃煎漏蘆湯調下二錢	產寶 療產後乳無汁	土瓜根 漏蘆 各三兩 甘草 二兩 通草 四兩	右水八升煎取二升分溫三服忌如常法	一方加桂心並為末飲服方寸匕	一方	以猪脰如食法煮清粥食之驗	欽定四庫全書 婦人大全良方	靈苑方 下乳汁立效	粳米 糯米 各半 萬苳子 一合並 生甘草 兩半	右煎汁一升研前藥令細去滓分作三服立下	又方	漏蘆 一方二分 蟬螬 各三分 瓜樓根 土瓜根 各四分	右為細末酒調方寸匕日三服	一方無土瓜根有鍾乳沙糖水調服	又方



通草分十鍾乳粉 麥門冬各六	右為細末食後酒服方寸匕日三兩服効千金方同	有理石二方出 產寶	一方	土瓜根為末酒調方寸匕日三兩服効	一方	猪蹄一雙通草四兩	右以水一斗煮作羹食之最妙	欽定四庫全書 婦人大全良方	湧泉散 療乳無汁成都教授單釀方亦治乳結癰腫	穿山甲洗一兩灰 炒令燥	右為細末酒調服方寸匕	下乳方	大麻仁去殼生鰕三枚	右同研爛去滓用酒水各一盞瓦罏煑至一盞半有	餘食後臨卧溫服仍用被覆睡乳即通流劉柳溪傳	又方



必用方云漏蘆栝樓皆要藥或云多食猪蹄羹栝樓	取子淨洗炒令香熟搥碎取仁研細瓦上攤浥令白	色研為細末溫酒調下一錢服了合面卧少時未効	再作	一方瓜樓一枚熟搥以白酒一斗煮取四升去滓溫	飲一升日三	崔氏療乳不下	鼠肉 五兩 羊肉 六兩 □肉 八兩	欽定四庫全書 婦人大全良方	右三物作臠噉之勿令食者知	漏蘆湯 千金療乳無汁	漏蘆 通草 各八分 鍾乳 四分 黍米 一升	右先將米漬一宿研取汁三升煮藥三四沸去滓作	飲食經心錄同 余荆布因產前食素得疾羸弱產後乳脉不行已七十日服諸藥無効嬰	兒甚苦偶有人送赤豆一斗遂如常煮赤豆粥食之當夜乳脉通行閱本草赤小豆能通乳謾載之	產後乳汁自出方論第十二 無方	論曰產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥以止之



若乳多溫滿急痛者溫帛熨之產寶有是論却無方以	治之若有此證但以漏蘆散亦可	亦有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書	未曾論及	產後吹妳方論第十三 凡六方	夫產後吹妳者因兒喫妳之次兒忽自睡呼氣不通乳	不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通腐結	疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳若不急治腫	欽定四庫全書 婦人大全良方	甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰逮至死者速與	服皂角散栝樓散傳以天南星散以手揉之則散矣 出指迷方	栝樓散方 乳香一錢 研栝樓根末一兩	右研令均溫酒調二錢服	天南星散	天南星為末用溫湯調以鷺翎塗之	皂角散方 歌曰	婦人吹妳意如何 皂角燒灰蛤粉和



熱酒一盃調八字 須臾揉散笑呵呵

治妳結硬疼痛出經驗方

百藥煎為細末每服三錢酒一盞煎數沸熱服

療乳硬作痛

嫩桑葉生採研以米飲調攤紙花貼病處

產後妬乳方論第十四

婦人女子乳頭生小淺
熱瘡搔黃汁出方附凡

方十

夫妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹捏

欽定四庫全書

婦人大全良方

其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大渴引

飲牢強掣痛手不得近是也初覺便以手助捏去汁更

令傍人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱勢盛必成癰

也

吹妳妬乳乳癰其實則一只分輕重而已輕則為吹妳

妬乳重則為癰雖有專門不可不錄

療產後吹妳作癰

葵莖及子



右擣篩為散酒服方寸匕即愈

又方

雞屎為末酒服方寸匕須臾三服愈

又方

皂莢拾條以酒一升揉取汁硝石半兩煎成膏傅之

療產婦乳初結脹不消令敗乳自退方

瓜樓

一箇半
生半炒

大粉草

一寸半
生半炙

生薑

一塊半
生半煨

欽定四庫全書

婦人大全良方

右同剉用酒一碗煮取一棗去滓服之其痛一會不可忍即搜去敗乳臨卧再一服順所患處乳側卧於床上令其藥行故也

療乳腫次第結成癰方

右以馬溺塗之立愈

婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出方附

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出浸淫為長百種療不差者動經年月名為妬乳病婦人



飲兒者乳皆欲斷世論苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及	天麻湯洗之傳二物飛烏膏及飛烏散佳始作者可傳	以黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並佳	赤龍皮湯方	櫟皮 切三升	右以水一斗煮五升夏冷用水秋冬溫之分以洗乳	亦洗諸深敗爛久瘡洗畢傳膏散千金同	天麻草湯方	欽定四庫全書 婦人大全良方	天麻草 切五升	右以水一斗半煎取一斗隨寒溫分洗乳以殺痒也	此草葉如麻葉冬生夏着花赤如鼠尾花亦以洗浸	淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡洗畢傳膏散	千金同	飛烏膏散	用燒朱砂作水銀上黑煙 名細粉者三兩 礬石 三兩	右二味以絹篩了以甲煎和之令如脂以傳乳瘡日



三作散者不須和有汁自着可用散亦傳諸熱瘡黃
爛浸淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡疳蝕
口邊肥瘡蝸瘡等並以此傳之千金同

又黃連胡粉膏散

黃連^二 胡粉^十
兩 分 水銀^一 兩 同 研
令消散

右三味搗黃連為末三物相和合皮褱熟按之自和合
也縱不成一家且得水銀細散入粉中也以傳乳瘡
諸濕痒黃爛肥瘡若着甲煎為膏千金同

欽定四庫全書

婦人大全良方

乳癰方論第十五
凡二十
五方

夫婦人乳癰者由乳腫聚結皮薄以澤是成癰也足陽
明之經脉則血澁不通其血又歸之氣積不散故結聚
成癰千金云年四十以下治之多愈年五十以上宜速
治之即差若不治者多死中年又懷胎發乳癰腫及體
結癰此必無害也蓋懷胎之癰病起於陽明陽明者胃
之脉也主肌肉不傷藏故無害也診其右手關上脉沉
則為陰虛者則病癰乳癰久不差則變為癰



開慶間淦川嘉林曾都運恭人吳氏年已五十而病妳
 癰後果不起以此知聖賢不妄說也

產寶論曰產後宜勤去乳汁不宜蓄積不出惡汁內引
 於熱則結硬堅腫牽急疼痛或渴思飲其妳手近不得
 若成膿者名妬乳乃急於癰宜服連翹湯利下熱毒外
 以赤小豆末水調塗之便愈或數捏去乳汁或以小兒手
 摩動之或大人含水啣之得汁吐之其汁狀如膿若產
 後不曾乳兒畜積乳汁亦結成癰

欽定四庫全書

婦人大全良方

連翹湯 療產後妬乳并癰

連翹子 升麻 芒硝各十分 玄參 芍藥 白欬

防已 麝干各八分 大黃十二分 甘草六分 杏仁八十枚
去皮尖

右以水九升煎取三升大黃次下硝分三服

又方

蒲黃草

右熟搗傅腫上日三度易之并葉煎汁飲之亦佳妬

乳及癰並差



又方	以地黃汁塗即愈	又療諸癰不散已成膿懼針令自決破方	取白雞內翅第一翎各一莖燒末服之即決	又方	取白丁香研塗乾即易	又療乳癰初得令消	赤小豆 茵草	欽定四庫全書 婦人大全良方	右等分為細末苦酒和傅之愈	又療乳癰初覺有異	黃芩 甘草 防風 赤芍藥 黃耆 通草 各五兩	桑寄生 麥門冬 大棗 各六分 五枚	右細切以水一升煮取九合去滓入乳糖六分分為	四服	療乳癰或瘡久不差膿汁出疼痛欲死不可忍	鹿角 二兩 甘草 半兩



右為細末用雞子白和於銅器中煖溫傳患處日五
七易即愈

一方只用鹿角石上磨取濃汁塗之乾即易
一方鹿角燒作灰酒調抹立愈

治乳癰

鹿角屑一兩

右為細末以猪膽汁調下一錢不過再服神驗以醋
漿水服之亦得集驗方以猪領下清汁

欽定四庫全書

婦人大全良方

張氏橘香散 治乳癰未結即散已結即潰極痛不可
忍者藥下即不疼神驗不可云喻因小兒吹妳變成斯
疾者並皆治之

陳皮 浸去白眼乾麪炒微黃為細末麝香研酒
調二錢初發覺赤腫疼痛一服見效每服有效

療乳癰諸般癰癰疽

橘紅半兩 阿膠粉炒 粉草炙各一兩

右咬咀分為二服每服用泉水一椀半煎至棧半去



滓溫服	療妳癰并無名癰瘡	鼠糞不以多少燒存性二分入輕粉二十文研停 又療火瘡	療乳頭裂破	以丁香為末水調傳立愈又以蛤粉胭脂等分新 水調傳	陳日華方一醉膏 治妳癰	欽定四庫全書 婦人大全良方	石膏不以多少煨通赤取於地上椀覆出火毒細 研每服三錢溫酒調下添酒盡醉睡覺再進一服 千金療乳無汁以水煮服	金黃散 治妳癰 出婦人經驗方	川大黃 粉草 各一兩	右為細末以好酒熬成膏傾在棧中放冷攤紙上貼 痛處仰面卧至五更未貼時先用溫酒調一大匙就 患處臥明日取下惡物相度強弱用藥羸弱不宜服



療發背乳癰四肢虛熱大渴	生地黄 ^{六兩} 黃芩芍藥人參知母甘草 ^{各二}	^兩 升麻黃耆麥門冬栝樓 ^{各三兩} 大棗 ^{十二枚}	右以竹葉切三升以水一斗二升煮取九升去竹葉	內藥煮取三升渴則飲之	療婦人發乳丈夫發背爛生膿血後虛成氣疾	黃耆麥門冬地黄人參升麻茯苓 ^{各三}	^兩 當歸芍藥遠志甘草 ^{各一兩} 大棗 ^{十箇}	欽定四庫全書 婦人大全良方	右水二升煮取一升分溫三服若有是證局中排膿	內補十宣散亦妙	產乳療婦人乳癰 ^{已穿未穿} 出膿大止痛斂瘡口	以芙蓉花爛研如癰若無花只取根上皮先用竹	刀刮去麤皮但用內一層嫩白皮研如癰却入蜜	少許調停看瘡大小如未穿即留中孔如已穿即	塞其孔其膿根自然涸出盡不倦頻頻更換此方	大治一切癰疽發背立見神効膿出盡却用後藥



傳	乾膿散 又歛瘡口	烏賊骨 黃丹 天竺黃 錢各二 輕粉 二 麝香 字一 老	降真骨 錢三	右研為細末乾糝瘡口不數日乾	又方	降真節 錢二 天竺黃 露蜂房 錢各一 麝香 輕粉 各少	許	欽定四庫全書 婦人大全良方	右為末乾糝	又方	乳香 沒藥 黃丹 錢各一 龍骨 錢二 真坯子 錢三 血竭	錢半 麝香 字一 降真節 錢一	右為細末乾糝	產寶療乳癰方	黃蘗 分一	右為細末以雞子白調停塗之乾則易立愈



又方	芎根擣傅之愈	丹參膏 必效方療婦人乳癰	丹參 白芷 芍藥 各二兩	右咬咀以苦酒淹經宿以猪脂半斤微火煎之白芷	黃為度膏成去滓傅之	治妳發痛不可忍 先人國器經效方	水楊柳根新採者一握搥碎以好酒同甘草烏梅	欽定四庫全書 婦人大全良方	煇至七分去滓時時溫服	神效爪樓散 李嗣立方治婦人乳疽妳勞	爪樓 一箇去皮焙研為末如急生粉草 半兩當歸 酒洗	去蘆焙 乳香 一錢通明沒藥 一分二味并別研	右用無灰酒三升同於銀石器中慢火熬取一升清	汁分作三服食後良久服如有妳勞便服此藥可杜	絕病根如毒氣已成能化膿為黃水毒未成即於大	小便中通利疾甚再合服以退為妙婦人乳癰方甚



婦人大全良方卷二十三									
欽定四庫全書									
婦人大全良方									
多獨此一方神效無比萬不失一									
癸亥年僕處五羊									
趙經略廳判閫夫									
人年七十一歲隔一二年左乳房上有一塊如鶩卵									
大今忽然作楚召余議藥僕云據孫真人云婦人年									
五十歲已上乳房不宜見癰見則不可療矣幸而未									
破恐是氣瘤謾以五香連翹湯去大黃煎服服後稍									
減則已過六七年後每遇乳									
有腫脹時再合服必消滅矣									
五香連翹湯									
方見二十									
卷第二論									



欽定四庫全書

婦人大全良方卷二十四

宋 陳自明撰

拾遺方

烏喙元 治腸覃病因寒氣客於腸外與胃氣相搏正

氣不榮繫瘕內着惡氣乃起其生也始如雞卵久久乃

成狀如懷胎按之堅推即移月事時下故曰腸覃亦治

乳餘疾大小便不利并食有伏蟲臃脹癰疽毒腫久寒

欽定四庫全書

婦人大全良方

邪氣

烏喙

炮去皮
尖二錢

半夏

湯洗七
次四錢

石膏

煨

藜蘆

炒

牡蒙

茯苓

酒浸各
一錢

乾薑

炮

桂心

各一錢
三字

巴豆

六七箇
研膏

右為末蜜元如綠豆大每服三五元食後酒飲任下

亦治男子疝痛

木香散 治婦人脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱

木香

沉香

乳香

研

甘草

炙各
一分

川芎

胡椒

陳皮

人參

晉礬

各半
兩

桂心

乾薑

炮

縮砂

各一



兩 茴香炒兩半 天茄五兩赤小者乾秤	右細焙為末空心日午溫陳米飲調下二錢忌羊肉	石莖散 治婦人血結胞門或為癥瘕在腹脇間心腹	脹滿腫急如石水狀俗謂之血蠱	石莖一兩 當歸尾 馬鞭草 紅花炒 烏梅肉各半兩	蓬莪茂 三稜並炮 蘇木節 沒藥 琥珀別研各一分	甘草炙一錢	右為末濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒薑棗煎湯調	欽定四庫全書 婦人大全良方	亦得	大腹皮飲 治婦人血癭單單腹腫	大腹皮 防己 木通 厚朴薑製 栝樓 黃芪	枳殼炒 桑白皮炙 大黃蒸 陳皮 青皮 五味子各等分	右呔咀每服秤一兩水一碗煎至六分棧去滓入酒	一分溫服不以時候	大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如敦敦狀小便微難而



不渴由產後為水與血并結在血室也	大黃 四兩 甘遂 炮 阿膠 炒各二兩	右剉散每服三錢水一錢煎七分去滓溫服其血當	下	竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血	竹茹 熟地黃 各三兩 人參 白芍藥 桔梗 川	芎 當歸 甘草 炙 桂心 各一兩	右呖咀每服四錢水一大錢煎至七分去滓不以時	欽定四庫全書 婦人大全良方	服	膏髮煎 治婦人穀氣實胃氣下泄陰吹而正喧陰中	出血	頭髮灰 猪脂	右調停綿裹如棗核大納陰中	產後腸頭如以針刺連穀道又如痔痛小便如淋狀或	寒熱此產時用力氣併腸間亦由陰虛陽邪乘之毒氣	攻衝恐成腸癰宜瓜子湯



薏苡仁四兩 桃仁去皮 牡丹皮 瓜樓子各一兩	右為粗末每服五錢水二瓊煎至一瓊去滓溫服	固真丹 治元臟久虛及小腸腎餘膀胱疝氣五般淋	疾精滑精漏小便白濁及婦人赤白帶下漏下血崩子宮	血海虛冷等疾並皆治之高司法方續添	製蒼朮法 洗去土米泔浸逐日換新泔春五日夏三日如秋七日冬十日切作片子焙乾秤一	斤分 四處	蒼朮四兩入茴香一兩鹽一兩同炒令朮黃為度	欽定四庫全書婦人大全良方	蒼朮四兩入川烏一兩炮裂去皮尖切片子并川楝子一兩和皮核攪開同炒令朮黃為度	蒼朮四兩入紅椒一兩去目并合口者破故紙一兩同炒令朮黃為度	蒼朮四兩用好醋好酒各半升一處同煮二三十沸取朮焙乾	右一處為末用煮藥酒醋打麪糊為元如梧子大每	服二十元男子溫酒或鹽湯下空心食前婦人醋湯	下藥性溫無毒小便頻數為効	大効內補元 治受氣虛弱及五勞七傷藏府積冷瘕癖癥塊虛脹或經脈不調疝冷赤白帶下口苦舌乾面



色萎黃黑黥心煩驚悸頭目旋暈不美飲食痰涕黏涎 手足百節熱疼無力肌肉消瘦子息斷緒服一月當妊 娠百病皆愈		草薢四兩 牛膝 五加皮 白朮各二兩 川烏炮 枳實	炒 丹參各一兩	右為細末煉蜜元如梧子大溫酒下二十元空心日 午晚食前各進一服	南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷無子及數經	欽定四庫全書 婦人大全良方	墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴 下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積 聚癥瘕臍下冷痛小便白濁以上疾證皆令孕育不成 以致絕嗣此藥治產後百病百晬內常服除宿血生新 血令人有孕及生子充實亦治男子亡血諸疾	桃仁去皮尖雙 木香炮 茯苓 京墨燒各一兩 秦艽	甘草 人參 桔梗炒 石斛酒浸 蠶布燒 藁本各二	兩 當歸 桂心 乾薑炮 細辛 牡丹皮去心 川芎



各兩 川椒去目及閉口炒去汗 山藥各三兩 澤蘭葉 熟地黃	洗酒 香附子炒各四兩 蒼朮米泔浸去皮 大豆卷炒各半升 糯米	右為細末煉蜜元每兩作六元每服二元細嚼溫酒	送下淡醋湯調亦可空心食前服	治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺用盡藥不効者惟有	此藥可治神効不可言每以少許臨卧時洗面令淨如面	油用之數日間瘡腫處自平赤亦消如風刺粉刺一夕	欽定四庫全書 婦人大全良方	見效但塗藥勿近眼處	生硫黃 香白芷 爪樓子仁 膩粉各半錢重 全蝎	七枚去翅足 蟬蛻五枚洗 芫青各七枚去翅足	右為細末麻油黃蠟約度如合面油多少熬滾取下	離火入諸藥在內每用少許塗面上林提點方	烏雞煎 治婦人百病	吳茱萸 良薑 白薑 當歸 赤芍藥 延胡	索 破故紙 川椒 生乾地黃 劉寄奴 蓬



莪茂 橘紅 青皮 川芎 各一 兩 荷葉灰 四 兩 熟艾	二 右為末醋煮麪糊元如梧子大每服三五十元湯使 於後	月經不通紅花蘇木酒下 白帶牡蠣粉調酒下	子宮久冷白茯苓煎湯下 赤帶建茶清下	血崩豆淋酒調綿灰下 胎不安蜜和酒下	腸風陳米飲調百草霜下 心疼菖蒲煎酒下	欽定四庫全書 婦人大全良方	漏胎下血烏梅溫酒下 耳聾蠟點茶下	胎死不動斑猫三十箇煎酒下	脚腰痛當歸酒下 胎衣不下芸臺研水下	頭風薄荷點茶下 血風眼黑豆甘草湯下	生瘡地黃湯下	身體疼痛黃耆末調酒下 四肢浮腫麝香湯下	咳嗽喘滿杏仁桑白皮湯下	腹痛芍藥調酒下



產前後痢白者乾薑湯下赤者甘草湯下赤白雜者
二宜湯下常服溫酒醋湯任下並空心食前服

產乳集將護嬰兒方論

凡新生兒坐婆急以綿纏手指繳去兒口中惡物令盡

不可遲若嚥入腹中必生諸疾

聖惠方寶鑑方
謂之玉銜疾

先斷兒

臍帶可只留二寸許更看帶中如有小虫急撥去之留

之必生異病或以線繫扎定然後洗兒不然則濕氣入

腹必作臍風之疾

須是坐婆諳練收生
手段輕疾方得其宜

既綳裹了取生

欽定四庫全書

婦人大全良方

甘草一寸搥剉用水一合煎濃汁用綿篆子蘸令兒嘔

之當吐出惡汁盡半合不妨

今人止以濃煎黃連并甘
草汁以綿篆子蘸令兒嘔

三日以來以退惡物大便下
謂之臍屎此乃忌吐故也

好辰砂一字研細以熟蜜

調置兒口中吮之以去驚邪然後飼乳自此飼乳之後

須依時量多寡與之勿令太飽恐成嘔妳久則吐妳不

可節也三朝洗兒可用虎頭骨桃枝猪膽金銀煎湯洗

之則兒少驚

尋常澡浴用猪膽汁
化入湯即不生瘡疥

每日頻就無風處看

兒上脣并兩頰內有白泡如膜起者速以指甲刮破更



生更去之

保童必効謂之驚口無即不須妄動

更看舌下恐生重舌皆由

兒在胎中母喫炙燂肥膩飲酒服熱藥所致

保童必効方自有藥

治三日烙臍帶或灸之外不可別加火艾恐成驚癇

灸舊

兒臍有二十壯者今以七壯為中

又天寒時兒用父母舊衣作衣服不

可用新綿絹只用舊者若太溫煖則令兒筋骨軟弱若

天色和煖無風可令妳婆抱孩兒頻見風日則血壯氣

剛肌體硬密堪耐風寒不致疾病又擇乳母須精神爽

健情性和悅肌肉充肥無諸疾病知寒溫之宜能調節

欽定四庫全書

婦人大全良方

乳食妳汁濃白則可以飼兒不得與妳母大段酸鹹飲

食仍忌纔衝寒或衝熱來便餵兒妳如此則必成妳癖

或驚疳瀉痢之疾切須忌之夜間不得令兒枕臂須作

一二豆袋令兒枕兼左右附之可近乳母之側蓋覆衣

衾須露兒頭面一向仰卧恐成驚疾須時復回動之夏

月須涼簟如夜間餵妳須妳母起身坐地抱兒餵之如

陰陽交接之際切不可餵兒妳此正謂之交妳也必生

癖或換易衣綳三月房中不可太煖妳母不可頻喫酒



恐兒作痰嗽驚熱昏眩之疾至於變蒸次第妳乳所傷 夜啼潮熱之類自有專於小方脉者此略見之若能調 和妳食并看承愛護如法則別無疾病亦不可令兒常 服湯藥此尤宜審之也 見楊氏嬰兒論巢氏病源 嬰童寶鑑方程甫備要方	初生浴兒良日	寅卯酉日大吉 壬申丁巳癸巳大凶	木爪元療兒初生下口中穢惡不盡入喉中即便吐自	後纔啼聲一發則又嚥下因生異疾矣	欽定四庫全書	婦人大全良方	木爪 麝香 膩粉 木香 檳榔 末各一字	右水麪糊元如小黃黍米大每服一二元甘草水下	不拘時候	延胡索散 療兒初生下盤腸刺痛面青色啼哭不止	延胡索 錢一 乳香 木香 各半錢	右為細末水一大琖煎七分無時與服少許	婦人大全良方卷二十四

